






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1787/A



P E D A N I I
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
MEDICA MATERIA

LIBRI SEX,
Ioanne RVELLIO Sueffionenfi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRAETER
Pharmacorum simplicium catalogum, copiosus
omniū ferme medelarum sine curationū Index.



L V G D V N I,
Apud Theobaldum Paganum.

M. D. XLVII.

INDEX OMNIUM

quæ in Dioscoride continentur.

A Brotonum	229	Adianton	364
Abſinthium	227	Aegilops	365
Abſinthiũ marinum	228	Aeris ſquamma	441
Abſinthiũ Santonicũ	229	Aeris flos	440
Acacalis	76	Aerugo rafa	442
Acacia	83	Aerugo ſcolecia	444
Acacia altera	84	Aes uſtum	439
Acantha,us	223	Aethiopis	354
Acanthium	222	Aëtites lapis	482
Acanthus ſylueſtris,	223	Agallochon	25
Acetum	413	Agaricum	211
Acetum è betonica	427	Ageraton	327
Acetum muſum	414	Agnus	85
Acetum ſcillinum	416	Aiuga	302
Acetum è ſtœchade	427	Alabaſtrites	480
Achillea	319	Alcea	298
Achras	99	Alcibiadion	315
Acidamuria	415	Alcyonium	473
Acinos	239	Alisma	299
Acorum	8	Allium	186
Aconitum	342	Aloë	225
Adarces	474	Alſine	347
Adeps omnis	135	Althæa	297

INDEX.

Alumen	464	Anethum	249
Alumen scissile	ibidē	Anguinium senectus	115
Alus	309	Anisum	249
Alysson	271	Anonis	223
Alypon	393	Anthemis	292
Amaracum	238	Anthericum	198
Amaranton	327	Antyllis	291
Ambrosia	282	Antipathes	475
Amiantus lapis	481	Antirrhinon	362
Ammi	251	Antispoda	439
Ammoniacon	269	Aparine	271
Amomis	20	Aphaca	184
Amomum	19	Apiastrum	276
Ampelitis terra	486	Apios	392
Ampeloprason	186	Apium	293
Amphisbænæ ictus notæ		Apocynon	344
531. eius curatio	541	Apollinaris	334
Amurca	88	Apri iecur	121
Amygdalæ amaræ	101	Apum ictus curatio	537
Amylum	157	Aqua	412
Anagallis	205	Aqua frigida	513
Anagyris	299	Aqua marina	412
Anchusa	315	Aqua mulsa	411
Androsaces	290	Arabicus lapis	480
Androsæmon	301	Araneus	126
Anemone	204	Arbutus	101

INDEX.

Arcion	355	Asplenon	290
Arction	354	Aspidis ict ⁹ notæ 533. eius	
Arcturon	ibidem	curatio	543
Arena	483	Aster Atticus	359
Argemone	205	Astragalus	329
Argēti recrementū	449	Athamanticum	8
Argenti scoria	ibidem	Athera	155
Argēti spuma	ibi. & 510	Atractylis	272
Argentū viuū	456. & 510	Atramentū librariū	487
Arisarum	198	Atramentū sutoriū	458
Aristolochia	214	Atriplex	169
Armeniaca mala	98	Auellananux	103
Armenius lapis	454	Auena	156
Armoracia	167	Auricula muris	209
Aron	197	Auri pigmentum, siue ar	
Arrenogonon	286	senicon	463. & 510
Artemisia	281	B Accæ lauri	71
Arundo, vide Harundo.		Baccharis	240
Asarum	13	Balaustium	94
Asclepias	272	Ballote	276
Ascyron	301	Balsamum	22
Asininum iecur	121	Barbula hirci	183
Asini vngula	120	Basilisci ictus notæ	533
Asius lapis	476	eius curatio	543
Aspalathus	24	Bdellium	55
Asparagus	173	Beta	171

INDEX.

Betonica	304	Calamus odoratus	21
Bitumen	66.& 67	Calamintha	235
Blatta pistrinaria	120	Calcifraga	393
Bliton	168	Caltha	327
Botrys	282	Calx	510
Brassica	169	Calx viua	471
Brassica marina	171	Cancanum	26
Brassica sylvestris	170	Canceri	113
Britannica	305	Canis rubus	77
Bromus	365	Canis rabidi iecur	121
Bryon	25	Canis rabiosi signa	524.
Bryonia	394	curatio morfus eius	525.
Buccina	110	ab eo morforū vict ^o ratio.	
Buglossum	361	527	
Bulbus esculentus	199	Cannabis	298
Bulbus vomitorius	200	Cantharides	125
Bunion	360	Capnos	355
Euprestis	125.& 499	Capparitis	202
Euphthalmos	294	Capræ vngula	121
Butyrum	131	Caprinum iecur	ibidem
Butyri fuligo	ibidem	Cardamomum	10
C Acalia	360	Cardamina	175
C Cancrys	260	Carduus	212
Cadmia	433	Carpari succus	503
Cæcilæ ictus notæ	531.	Cariotæ	92
curatio eadem quæ vi-		Carum	249
peræ morfus			

a s

INDEX.

Caleus	130	Chamæ	111
Casia	16	Chamæacte	390
Castanea	90	Chamæcissos	361
Castorium	117	Chamædaphne	369
Catanance	363	Chamædrys	274
Caucalis	181	Chamæleo albus	118
Cedria	70	Chamæleo niger	219
Cedrides	71	Chamæleuce	361
Cedromela	98	Chamæpitys	302
Cedrus	69	Chamæfyce	387
Celticum nardum	12	Chamælea	389
Céchrict ⁹ notæ 532. eius		Characias tithymalus	382
remedia	542	Chelidonium	207
Centauriū magnum	216	Chelidonium minus	208
Centaurium minus	217	Chia terra	485
Cepa	185	Chondrylla	178
Cepæa	299	Chrysāthemō 292. &	327
Cera	151	Chrysocolla	454
Cerasia	96	Chrysocome	326
Ceractē ict ⁹ notæ 533. eius		Chrysogonon	ibidem
curatio	542	Cicadæ	123
Cerui genitale	120	Cicer satium	159
Ceruinum cornu	124	Cicer arietinum	ibidem
Cerussa	452. & 507	Cicer sylvestre	160
Cestron	304	Cichorion	178
Chalcitis	459	Cici	381

INDEX.

Cicuta	343.& 503	mnes i&ctus virul&etos	533
Cimices	119	Conyza	284
Cimolia	485	Corallium	475
Cinis farmentitius	472	Coriandrum	251.& 502
Cinnabaris	455	Coria veteram&etaria	121
Cinnamomum	17	Coriarius frutex	91
Cionia	110	Coris	302
Circ&ea	283	Coronopus	176
Cirfium	358	Cornu cerui	124
Cistus	78	Cornus	100
Citria mala	98	Corruda	173
Clematis	307	Cos Naxia	483
Clinopodium	273	Costus	20
Clymenon	310	Cotonea m&ala	97
Cnicus	398	Cotyledon	349
Coagulum	134	Crateogonon	286
Coccum gnidion	390	Crimmon	155
Cocc&u infectorium	324	Crithm&u seu critam&on	176
Cochle&e	112	Crocodilion	220
C&eruleus	455	Crocomagma	27
Colchicon	345	Crocum	ibidem
Colligendorum ratio	4	Croton	381
Colocasia	161	Cucurbita	179
Colocynthis	392	Cucumis sativus	179
Colymbades	87	Cucumis sylvestris	372
Communis curatio in o-		Cuminum sativum	250

INDEX.

Cuminū sylvestre	ibi.	Dipsacum	220
Cunila	231	Dipsadis mori ⁹ notæ	532.
Cupressus	68	eius curatio	541
Curmi	154	Dorycnion	339. & 501
Cyclaminus	194	Draba	190
Cyclaminus altera	196	Draco marinus	110
Cydonomeli	419	Draconis marini ictus re	
Cynia	399	media	539
Cynocrambe	ibidem	Dracunculus	196
Cynoglosson	362	Dryini ictus notæ	532. ei ⁹
Cynosorchis	287	curatio	541
Cyparissias tithimal ⁹	384	Dryopteris	397
Cyphi	26	Dulcis radix	216
Cypirus	9	E Benus	80
Cytinus	94	E Ebulum	390
Cytisus	356	Ebur	124
D Amascenapruna	100	Echinus	109
D Damasonion	299	Echion	316
Daphnoides	368	Elaphoboscon	255
Daucus	257	Elaterion	373
Delphinium	ibidem	Elatine	320
Dédroides tithimal ⁹	384	Electrum	73
Deuteria	409	Elelisphacos	234
Dictamnium	233	Elæomeli	32
Dictamnium Cretense	234	Eleoselinum	253
Diphryges	462	Elichryson	327

INDEX.

Empetron	393	Fagus	90
Ephemeron	346. & 500	Farina crassior	155
Epimedium	313	Fel	143
Epimelis	99	Ferri rubigo	445
Epipactis	355	Ferula	261
Epirotica mala	98	Festuca	365
Epithymum	393	Febrini testes	116
Equisetum	323	Ficus	105
Equorum lichenes	121	Filicula	397
Eretria terra	483	Filix	396
Erica	75	Filix foemina	ibidem
Erinaceus	109	Fimum	145
Erinei	107	Flos æris	440
Erinus	317	Flos salis	469
Eruca	181	Flos puniceæ	94
Eruca olerum	125	Flos sylvestris punici ibi.	
Eruca pinorū	125. & 498	Fœniculum	256
Eruum	163	Fœniculum erraticū ibi.	
Eryngium	225	Fœnum græcum	158
Erysimon	190	Fraxinus	72
Erytrodanon	296	Fuligo è myrrha, resina,	
Empatorium	321	styrace	59
Emphorbium	266	Fuligo liquidæ picis	65
F aba	160	Fuligo pictoria	486
Faba ægyptia	161	Fuligo thuris	59
Fæx	471	Fumaria	355

INDEX.

Fungi	345. & 508	Glaucium	270
G Agates lapis	479	Glaux	366
G Galactites lapis	480	Gluten piscium	270
Galaxias	ibidem	Glutinum	ibidem
Galbanum	267	Glycyfide	294
Galerita	123	Gnaphalion	283
Galion	350	Gnidium granum	389
Galiopsis	ibidem	Gobius	118
Galla	90	Gramen	317
Gallina	122	Gramen arūdinaceū	ibi.
Gallinæ cerebellum	ibi.	Gramen parnafi	ibidē
Garum	119	Grossi	107
Genitale cerui	120	Gummi amygdalæ	102
Gentiana	213	Gummi cerasi	96
Geranion	283	Cypsum	472. & 508
Geodes lapis	483	H Aematites	477
Gingiberis	192	H æmorrhoi ictus	
Gingidion	181	notę 532. ei ⁹ curatio	542
Girh	273	Halica	156
Gladiolus	313	Halicacabon solanū	338
Glans	89	Halimus	76
Glans Iouis	90	Harundo	74
Glans Sardiana	ibidē	Harundo cypria	ibidē
Glans vnguētaria	379	Harundo vallatoria	ibi.
Glastum satinum	209	Hastula regia	198
Glastum sylvestre	210	Hedera	206

INDEX.

Hedysaron	289	Hirundines	124
Helcyfma	449	Hirudo	512
Helenium	28	Holostium	310
Helenium alterum	29	Hordeum	153
Helioscopius	384	Horminum	288
Heliotropiū magnū	399	Hyacinthus	329
Heliotropiū parū	400	Hydromeli	412
Helleborum album	369	Hydromelon	419
Helleborum nigrū	370	Hydropiper	193
Helxine	320.& 346	Hyoscyamus	334.& 504
Hemerocallis	285	Hypecoon	334
Hemionitis	291	Hypericon	390
Herba Sabina	69	Hypocistis	78
Heriacium magnū	252	Hyssopum	230
Heriacium paruum, ibid.		I Aspis	481
Hippace	131	I Iberis	108
Hippocampus	110	Ibiscum	297
Hippoglosson	362	Ichthyocolla	270
Hippolapathon	168	Idæa radix	323
Hippomarathon	256	Iecur apri	121
Hippophaës	380	Iecur alinum	ibidē
Hippophæston	381	Iecur canis rabidi	ibi.
Hippopotami testes	116	Iecur caprinum	ibidē
Hippofelinon	254	Iecur mergi	ibidē
Hirci barbula	183	Illecebra	348
Hirculus	12	Ilex	90

INDEX.

Indicum	455	Lampfana	168
Inguinalis	359	Lana	132
Intybus	177	Lana cremata	ibi.
Iouis glans	90	Lanaria herba	194
Irio	190	Lappa	365
Iris	6	Lapathum	167
Ifopyron	359	Lafer	264
Iudaicus lapis	481	Laferpitium	ibidē
Iuglandes nuces	102	Lathyrus	385
Iuncus	325	Lauer	175
Iuncus odoratus	21	Laurus	71
Iuniperus	68	Laurus Alexandrina	368
Ius piscium	119	Lauri baccæ	71
Ixia	218	Lemnia terra	457
L Abrum Veneris	220	Lens	162
L Labrusca	402	Lens palustris	347
Lac	128	Lentiscus	61
Lac coagulatum	509	Lentiscina refina	64
Lac humanum	130	Leontopelaton	273
Lac schiston	129	Leontopodion	362
Lactis serum	ibid.	Lepidium	203
Lacerta	127	Leptocarya	103
Lactuca sativa	180	Lepus marinus	115. & 511
Lactuca sylvestris	ibi.	Lepus terrestris	115
Ladanum	79	Leucacantha	224
Lagopus	312	Leucanthemon	292

INDEX.

Leucas	274	Lycium	82
Leucoion	285	Lycopsis	316
Lichenes equorum	121	Lygos	86
Lichen	326	Lyfimachia	306
Lignorum marcor	73	M Acer	73
Ligusticum	246	Manæ	118
Ligustrum	77	Magnes	479
Lilium	275	Magudaris	365
Lilium sylvestre	285	Malabathrum	15
Limonion	312	Malicorium	94
Lingua bubula	361	Malua	168
Linozostis	398	Malum	97
Linum	159	Malum Armeniacum	98
Lithocolla	482	Malum cotoneum	97
Lithospermon	295	Malum dulce	98
Locustæ	123	Malum Epiroticū	ibi.
Lolium	157	Malum Medicum	ibi.
Lonchitis	296	Malum orbiculatū	ibi.
Lora	409	Malum Persicum	ibid.
Lotus arbor	99	Malum præcox	ibidē
Lotus Aegyptia	357	Malum punicum	93
Lotus sylvestris	356	Malum sylvestre	ibid.
Lotus urbana	ibidem	Mandragoras	339. & 504
Lupinus	164	Manna thuris	58
Lychnis coronaria	275	Marcor lignorum	73
Lychnis sylvestris	ibi.	Maron	239

INDEX.

Marrubium	277	Metopion vnguentũ	49
Marrubium nigrum	276	Milium	156
Mastiche	61	Millefolium	357
Meconium	504	Millepedæ	120
Medica	184	Misy	460
Medica mâla	98	Mituli	III
Medion	313	Moly	243
Medulla	142	Molybdæna	448
Mel	149	Molybdoides lapis	448
Mel heraclion	502	Morochthus	480
Melampſithium	462	Morus	103
Melanteria	460	Mullus	116
Melanthium	263	Mulſum	411
Melia terra	486	Muralis herba	346
Melilotos	239	Muria	469
Melimela	98	Mures	128
Meliſſophyllon	276	Muris auricula	209
Melitites lapis	480	Mus araneus	127
Melomeli	419	Muris aranei iſtus notæ	
Memphites	481	531: eius curatio	539
Mentha	235	Muſcus	25
Menthaſtrum	ibi.	Muſcus marinus	351
Meon	8	Mustela	117
Mercurialis	398	Myagron	358
Mergi iecur	121	Myofotis	209
Mespilus	99	Myrica	75

INDEX.

Myrrha	52	Ocimastrum	316
Myrrha Bœotica	54	Ocimum	182
Myrrhis	357	Oenanthe	284. & 403
Myrtidanum	96	Oesypum	133
Myrtus satiua	95	Olea syluestris	86
Myrtus syluestris	367	Oleaster	ibidem
N Aphtha	67	oleę ethiopice lacrima	88
Napus	166	Olei vires	29
Narcaphthon	25	Oleum amygdalinum	33
Narcissus	379	Oleum balaninum	34
Nardi genera	10	Oleum cicinum	32
Nardum Celticum	12	Oleum cnicinum	34
Nardum montanũ	13	Oleũ è gnidio grano ibi.	
Nardinum vnguentũ	51	Oleum hyoscyaminũ	34
Nasturtium	189	Oleum laurinum	35
Natricis ictus notæ	532	Oleum lentiscinum	36
eius curatio	542	Oleum mastichinum	ibi.
Nepeta	235	Oleum melanthinum	34
Nerion	344	Olenm melinum	98
Nitrum	469	Oleum myrteum	35
Nitri spuma	470	Oleũ oliuæ syluestris	30
Nux auellana	103	& 88	
Nux iuglans	102	Oleum omphacinum	29
Nux pinea	60	Oleum picinum	65
Nymphæa	289	Oleum raphaninum	34
O Chra	455	Oleum Sicyonium	31

INDEX.

Oleum sinapium	34	Osisifragus	123
Oleum styracinum	55	Ostracites	483
Oleum terebinthinũ	36	Osyris	366
Oliuæ colymbades	87	Othonna	208
Oloschœnos	325	Quorum natura	122
Olusatrum	254	Qui candidum	ibidẽ
Omphacium	404	Oxalme	415
Omphacomelites	419	Oxylapathum	167
Onagra	358	Oxymyr sine	367
Onitis	231	P Aederota	223
Onobrychis	300	Paonia	254
Ononis	223	Paliurus	76
Onosma	289	Palma	92
Onyx	III. & 480	Palma elate	93
Ophioscorodon	187	Palma thebaicæ	92
Ophites lapis	482	Panaces Asclepij	245
Opium	331	Panaces Chironiũ	ibidẽ
Opobalsamum	22	Panaces Heracleum	243
Opopanax	243	Pancration	201
Orbiculata mala	98	Panicum	156
Oreoselinon	253	Papauer corniculatũ	333.
Origanum	231	& sos.	
Origanum syluestre	ibi.	Papauer erraticum	330
Ornithogalum	183	Papaner satium	ibi.
Orobanche	182	Papauer spumeum	334
Oryza	156	Pappi	51
		Papy	

INDEX.

Papyrus	74	Phalaris	295
Paralios	384	Pharicon	506
Pardaliâches	342	Phasiolus	163
Paronychia	326	Phœnicobalanus	92
Parthenium	293	Phœnix	322
Passum	406	Phygus lapis	476
Pastinaca herba	247	Phu	14
Pastinaca marina	115	Phycus marinus	352
Pastinacæ marinæ ict ⁹ no		Phyllitis	278
tæ 531.eius curatio	539	Phyllon	286
Pedicularia	375	Phyteuma	362
Pelecinon	289	Picea	59
Peplis	386	Picis liquidæ fuligo	65
Peplos	ibidem	Pineæ nuces	60
Pepo	179	Pinorū erucæ	125.&498
Periclymenon	311	Pinus	59
Peristereon	328	Piper	191
Persea	108	Piscium ius	119
Perfica mala	98	Pissasphaltos	67
Personata	355	Pisselæon	65
Petasites	ibidem	Pistacia	102
Petroselinum	253	Pityusa	385
Peucedanon	261	Pix liquida	64
Phalangium	278	Pix sicca	66
Phalangij morsus notæ		Plantago	173
530.eius curatio	358	Platanus	72

b

INDEX.

Plumbago	448	Psychotrophon	304
Plumbum elotum	446	Psyllion	336.&502
Plumbum vstum	ibid.	Ptarmica	193
Plumbi recrementũ	447	Pulegium	232
Pnigitis terra	485	Pulegium syluestre	233
Polemonia	308	Pulicaria	336
Polion	279	Puticula	155
Polycnemon	273	Pulmones animalium	120
Polygala	366	Pumex	466
Polygonaton	307	Purpura	110
Polygonon	306	Pygnoconon	391
Polypodion	397	Pyrafter	99
Pompholyx	435	Pyrethrum	258
Populus alba	72	Pyrites	477
Populus nigra	ibidem	Pyrorum genera	99
Porrum capitatum	184	Q Vercus	89
Portulaca	172	Q Quinquefolium	321
Potamogeton	352	R Adicula	194
Poterion	222	R Radix	166
Propolis	152	R Radix dulcis	216
Prunus, pruna	100	R Radix syluestris	167
Pseubobunion	360	R Rana	117
Pseudocafia	16	R Rana palustris	511
Pseudocinnamomum	19	R Ranunculum	203
Pseudodictamnium	234	R Rapum	165
Pforicon	459	R Recondendorum ratio	5

INDEX.

Recrementū argenti	449	Rubus Idæus	320
Resinæ variæ	63	Rumex	167
Resina lentiscina	64	Ruscum	367
Resina liquida è pinu &		Ruta	240
picea	63	Ruta sylvestris	242
Rha	213	S Abina herba	69
Rhamnus	78	Saccharum	150
Rhaphanus	166	Sacra herba	328
Rhaphanus sylvestris	167	Sagapenum	266
Rhaponticum	213	Sal	467
Rheon	ibidem	Salis flos	469
Rhodia radix	323	Salis spuma	468
Rhododendron	344	Salamandra	126. & 499
Rhus	91	Saliuaris	258
Ricinus	381	Saliunca	12
Rosa	81	Salix	86
Rosei pastilli	ibidem	Salvia	234
Rosmarinus	258	Sambucus	390
Rosmarinū corōariū	260	Samia terra	484
Rubeta	511	Samius lapis	ibid.
Rubia	296	Sampsuchum	238
Rubigo ferri	445	Sandaracha	463. & 510
Rubrica fabrilis	457	Sandyx	453
Rubrica Sinopica	ibidē	Sanguinaria	306
Rubus	319	Sanguinaria foemina	307
Rubus canis	77	Sanguis	144

b a

INDEX.

Sanguistauri	509	Scorpij ictus notæ	530.
Sapa	406	eius curatio	538
Sapphirus	481	Securidaca	289
Sarcocolla	269	Sedum magnum	347
Sardianæ glandes	90	Selenites lapis	481
Sardonia	503	Selinusia terra	485
Sarmentitius cinis	472	Semen	155
Satureia	237	Semperuium	347
Satyrion	288	Semperuium minus	348
Satyrion erythroniō ibi.		Senecta anguium	115
Scammonia	387	Senecio	351
Scandix	181	Sepia	115
Schistum lac	129	Seps	127
Schistos lapis	479	Seris	177
Scilla	200	Serpyllum	237
Scincus	127	Sertula Campana	239
Scolopendra	114	Serum lactis	129
Scolopendræ ictus notæ		Sesama	157
530. eius curatio	538	Sesamoides	372
Scolymos	222	Seseli	247
Scordion	280	Seseli Aethiopicum	248
Scorodoprasum	188	Seseli Creticum ibidem	
Scoria plumbi	447	Seseli Peloponnense ibi.	
Scorpioides	400	Setanium	99
Scorpius marinus	113	Sicyonium oleum	31
Scorpius terrestris ibid.		Sideritis	318

INDEX.

Sidion	94	Siligo	155	Sphondylion	260
Siliquæ			97	Sphragis egos	458
Silphium			264	Spina acuta	77
Silurus			118	Spina alba	221
Sylibum			379	Spina arabica	ibidem
Sinapi			188	Spongiæ	474
Sion			175	Spongiarum lapides	482
Sifer			167	Spuma nitri	470
Sifon			248	Spuma salis	468
Sifymbriion vtrunq;			175	Spuma argēti	449.& 510
Sitania			153	Squamma æris	441
Smarides pisces			118	Squāma ex acie decussa	
Smilax	183.& 343.& 503		442		
Smilax aspera			366	Stachys	277
Smilax lævis			367	Staete	50
Smyris lapis			483	Staphis agria	375
Smyrnion			254	Stercus ferri	445
Solanum hortense			336	Stibium	448
Solanum manicum			338	Stimmi	ibidem
Solanū somniferū			ibidē	Stœbe	310
Soncus			177	Stœchas	230
Sorba			100	Stomoma	442
Sory			461	Stratiotes	352
Sparganion			314	Stratiotes millesoliū	ibi.
Spartion			378	Strigmenta balnearum	31
Spatha			93	Struthia coronea	98

INDEX.

Struhion	194	Thracias lapis	479
Styrax	54	Thunnus	119
Succinum	73	Thus	56
Suillus pulmo	120	Thuris cortex	58
Suillus talus	124	Thuris fuligo	59
Sulphur	465	Thuris manna	58
Sycomorus	104	Thyites lapis	480
Symphyton	309	Thymelæa	389
T Alus suis	124	Thymoxalme	415
Tamarix	75	Thymus	236
Taxus	343. & 503	Tilia	78
Tauri sanguis	509	Tithymali	382
Telephion	210	Tordylion	248
Tellinæ	111	Torpedo piscis	114
Terebinthus	62	Toxicon	506
Terebinthina	ibidem	Tragacantha	224
Terra	483	Tragium	324
Terra fornacum	486	Tragoriganum	232
Testæ	485	Tragos	155. & 325
Testiculus canis	287	Tribulus	311
Teucrion, Teucris	274	Trichomanes	365
Thalassomeli	413	Trifolium	278
Thalicttron	351	Trimestria	152
Thapsia	376	Triphyllon	278
Thelygonon	286	Tripolion	363
Thlaspi	189	Triffago	274

INDEX.

Triticum	152	Vinum anethinū	43 ^r
Tuber	183	Vinum apijtes	419
Tussilago	281	Vinum aromatites	428
Typha	283	Vinum asarites	430
V Eneata	513	Vinum bunites	427
Venerisymbilic ⁹	349	Vinum calaminthites	428
Veratrum album	369	Vinum catorchites	422
Veratrum nigrum	370	Vinum cedrinum	423
Verbascum	353	Vinum cedrites	424
Verbenaca	328	Vinum cestrites	427
Vermes terreni	127	Vinū chamædryites	426
Vesparū ic ⁹ curatio	537	Vinum è chamælaea	43 ^r
Vesicaria	337	Vinū chamæpityimū ibi.	
Vetonica	305	Vinum è conyza	428
Victus ratio in morsu ra-		Vinum cupressinum	423
biofi canis	527	Vinum cydonites	418
Vimen	86	Vinum daucites	430
Vina marina	417	Vinum dictamnites	427
Vina picata	424	Vinum è flore falis	43 ^r
Vina resinata	423	Vinum helleborites	432
Vini natura	405	Vinum hyssopites	426
Vinum abiegnum	423	Vinum ex iride	429
Vinum abrotonites	428	Vinum iuniperinum	423
Vinū absintites. 228 &	425	Vinum laurinum	ibid.
Vinum acorites	430	Vinum lentiscinum	421
Vinum adynamon	410	Vinū mādragorites	432

INDEX.

Vinum marathrites	431	Vinum è satureia	428
Vinum è marrubio	427	Vinū scammonites	433
Vinum melites	418	Vinum scillinum	417
Vinum melitites	410	Vinum selinites	431
Vinum melomeli	429	Vinum stœchadites	426
Vinum è myrrha	419	Vinum strobilites	423
Vinum myrsinites	421	Vinum è sycomoris	422
Vinum myrtites	420	Vinum è Syriaca nardo,	
Vinum è nardo syuestri		celtica, malabathro	429
430		Vinum terebinthinum	
Vinum nectarites	429	421	
Vinum œnanthinum	419	Vinum thymites	428
Vinum omphacites	409	Vinum è thymelæa	431
Vinum palmeum	421	Vinū tragoriganites	427
Vinum origanites	428	Viola alba	285
Vinum panacites	430	Viola purpurea	359
Vinum phthorion	431	Viperæ ictus notæ	531.
Vinū è petroselino	ibi.	eius curatio	540
Vinum picatum	424	Viperinæ carnes	114
Vinum pineum	423	Viscum	270
Vinum è pipere	429	Vitis alba	394
Vinum è pulegio	428	Vitis nigra	395
Vinum resinatum	423	Vitis sylvestris	397
Vinum rhoidites	420	Vitis vinifera	401
Vinum rhœtes	ibid.	Vitex	85
Vinum saluiatum	430	Vlmus	73

INDEX.

Vmbilicus veneris	349	Vng.rosaceum	37
Vnedo	101	Vng.sampsuchinum	40
Vnguentorum ratio	36	Vng.styracinum	45
Vng.abrotoninum	41	Vug.susinum	42
Vng.amaracinum	48	Vng.telinum	40
Vng.anethinum	42	Vngula asini	120
Vng.butyrinum	45	Vngulacaprae	ibidem
Vng.cinnamominum	50	Vnguis odoratus	III.
Vng.crocinum	44	Vrina	148
Vng.cyprinum	45	Vrtica	349
Vng.elatinum	38	Vstio contra venenatos	
Vng.gleucinum	48	ictus	526
Vng.hedychroon	49	Vua	402
Vng.iasminum	52	Vua passa	403
Vng.lirinum	46	Vulpinus pulmo	120
Vng.lilinum	42	X Anthion	365
Vng.malabathrinum	52	X Xyphion	313
Vng.megalinum	49	Xylobalsamon	23
Vng.melinum	39	Xylocinamomum	18
Vng.mendesium	50	Xyris	314
Vng.metopion	49	Z Ea, seu semen	155
Vng.narcissinum	44	Z opissa	66
Vng.nardinum	51	Zytum	154
Vng.ociminum	41		
Vng.œnanthinum	39		
Vng.onychinum	45		

FINIS.

b s

INDEX.

INDEX NOMENCLATIO num, quibus officinae Seplafiariorum, & Herbarij nostri temporis vtuntur.

A		B	
A Cacia	83	Bruscus	367
A Agnus castus	85	Bryonia	394
Agrimonia	321	Buglossa	358
Alcanna	77	C	
Alkekengi	337	C Alamentum	235
Aloë	25	C Camomilla	292
Apium	253	Capillus Veneris	364
Apium risus	283	Caprifolium	311
Aphrodilos	198	Cartamus	398
Arabis	190	Cataputia maior	381
Artichault	222	Cataputia minor	385
Aspergula	271	Cauda equina	323
B		Centinodia	306
B Alsamita	175	Cerefolium	181
B Bardana	355	Ceterach	290
Basilicon	182	Choiri	285
Berberis	77	Coloquintida	392
Berusa	175	Consolidamajor	309
Bismalua	297	Cornu cerui	176
Borago	361	Crassula maior	210
Branca vrcina	223	Cucumer asininus	372
		D	

INDEX.

128

D Ragagantum 224

E

E Nula campana 28

E Eupatorium vulgatum 298

F

F Aba inuersa 210

F Filipendula 284

Flammula 308

Fumus terræ 355

G

G Allitrichum 288

G Genista 378

H

H Edera terrestris 361

H Hepatica 326

Herba Iudaica 318

Herba Simeonis 298

Herba tetrahit 318

Hermodactylus 345

I

I Arus 197

I Iringus 225

Iua arthritica 302

Iusquiamus 334

L

Lac. Acca 26

L Lapatium 167

Lappa maior 355

Lappa minor 365

Laureola 368

Lenticula aquæ 347

Lilium conuallium 346

Linaria 366

Lingua hircina 316

Liquiritia 216

M

M Aluauiscus 297

M Malū granatū 93

Mastix 61

Matricaria 293

Matrisylua 311

Melissa 276

Mezreon 389

Milium solis 295

Millefolium 352

Morsus gallinæ 347

N

N Asturtiū aquaticum

175 Nenuphar 289

O

O Robus 163

INDEX.

P		Sicla	17 ²
P Apauer cornutū	333	Sigillum Salomonis	307
Papauerrubrum	330	Silermontanum	247
Parietaria	346	Solatrum	336
Perforata	300	Sparagus	173
Perficaria	286	Spelta	155
Pes columbinus	283	Squilla	200
Petroselinum	253	Squinantum	21
Piperitis	203	Stichas Arabica	230
Plantago aquatica	299	Stœchas citrina	327
Polytricon	365	Sumach	91
Prasinum foetidum	276	T	
Pulicaria	284	T Amariscus	75
R		Tapfus barbatus	353
R Esta bouis	223	Terpentina	62
Reuponticum	216	V	
Rosttrum porcinum	177	V Ermicularis	348
Rubia tinctorum	296	Vicia syluestris	184
S		Vincam peruinca	307
S Aponaria	199	Virga pastoris	220
Satyrion	287	Vngula caballina.	281
Scariola	177	F I N I S.	
Scrofularia minor	208		

EPITAPHIUM
Ioannis Ruellij, Dionysio
Corronio au-
thore.

Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:

In quo naturæ notitia, atque poli.

In quo prima fuit dos, Grauius vertere scripta

In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.

Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,

Premiaq; illa sui grata laboris habet.

NAENIA IN OBITU
RUELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,
Constiteratq; alti clarus in arce patris.
Cum perisset hominẽ rara Mors, ait, Ecce triumphe
Clamet io, cui cui victima grata cadit.
Vicinus, en nostras toties qui eluserat arteis,
Qui toties mortem vicerat, interijt.
Ast vbi in ore virum versari auditq; videtq;
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.
Cui Paen, quibus ortus erat mihi redditur astris,
Quemq; putas victum, lina trophæa refert.
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:
Alter, quod moriens nunc quoq; mille rapit:
Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,
Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.
Cetera quid memorem victuri scripta laboris,
Naturam & stirpes, pharmacaq; omne genus?
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,
Nullaq; vitæ hominis commoda præterijt,
Quæ non tractarit, sapientibus edita Græcis,
Quæ non reldiderit, vel meliora suis.
Utq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis
A mille haud quisquam tantu opus ingenij.

FINIS.


P E D A N I I
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia, libri

primi præfatio,

Ioanne R V E L L I O Sueffionensi
interprete.



V A N Q V A M amicissime
Arce, complures non veterum mo-
do, sed recentiorum quoq; de medi-
camētorum compositione, viribus,
atq; probatione commentati sunt:
nobis tamen nec vanum, nec à ratione abhorrentē
impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostende-
re tentabimus: quòd eorum nonnulli absolutum ni-
hil ediderunt, alij quàm plurima, quæ auditu per-
cunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siqui-
dem Bithymus Iolas & Heraclides Tarentinus, o-
missa prorsus herbarū tractatione, rem sanè quàm
paucis perstrinxerunt. Neq; verò omnes illi de me-
tallicis quicquam rebus aut odoramentis memoriæ
prodiderūt. Crateus autē herbarius, & Andreas
medicus, qui cæteris diligentius hac in parte versa-
ri vidētur, radices multas apprimè vtileis, herbas-
quæ haud quaquā adnotatas, reliquerūt. Verunta-
men

me priscorum subscribere oportet sententijs quos, etsi
 pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen
 impendisse diligentiam constat. In moribus minus
 assentiendum: e quibus Iulius Bassus, & Nicera-
 tus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadae
 omnes, medicinalem materiam vernaculam cogni-
 tamq; vulgo, dignam censuerunt, quae ab ipsis lite-
 ris exacte mandaretur: & ut medicamentorum vi-
 res probationesq; cursim complexi, sic nullo experi-
 mento eorum effectus colligentes, inani verò red-
 dentiarum causarum studio verba fundentes, alia
 pro alijs scriptitando, rem in acervum congeriemq;
 controuersiarum extulerunt. Siquidem, qui inter
 eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascenti-
 tis in Italia, chamaeleae succum esse contendit:
 androsomonq; eandem herbam cum hyperico esse.
 quinetiam aloen in Iudaea fossilem nasci, & ple-
 raque his similia exponit, reclamante euidentia,
 quae prorsus veritati refragantur. Quibus con-
 iectura colligi potest, ea non oculata fide, sed nar-
 ratione potius ab alijs accepisse. In ordine idem
 ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nul-
 laq; cognatione coniunctas vireis collidentes: par-
 tim per elementa literarum scripta in ordinem di-
 gerentes, quod facilius memoria manularetur, ge-
 nera & eorum effectus à sua cognatione disun-
 gentes. Nos verò ab iuuentute, ut ita dicam, iuuen-
 ta, ingi desiderio cognoscendae materiae allekti,
 permul

Dioscori-
 dis cogno-
 scendorum
 simpliciū
 studium

permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militare vitam exegisse) tuo hortatu cōmentationē in sex libros contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cū in omnibus eruditione exultos, tum verò in eos quibus cum tibi eiuslē artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiaē esse soles: in nos etiā aliquāto peculiaris. Enumuero non parum praebet tuae probitatis argumentum, optimi viri Licijū Bassi singularis erga te amicitia: quam vnā nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter vos beneuolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visu ipsi exactissime cognouimus: quaedam etiam ex e. i. de qua inter cunctos conuenit hīstoria, per cūctationeq; rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operā, ut differētī ab alijs ordine tradito, genera medicinarum viresq; describantur. Quod autem necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est fermē qui ignoret. quod ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius partibus efficax administrari auxiliū. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extēdi, & incre-

A

mentum capeſſere poteſt, quàm plurimum confe-
rente ſingulorum medicaminũ cognitione. Quin-
etiam vernaculam familiaremq; materiã cõple-
ctemur, vt perfecta ſit quæ à nobis relinquetur do-
ctrina. Verũ in primis curã impendere oportet, vt
ſuis tẽporibus ſingula & demetãtur & recõdan-
tur. ceriẽ pro horũ ratione aut valẽt viribus, aut
euando nulloq; munere funguntur. Serena igitur
cœli conſtitutione demetenda ſunt. Magni ſiquidẽ
refert inter colligendũ, ſi vel ſqualores vel imbres
infeſti ſint: quemadmodum ſi loca, in quibus pro-
deunt, cliuofa, & ventis expoſita ſint et perflata,
frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis vi-
res eorum longẽ validiores intelliguntur. Contrã,
quæ in cãpeſtribus, riguis, & opacis, cæterisq; lo-
cis à vento ſilentibus enaſcuntur, plerunq; degene-
rant, & minus viribus valent: multoq; magis, ſi
non ſuo tẽpore nec opportunẽ colligãtur, aut ſi per
imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandũ, ſæ-
pe pro peculiari loci natura, aut anni clementia,
maturius aut ſerius adoleſcere. Nonnulla pro-
pria vt, hycme florent & folia pariunt: quædam

Plantæ, vt bis anno florifera. Quare cui in animo eſt horum
exactẽ co- peritiã aſſequi, neceſſẽ eſt eum prima germina-
gnoſcant, tione ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibus
omni tem- tione ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibus
pore inſpi, aſſeſſe. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat ad-
ciendæ. ſliterit, adultam cognoscere non poteſt: neque qui
adultam tantum inſpexerit, nuper erumpentem

noſ

noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum varietates non perspexerint, magno in errore versentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusilaginem emittere flores, fructum & caulem negant. Ergo qui sepius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum convenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, ingram, & candidum multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae verò fruticosa sunt, sicut stachas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine praegnantia demetantur. flores quoque antea, quam sponte sua decidant. fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est. & semina, ubi siccari ceperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipiantur, iuciso per summum adolescentiae vigorem caule. Radices, & linguamenta, corticesve ut recondantur, eximere convenit eum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatae inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quae luto aut pulvere sunt obsitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae incudum

DIOSCORIDIS

odore efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, apte involuuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur: & lignea, praesertim è buxo: sed aenea vasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs quae aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagneis vasis recondi conuenit.

Iris.

C A P. I.



R I S à celestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora.

Flores in caule aequalibus inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, *lutei, purpurei, aut caerulei conspiciuntur: quae diuersi coloris specie, quaedam celestis arcus imago representari videtur. Radices subiacent geniculatae, *durae, odoratae: quae frustatim dissectae, in umbra siccantur, & traiectae lino recocluntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quae pumila ferè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, *gustu amaro, odore per quam sincero, ita feruentiore. ut nullum prorsus solum redoleat: quae dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha-

bet

μῆλινά,
non μέλα-
να.

*σεραί, id
est, solidae,

*τῆ γύσφι

πυρωτέρα,

id est, gustu

feruentiore.

bet Africana, cādicans, guſtuq; amara. Teredines in vetuſtate ſentiunt, tūc tamen odoratiores reddi ſolent. Viſ omnibus excaľfactoria, extenuās, cōtra tuſſim efficax: humorū qui aegrē reuēciūtur craſſi- tiem digerunt, bilem craſſamq; pituitā ex hydro melite drachmis ſeptem epotā purgant, ſomnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potā ex aceto auxiliantur ſerpētium icſti- bus, lienosis, cōuulſis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura eſfluit: menſes ex vino potā pellunt. Decoſtum earum, ſxminarū fotibus vti- liter imponitur, ad emolliendos locos, laxādaq; in eis venarum ſpiracula, iſchiadicis infunditur, fi- ſtulis ac ſinus carne explet. Radices ex melle glan- dis modo ſubditā, partus extrahunt: quinetiā co- ſtā & illitā, ſtrumas, veteresq; duritias emol- liunt. Siccā quoq; vlcera replent, & cū melle pur- gant: nudata oſſa corpore operiunt: doloribus ca- pitis, cum aceto & roſaceo magna vtilitate illi- muntur. Admotā cū albo veratro & duabus mel- lis partibus, lēignus & vitia cutis in facie à ſole contracta emaculat: peſſis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuerſum, magni ad omnia vſus.

ANNOTATIO.

Cenſetur Galanga officinarum. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam vulgus herba- riorum in hoc nomine ſolet indicare.

Acorum.

CAP. II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum aetas, & summo cepite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. radici vis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienem absument, urinae stillicidio & serpentum ichibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur,

* Plinius aniso habet: ac sic etiam Mar-
cello in comento. teste, Græci qui-
dam vetustissimi co-
dices, quæ-
diversitas
facit, ut
qualis her-
ba sit Me-
on, non fa-
cile quis con-
iecerit,

oculorum caligines succo discutit, antidotis radix
magno usu commiscetur.

Meon.

CAP. III.

Meon, quod Athamanticum vocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, * anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. bi-
nam ferme cubitorum altitudine attollitur, spar-
sis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenui-
bus, odoratis, linguam excalfaciunt. Quæ fer-
facit, ut usæ ex aqua, vel trita citra coctionem, præ-
clusorum renu vesicæque; farctæ vitia potu leniunt,
urinae difficultati medentur, stomachi inflationes
discutunt. Torminibus, affectæ vulvæ, articulorum
doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle

in eclegmate auxiliatur, sanguine per menstrua pellunt, de sessionibus feruefacta: infantibus autem illita imo vetrici, vrinas mouet: quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus. CAP. IIII.

Cypirus, quē aliqui erysiceptrum, vt aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, oleis oblongis similes: aut rotundae, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauisima, densa, fractu cotumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quae à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat, vrinam ciet, ad calculos aquamque subter cutem vtilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, perfrictionibus vuluae, & praecclusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra vlcera oris etiam si depascent vorenque, farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & vnguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod māducatum croci vim redcit, gustu amaro sentitur, & illud praesentē psilothri vim exhibet.

Cardamomum. CAP. V.

Cardamomum optimum est, quod ex Coma-
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in In-
dia quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet pleniū,
frangenti contumax, occlusum, fractumq; (quod
enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) &
gustū acre, subamarum, & odore caput tentans.
Excalfactoriam vim habet, potumq; ex aqua fa-
cit ad comitiales, Ischiadicos, tussēs, neruorum re-
solutionem. Item ad rupta, vulsa, tormina: latus
ventris tineas excutit. Ex vino autē potū, remibus,
difficultati vrinae, à scorpione iclis, neque non o-
mnibus venenū vibrantibus, auxilio est Cum cor-
tice radicis lauri epota drachma calculos commi-
nuit, partus suffitu enecat, scabiem ex aceto illitū
adimit. Et ad vnguentorum spissamēta additur.

Nardum. CAP. VI.

Duo nardi genera. vnum Indicum, alterum
Syriacum appellatur, non quòd in Syria
proueniat, sed quòd montis in quo oritur, pars
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex
hoc Syriaci genere praeipuum est recēs & leue,
largam gerens comam, flauum colore, perquā
odoratū, ac cyperum redolens, breui spica, ama-
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-
ris gratia permaneat. Ex Indicis autem nar-
dum quoddam Gangitis vocatur, à fluuio Gāge,
apud quem enascitur, montē praterfluente: quod
gen

genus ob multam loci, in quo prodit, viginem, viribus infirmius est, atque procerius adolescit plures ferens spicas ab vnica radice comosas, vnaq; conuolutas, ac grauitè olentes. Mōtanum autem odoratiū, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens Syriaci clotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum virus supra modum redolēte: quod improbat. Malefactum vendi solet: quod vitium ex eo deprehēditur, quod candida sit spica, & squalida, & nulloq; puluere obsita. Adulteratur stibio cū aqua aut palmeo vino, inspissationis pōderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si lutum radicibus insideat, & χονῦ, id incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus est, et quod vtilem. Vim habent excafactoriam, & exiccant-natiua caccantem. Urinam mouent, alium potu sistūt, vultus reat lanuue profluvia, sanienq; apposita supprimūt. Nau gine. seæ ex aqua frigida auxiliātur, & stomachi rossonibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incocta fotu ad infessum, vultus inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas valent: siquidem eas ad densiorem pilum reducūt. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in sicclī nouo nō picato ad ocularia medicamenta recondūtur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nardum Celticum. CAP. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria alpibus, saluoca patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido florem luteum. Cauliculorum & radicū duntaxat vsus est, et odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exēpta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem vtile, cum accroso alienoq; propter humoris vim, nō excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neq; odorata, vti verum nardum est. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digeruntq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, assernari debent. Laudatur maximè recens, iucūdi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadē, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho vtilius est. Inflammationibus iocineris, et felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus li. nem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malignata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Hirculus
herba.

Mon

Montanum nardum. CAP. VIII.

Montanū nardū, quod ab aliquibus thylactis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo et folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Ad eadem ad quæ Celticum efficax.

ANNOTATIO.

*Minoribus]. Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendū suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, mollioribus habet: quod sanè vtrunq; herbæ, quàm aptissimè quadrat.

*Cytino hyoscyami.] Id est, florū hyoscyami, qui veri cytini, quem domesticæ punicæ florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, vt in eius descriptione author Dioscorides.

Asarum.

CAP. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant: hederæ folijs & minoribus multò, rotundioribusq;, floribus & cytino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. [Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles] radices numerosas, geniculatas, te- Græco.
mes,

nues, obliquas, graminum non dissimiles, longè tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, & quæ linguam vehementer mordet. Excalfactoriam vim habet: urinam cit, hydropicis & vetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosus montibus prouult, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Iustinensi agro.

ANNOTATIO.

*Maioribus Rectius fortè minoribus legas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siquidè Valerianæ nunc dictæ, quam Phu esse omnes ferè suspicatur, Narcissum effigie expressissimè quidem referunt, eo tamè longè sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandū censeas.

Phu.

CAP. X.

*Hippocrene
lini.

PHu, quod & aliqui sylvestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio *olusatris, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, laui, cano, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, *maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextus, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum

ema

amulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad lateris etiã dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficiũ deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum.

CAP. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indi ci nardi folium, falsi quoddã odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum plu, asarum, niris. secus autem res se habet. Nanq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsiunt, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humi aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recēs, ex candido nigricans, integrũ, nec fragile, odore caput feriēs: quod dum n. suavi odore permaneat, & nardũ sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmis verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Eadem nardo sortitur vires, sed efficacius omnia præstat. Urinam vehemētius ciēt, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritũ & in vino feruefactum cōmode illinitur: subditũ linguæ, oris halitũ & suauitatē cōmendat. Vestium quoq; odorē interpo-

terpositum seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia.

CAP. XII.

Cassia, cuius cōplura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescēs, pulchri coloris, coralli amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordēs & * cum aliquāto feruore astringens, aromatica, vinoso odore cuiusmodi est, quæ ab incolis, achi appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricās, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundū locū tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasō, id est germi, cognomē est. Reliquæ viles, et quæ * aplyxemū dicitur, nigra, * Græcus est. insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, * aplyxemū cittovocatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quā ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, haren- temq; medullæ corticē habeat. Inuenitur etiā lata quæclā fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Dānatur canticās. scabra, hirci- num

* μῆλ
πολλὰς. i.
cū multo.

* Græcus
απλῆμο

hum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam cieiendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamēta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia cōcinnantur, & ad malagmata. Lentiginēs tollit cū melle illita, mēses trahit, cōtra vipera rū iētus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflāmatiōes omneis et renis vitia, pota proficit. Fæmīnis in solio desidētibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationē vuluæ. Ea duplo pōdere medicamētis mixta, cinnamomi vicē supplet, si ipsum desit: nā eosdē effectus præbet, ad plurima perquā vtilis.

Cinnamomum. CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassia, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereū vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquā incundē, olens. Optimi ferè iudicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadantenus salsum, quod nō citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus, tamen intervodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: namque fragmenta miscel-
lanea

lanea quaedam esse videntur. Quæ autem melius
 spirant, suo halitu cum nares primū consulūtur,
 olfactū expleant, ceterioris dignotionē impediūt.
 Est etiam montanum, crassum, pumilum, fulue-
 scens admodum. Tertium à Mosylitico, perquā
 suauiter olet, nigrū, fruticosum, paucis interceden-
 tibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans,
 aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam ha-
 bens radicem, quæ cassiam planē representat.
 Quintū genus, odore nares feriens, subrufum, &
 cortice fuluæ cassiæ simile, tangētī firmum, minus
 neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ thuris,
 cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus
 suauitatis inest. Deligito scabrum, albū, rugosum:
 at læue, & lignosum circa radicē, ut inutile reij-
 cito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinna-
 momo cognomen est, vile, inualidi odoris, soluta-
 rumq; virium. Vocatur etiam Zingiber, cum ta-
 men sit xylocinnamomum, præbens quandam cin-
 namomi faciem. Est autē lignosum cinnamomū,
 sarmenta longa roliū aq; ferens, odore longē cin-
 namomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à
 cinnamomo genere differre dicant, quod à natura
 eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit,
 emollit, & cōcoquit, urinam ciet: tā mēses, quā
 partus potū aut ex myrrha impositum pellit, con-
 tra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaq; con-
 uenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem
 discutit.

discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renū vitia, & vrinae difficultatem efficax est, vnguētis pretiosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui ^{Desunt in} pseudocinnamomum appellant, perquam denso ^{Græco.} atq; crasso sarmento, longè tamen inualidius cinnamomo, & odore, & gustu.]

Amomum. CAP. XIII.

AMomum exiguè fruticat, ex ligno se conuolvens in racemi modum, flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs & vitis allæ similibus. Lauda- & bryoniæ. tur, quàm maximè Armeniacū & fuluo auri co- & χρυσίον lore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā τὸ χρόον, id in campestribus, & aquosis erascitur, infirmius est, colore esse constat. Est autè magnū, subuiride, tactu te- aurum iminerum, frutice venoso, odore origani. Ponticum tans. verò subrusum, parū, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec astriclum cohæreat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur: seminis plenum, vuis paruis simile, graue, valde odoratū, modò cariem nō contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnū al-

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq;: inuat quos scorpius percussit, ex ocymo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerumq; lenit ex: vna passa, ad vulnarum vitia in pestis, aut in sessionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagrie, potu convenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguētis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmēta fugienda sunt: eligēda autē, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus.

C A P. X V.

PRæcellit Arabicus, candidus, lenis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, lenis, vber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à tereclimibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalectorica, urinā ciet, menses pellit, vitis quæ vuluam malè habent, tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris tæneas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium

brum acceſſiones, & neruorum reſolutionibus obliuitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admiſtis helenij comagſni præduris radicibus, adulterent, quod deprehenſu facile eſt: ſiquidem neq; guſtu feruet he lenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare poſſit.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia naſcitur. Laudatiſſimus ex Nabathæa: proſquiman-
ximus Arabicus, quẽ aliqui Babylonij cognomi-
nant, alij teuchitin. peſſimus ex Africa, Eligendus
eſt rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubenti-
bus fragmẽtis, qui manibus confricãdo roſæ odo-
rẽ emittit, igneæ mordacitatis ad linguã. Floris,
culmoriũ, radicisq; eſt uſus. Vim vrine ciũde ha-
bet, menſes pellit, diſcutit inflammationes, caput
aggrauat, modicẽ aſtringit, cõminuit, excoquit, ac
venarũ ſpiracula laxat. Flos eius in potu utilis
ſanguinẽ reijcentibus, doloribus ſtomachi, pulmo-
nis, iocineris, & renũ, miſcetur antidotis. Radix
aſtringentior eſt: ideo faſtidys ſtomachi, hydro-
pici, conuulſis, drachma vna cum pari pondere
piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ
inflammationibus, ad deſidentiũ fetus, vtile eſt.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

Calamus odoratus in India naſcitur: me-
lior eſt fuluus, denſe geniculatus, & qui

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet. Quare cum graminis aut apii semine coctus, in aqua subter cutem fusæ morbo, renum vitis, stillicidio urinae, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagmatibusq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. CAP. XVIII.

*Marcel-
lo locus
hic suspe-
ctus,

Balsamum, arbor & albæ violæ, lycii, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium ruta proximum longè candidius, perpetuò virens: in Iudæa solis quadam valle & Aegypto nascens. his differens modis: scabritia proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demesile: fortassis quoniã ob gracilitatē facile demetatur. Aestivis sub ortu Canis ardoribus, arbor unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatis, ut annis singulis, ne plures quidē quàm seni septemve congij cogantur, inibiq; pòdus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, nō ad acorē vergens, dilui facilis, lenis, astringens, ac modicè mordēs gustu. Sed variè vitatur, misto
ab

ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: itē susino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficiū facile deprehēditur. Nāq; merus in laneam vestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: vitiatum autem inhaeret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua aut lacte celerrimē liquatur, coloreq; lacte scit: vitiatum verò olei modo innatat, se cōvoluens, aut in stellæ modū diffundens. Syncerus senescēs crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinātur, qui aqua concretū pessum ire, & ad ima sedere arbitrātur, postea dissipatū supernatare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant, probatur recēs, sarmento tenui, fuluū, odoratū, quadāntenus opobalsamū spirans. Necessarius etiam seminis erumpit vsus, quare eligatur flauū, plenū, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicē opobalsamū olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido deferitur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quā maximē cāl faciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt, medetur perfrictionibus vuluæ cum rosaceo cerato appositus: menses quoque, secundas & partus extrahit, horrores illitu discutit, vlcera sordida expurgat & cruda concoquit, vrinam potu ciet, agrē spirantibus prodest: datur

in lacte contra aconitū haustum, aut serpentini
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidoti.
In summa, precipua authoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semē commodē potui dati
doloribus lateris, pulmonum vitijis, tussi, ischiadi-
cis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, urin-
difficultati, torminibus ac serpentum morsibus
ad muliebres suffitus perquā utile est: vuluan
aperit in defensionibus balnearum decoctum, &
humorem euocat. Lignum easdem habet vires
aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus
torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitula-
tur, urinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Ir-
conuenit, squammas ossium extrahit, & ad vn-
guentorum spissamenta additur.

Aspalathus.

CAP. XIX.

*ξυλώδης **A**spalathus, alijs ergisiceptron, frutex est
*surculosus, multis spinis horres. nascitur
id est, ligno in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula:
sus.
quo ad vnguentorū spissamenta pigmetarij vtun-
tur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens,
aut in purpurā vergens, densus, odoratus, gūsta-
tu amarus. Est & alterum genus candidū, ligno-
sum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfa-
ciendi cum astrictione obtinet. vnde decoctum cū
vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit, ad
nomas genitalium, et sordida vlcera infunditur:
subiectum in pessa, partum extrahit, aluum sistit
eius

ius decoctum: & sanguinis reiectionem potu co-
hibet, vrinae difficultatem inflationesq; discutit.

Musculus.

CAP. XX.

Bryon, id est musculus, à quibusdā splachnō ap-
pellatur: in cedro arbore, populo alba, et quer-
cu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum
populneum: in quo genere cādidum & odoratius
præstat, nigricans improbat. Astringendi vim
habet. Decoctū insidentiū vuluis vtile: vngueto ha-
lanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymia-
matum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

Agallochum, lignum est quod ex India at- Putatur li-
quæ Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, gnū aloës
maculatū, odoratum, gustu astringens, cum qua- officinarū.
dam amaritudine, cute verius quā cortice vesti-
tur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut de-
cocto os colluitur, commendandi halitus gratia.
Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure
ad suffimēta substituitur. Radix epota drachmæ
vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbe-
cillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocine-
risve dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina
infestant, ex aqua libere prodest.

Narcaphthuni.

CAP. XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum,
simile sycomori libro: quod incundi odo-
ris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-

B 4

positis: constrictiombus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

Videtur **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myr-
quibusdam **C**rrhae quodāmodo similis, virosi gustus, quam
Lacca offi- ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace
cinarum. & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere
extenuandi obesos, si ternū obolorū pondere ex
aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur, lie-
nosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cū
aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim
emendat, vino madefactū medetur eorundē he-
betudinibus, aduersus gingiuas humore pragnā-
teis, doloreisq; dentium, non aliud efficacius.

Cyphi. CAP. XXIII.

Cyphi odorati suffimenti compositio est, dica-
ta dīs, qua abundē Aegyptū sacerdotes vtū-
tur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in
potu. Permulta componendi rationes, quarum
vna hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium,
cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vuae
passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duode-
cim: resinæ repurgatæ minas quinque: calami &
iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum mi-
nam: myrrhæ duodecim: vini veteris sextarios
nouem, cum duabus mellis minis: vnam pas-
sam detractis vinaceis tusam, cum vino & myr-
rha subigito: cætera tusa & cribrata ady cito, die
vno humorem combibere finito, dein mel coquito
dum

dum sibi glutinis asciscat crassitudinē, eliquatam resinam accuratē permisceto cū reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

Crocum. CAP. XXV.

Crocum, optimum in medendi vsu Coryceū, crecens, & boni coloris, paulum candidi generens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractū est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfunsum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è mōte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicū & Centuripinum inter Sicilica omniaviribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuatque etiam sapæ subluu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficiū declarat insidens pulvis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet: urinam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passa

B 5

biberint crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorū causa temperantur: ad vuluæ etiā sedūq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerē stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularis collectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix ex passō pota. Fit etiā expressis vnguenti crocini odoramētis, & in formas digestis, quod crocomagma vocant. Optimū est odoratum, modicē myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, laue, subamarum, quod macle factū croci colorem reddat, gustatumq; vehementer dentes ac linguā

* Rectius inscit, * multis durans annis, quale est quod a Sy Marcellus ria deferitur. Habet suas vires ad delenda quæ aliquot ho ligninem oculis obuersione: vrinam cit, calfacit, conras perma coquit, & emollit. vires croci proportionem quante co- damtenus representat, quandoquidem plurimamlore. croci partem sibi crocomagma vendicat.

Vulgò Emu

Helenium.

C A P. XXVI.

la capana.

* ἐν ὄρεσι τοῖς ἁγίοις. Helenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis nō emittit: radicē subalbā, interdū sub-rufam, odoratā, subacrem, vegetam, magnam, ex id est, in qua agnatæ propagines liliorū aut arimodo serun motosis ac tur. * Montibus in vmbrosis, siccoq; solo prouenit. opacis. Foditur æstare radix, & articulatimq; dissecta sic calur.

catur. Potum radicis decoctū m nses & vrinas
ciēt. ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tuſſi, or
thopnoea, ruptis, conuulsis, inflationibus, & ser
pentium morsibus. In summa excalfaciens. Folia
ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur. Hele
num stomacho vtile in passo conditum: siquidem
salgarnarij paululum siccata radice, mox de
coctam, & frigida aqua madefactam, in sapam
coniūciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad
cruentis excreationes efficax est. Alterum beleny
genus in Aegypto gigni Crateuas tradit: herba
est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum
repētibus, folijs lenticulae circa ramos, sed longiori
bus crebrisq; , radice pallida, digiti minoris crassi
tudine per ima tenui, supernè crassiore, cortice ni
gro. Nascur in maritimis collibusq; . Radix vna
in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinū oleumq; . CAP. XXVII.

Oleum quod ex immaturis oliuis exprimi
tur, ad multos vsus rectè valentibus accom
modatissimum: omphacinum id appellatur. Præ
stat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale
vnguentorum compositionibus idoneum intelli
gitur. Stomacho vtile est quod astringat: gingi
uas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore,
sudores cohibet, & quò vetustius ac pinguius, eò
ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in com
mune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ven
trem,

trē, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; prōptius ad obeūda munera reddit, aliū emollit, vlcerantiū venenorū vires permistū hebetat, contra venena datur, assidue potū redditumq; vomitionibus, soluit aliū heminae mensura cū pari ptisana succo aut aqua potū, ad tormina calidū simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, vētris animalia pellit, idem maximē ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorū claritati subtilū confert. Si vetustū nō sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, vt vetustatē representet.

Oleum siluestris Oliuæ.

CAP. XXVIII.

Oleum quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer astringit, & ad sanorū vsus secundum sibi locū vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluētes capillos inhibet, furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, lepr. usq; abstergit: tardius curationē sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo vetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quoq; die concha refunditur: ex altoq; demittitur, vt assidua deuolutione, icluq; agitatum respumet: octaua die fenum græcū mundū quinquaginta denariorū pondere, calida aqua madefact

factum donec emolleſcat, in ſupradictū oleū deij-
citur, ita ne extillet aqua: poſtea teda præpinguis
piceæ, aſſulatiſſe æquale pōdus adijcitur, &
transactis oſto diebus, oleū concha mouetur. Vbi
candorem contraxerit, in vas nouum veteri vino
aſſuſum recōdi debet, ſubſtratiſſe ſertulæ Campa-
næ corollis drachmas vntecim pendentibus, cum
pari iridis pōdere: ſi minus, rursus ſoli mandā-
dum, & idē munus obeundū, vſq; dū inalbeſcat.

Sicyonium. CAP. XXIX.

Sicyoniū componendi ratio hæc eſt: In lebetem
ſoris lati ſtanno induclum, funditur olei al-
bi quod cruda oliuæ reddiderunt, congius vnus,
aqua ſemicongius: leui id igne coquitur, leuiter
mouendo: at vbi his efferbuit, & ſubtracto igne
refrixit, innatans oleum concha decapulatur, &
adieſta noua aqua conferueſcit, & reliquis vt di-
xiſus peractis reponitur. In Sicyonia maximè
fieri conſueuit, Sicyoniū inde accepto cognomine.
Calfactōriam ad quendam vſq; modum vim ha-
bet. Febri ac neruorum vitij prodeſt. ſceminæ ad
commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

Strigmenta Balnearū. CAP. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciūt, molliunt, di-
ſcutiūt: ad ſedis rimas & cōdylomata illinū-
tur. Illa verò quæ ex palæſtris pulnerē ſibi aſciue-
runt, in ſordis ſpeciē redacta, articulorum nodos
impoſita adiuvant: iſchiadicis inſotus aut mala-
gma

gmatū locū, calida cōmodē sufficiuntur. Deraſe gymnaſiorū parietibus ſimulacrisq; ſordes, calfaciūt: tubercula, quæ agrē ad coctionē perducūtur, diſſipāt: deſquāmatis & vlceribus ſenū proſunt.

Elæomeli.

CAP. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodā caudice manat, oleū melle craſſius, ſapore dulci. Bilē, cruditatesq; detrahit, ſextario cum una aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcūt, & viribus deſciuntur: quod minimē vererī oportet, verū crebro excitare, ne veterno preſſi ſomnos capiēt. Fit & oleū ē pinguitudine ſurculorū oleæ: optimū vetus craſſum, pingue, nō turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorū illinitur: lepras, neruorūq; dolores illitum emēdas.

Cicinum oleum.

CAP. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Matu-
ri ricinū quæ volēs quātitate torrido ſole flaeſcunt, & vuarum more inſtrati tantisper inſolantur, dum veſtiēs cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquam habeat, demittitur, ſubiecſtoq; igni ferueſcunt: & ubi inſitum prorsus humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſē, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit uſus, longē ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos mola mandant, & accurate molitos per ſpora

sportulam torculo exprimūt. Tum quidem ematuruerūt ricini, cum cōtinentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis atque praeclusis: item iudecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

AMygdalinum oleum, quod aliqui metopiū vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tūdatur in offis, aqua quae ferbuerit sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quā antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsīt, cōcha excipitur. Pressis nucibus rursū hemina aquae inspergitur, & postquā ebiberint, idem opus proseguendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundē locorū inflammationes efficax est: vitij renū, calculosis, difficili vrinae, suspiciosi, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas, & vitia cutis tollit ē facie, & eam erugat cū melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & furfures cū vino abstergit.

Bal

Balaninum. CAP. XXXIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Alium soluit, stomacho aduersatur, contra
aurium dolore, sonos, & tinnitus auxilio est, cum
anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio.
Fit etiam de nuce iuglande oleum, quod caryinum
vocant. Eandem vim habet quam Balaninum.

Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

Hyoscyaminum sic fit: Semen candidum, recens
siccum tunditur, & calida aspergitur
aqua, ut in amygdalino diximus. dumque insola-
tur, siccata, quae sub manu sunt, partes cum reliqua
massa permisceantur: hoc in ante fieri oportet dum
nigrescat & grauitur oleat: mox pressum atque
excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax
est, pessis miscetur, ad emolliendum utile. Fit & de
grano gnidio purgato & iuso. Vis ei alium solue-
re potius. Non secus cnicinum oleum temperatur: cui
facultas eadem est quae faelo de gnidio grano, verum
inualidior. Rhabbaninum de raphani semine fieri
solet, ceterorum more. Phthiriasis mala valetudine
contractas tollit, scabritias cutis in facie emendat.
Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem
quod rhabbaninum potest. Tritum sinapis semen, &
calida aqua madefactum, adiecto postea oleo expri-
mitur. Id ad diuturnos dolores efficax est, trans-
feri humores qui in aliqua parte conuenerunt.

Myr

Mirteum. CAP. XXXVI.

Mirtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra syluestri, aut satina, foliorum mollissima queque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus infernescunt donec concoquantur, innatans oleū deraditur. Sed longè facilior hæc cōpositio: Tenera folia cōtusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleū folia in sole macerāt: alij prius oleū inspissāt malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarū gustū & oleosum, viride, trās lucēs, & olens myrtū. Astringit & indurat, ideō medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularū eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores cōpescit, & omnia quæ astringionem inspissationemq; desiderant.

Laurinum. CAP. XXXVII.

Laurnū fit hoc modo: Lauri bacce cū matu-
re sunt, in aqua coquuntur: siquidē ex obdu-
elo cortice quandā pinguitudinē reddūt, quæ ma-
nibus subacta concha excipitur. Alij omphacinū
prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo in-
spissant, deinde tenera lauri folia concoquunt. alij
etiam baccas, donec oleum odorem cōtraxerit. alij
styracem & myrtum addūt. Optima laurus ad

C

id latifolia & montana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quòque viridius colore, amarissimum, & acris. Vis ei excalearia, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud inuantiùs: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiè iumentorù canumq; sanat: vtilissimum pestis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

Mastichinù è trita sit mastiche, quod còtra omnia vuluè mala efficax est: mediocriter calfacit, astringit. et emollit. Aduersus prominetes stomachi duritias, cæliacorù, dysenteriorùq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorù compositio. CAP. XL.

È ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quòdquidem ea in nonnullis corporù vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt, in quorum probationibus còsule-

re nares oportet, an ea oleant ex quibus tēperantur. Optimum huiusmodi iudiciū, quod in quibusdam planè obseruari nō potest, propter ea quæ admiscuntur odore cæteris præualentia: ut in amacino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum. CAP. XLI.

Rosaceum sic fit: Iunci odorati quinq; libras & bessē tūdito, & subactas aqua in viginii olei libris & quincūce subinde mouēdo, coquito: dūq; percolaueris, in olei libras viginti & quincūce, adycito rosas nō madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidē moueto, interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementū pessum ierit, mutato vase, in craterē melle illitum recondito. Cæterū rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellū demittito, & affusis octo libris & quadrāte spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsq; quartāsve perfusiones infundēs exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si verò secundam infusionem instituire libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inycito: manibus melle præmadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recenteis rosas detra-

Etis vnguibus immittito: fiet enim ita oleum multo validius: nā septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrūpet. Alij autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerāt in solo hoc modo: Rose quæ selibrā pondere equāt, in sextario olei diebus octo madescūt & vsq; tertiam perfusionē quadraginta diebus insolantur, & sic oleū reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscēt, & salem, quò minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus vtile. Potius soluit aluum, stomachi ardorem restringit, vlcera caua replet & muicet, quæ cacoëthe vocātur: vlceribus in capite manantibus, atq; feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitū efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulvas vtilissimè subiicitur.

Elatinum. CAP. XLIII.

FRacta elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacium oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus recunditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

Met

Melinum. CAP. XLIII.

Melinū hoc modo temperatur: Olei congruus decem aquæ sextarijs admiscetur. Addeitur elat. c. palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetustâ tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem dierum spatio operimentis inuoluunt, vt contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumq; reconditur. Id vim refrigeratorem & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac fursures, berniunculosque effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur, citatâ urinam sistit infusum, sudores cohibet, contra cantharidas, buprestim, pinorum crucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Oenanthinī compositio. CAP. XLV.

Oenanthe è lambrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aliū non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore ænanthæ refert.

Telini cōponendī ratio. CAP. XLV

Foenigraci libræ quinque, calami libræ vii
 cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septem
 diebus macerantur, quotidie ter mouentur, post
 premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calan
 cardamomum substituunt, & cypiri loco xyle
 balsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus
 spissato fixumgræcum macerantes exprimunt.
 Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, o
 mnibus vuluarū duritijs magnopere conuenit, f
 minus difficile parientibus subicitur, ubi præ ex
 cretis humoribus loci siccitatem contraxerunt
 sedis inflammationes lenit, teneſmo subditū pro
 deſt, vlcera capitis manātia furfuresq; expurgat
 ambuſtis, & pernionibus addita cera proficit, vi
 tia cutis in facie emendat, pigmentis ad concilian
 dum faciei nitorem inſeritur. Eligi oportet recēs
 quod non vehemēter fixnigraci odorem præ ſe fe
 rat, & manus abſtergat, ſapore ex dulci in ama
 rum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Sampsuchini cōpoſitio. CAP. XLVII.

Serpilli, caſſiæ, abrotoni, florū ſiſymbrij, fron
 diū myrti, ſampsuchi ſingulæ portiones, qua
 dā pro viribus ipſorū coniectione, vnā tundun
 tur, atque is omphacini olei modus adiicitur, quā
 malentium vires non euincat: hæc poſt quatrīdū
 exprimuntur. Denuò noua alia, ſimili menſura,
 & æquali tempore macerata premuntur: ita enim

valē

valulius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimū redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantē, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborū inguinumq; dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi astrictione locos indurat. Lasitudines illitum discutit, in opisthotonicorū, vulsorūq; cataplasmata vtilissimè additur.

Ocimini compositio. CAP. XLVIII.

Ocimum oleum fit vt cyprinum: Ocimi folia decerpta librarū vndecim, & beſſis pondō, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhausseris quallum, rursus parē olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perſuſionis non est capax. Deinde recens ocimum equali pondere, vt in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleū recoditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincūce foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in lon-

gum tempus oleum velis asservari, eiectis prioribus folijs, nova appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficax est, mēstura. & secundas pellit.

Anethini compositio. CAP. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & besē, maceratas in oleo die una, manibus premito & recondito. Quod si iterū persundere velis, recētes anethi flores cōsimiliter madesfacito. Vulvarū duritiæ emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febriū circuitu redeūtes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Susinum. CAP. LI.

Susinū, quod alij lilinum appellant, sic temperatur: Olei libræ novem cum quincunce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrhæ vnciæ quinque, permixto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & cælesti aqua madesfacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cū semisse spissati olei assumuntur: mille lili. decerptis folijs, in latum, nō tamen profundum, labellū demittuntur: iniectū oleum, manibus melle perūctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: (nō enim, ut rosaceū, moram tolerat: nā concalfactum feruet & com-
putre

putrescit: quare sepius decapulidum) vasa melle
illineâda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes
vasis faucibus hæsit, eximenda. Odorametis iam
expressis ex quasillo in labellū transfusis, rursum
olei prius odoribus imbuendi, quod primum pon-
dus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem
coniunguntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta
breui mora exprimitur: quod profluit, repurga-
tur. Tertio eadē infunduntur, adiecto cardamo-
mo, & sale, & manibus melle madefactis. Lon-
gè optimū erit, quod prius exprimitur: secundum,
quod sequitur: tertium locum sibi vendicat, quod no-
uissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis folijs
expressum primo oleum infunditur: tum eadem
ratione proseguendis, idemq; faciendum, vt prius,
addito cardamomo, dein expresso: & quo frequen-
tius recentia lilia maceraueris, eo validius vn-
guentū efficies. Deniq; cum factū abundè videbi-
tur, singulis cōpositionibus miscere cōuenit myr-
rrha quàm optimæ duas & septuaginta drach-
mas, & croci decem, cardamomi quinq; & se-
ptuaginta: croci verò & cinnamomi pares por-
tiones tunduntur, & cribratæ in lutrā cum aqua
demittuntur, expressumq; primo vnguentū insun-
ditur, & paulò post excipiuntur vasculis siccis,
myrrha aut gūmi antea perfusis, & croco, melle
& aqua madefactis. Eadē fuit in altera aut ter-
tia expressioe. Aliqui simplex ex balanino, aliore

oleo, & lilij coponunt. Optimum esse constat Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum prim. laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emol. vuluæ præclusiones, & collectiones aperit, vtili-
simum ad muliebria mala: vlcera in capite in-
nātia, feruidas eruptiones, varos, furfuresq; eme-
dat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem rea-
cūt, ita vt saepe fallant. In summa extenuat, poi-
bilem per alium extrahit, vrinam ciet: sed stoma-
cho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum. CAP. LII.

Narcissini olei spissamēta ita fiūt: Sex librae
Aspalathi cū sextāte trūdūtur, olei eloti librae
septuaginta cū vncijs quinq; assumūtur. Aspal-
athus aqua madefactus in tertia olei parte coqui-
tur: quo exēpto, calamus quinq; librae, et bessè ad-
iicitur, cū myrrhæ gleba contūdūtur, cribrataq; ac
vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac
autem cū iys efferbuerit, eximitur: refrigeratū oleū
excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores
narcissi quamplurimi coniūciuntur, qui bidui spa-
tio (vt in susino dictū est) permoti exprimuntur.
Oleum subinde decapulandū, siquidem celerrimè
putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ
duritias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

Crocinum. CAP. LIII.

Cum crocinum componere voles, prius olei,
vt in susino diximus, spissamenta facies, eis-
dem

dem ponderibus, & mēsuris: cuius olei libras treis
& semissem, croci vnciā vnā assumes, identi-
dem quotidie moueto, & sexta die, quā hoc assi-
duo peregeris, oleū à croco colis incernito, eidē cro-
co parem olei modum ady cito, moue triduo, dein
contuse myrrhæ atq; cribrate drachmas quadra-
ginta permisceto, & in pila agitatum recondito.
Aliqui oleo aromatibus ad cyprinū imbuto in cro-
cini compositione vtuntur. Optimum est, quod a-
bundē crocum spirat, in medendi vsu expetitur.
Proximū, quod myrrham refert. Calfacit, somnū
allicit, quare persepe phreniticis subuenit, perfu-
sum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mo-
uet, vlcera purgat, cōtra vuluæ duritias atq; præ-
clusiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, pro-
dest cum croco, cera, medulla, duplicato olei ponde-
re. Concequit enim, emollit, humectat, & permul-
cet: ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur.
Huic autem proportionē respondent butyrium,
onychinum & styracini: quæ & eisi nominibus
distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. CAP. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœle-
stis tantundem cum semisse, cuius vna par-
te oleum diluitur, altera adyiciendis odoramentis
admiscetur: dein assumptis asspalathi libris quin-
que, & semisse, calami libris sex, & semisse, myr-
rhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & do-
dras

drante, olei libris nouē, & uncīs quinq;. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec cōseruescat, myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in ossulas, quæ exēpio aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint, sublato alieno, oleum percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatula agitur, nulla, dū refrigerit, interpellatiōe. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cū lessē instillātur, quæ sufficienter madefactæ per sportulā exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectū simili modo prematur: & iterū aut tertio si quis velit, madescere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonū, quod cum odoris suauitate nares feriat Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora venarū adaperit, vulua nervorumq; vitis cōuenit, pleuriticis, fractisq; per se vel cerato immistū malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Irii spissamentum. CAP. LV.

Spathæ quam minutissimè contusæ sex libras cum lessē, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ hœminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus

bus imbuto oleo, irinū primò temperatur, iride ex
oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia
est cõponendi ratio: In olei septuaginta libris &
quincunce, xylobalсами (vt dictum est) contusi, li-
bras quinq; & sextantē excoquito, postea detra-
cto xylobal samo nouē libras & dextantē adijci-
to, & myrrhæ glebam vetere vino odorato persus-
sam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim
libris, totidem tuse iridis, binis diebus ac noctibus
madesacito, strenuè & vebementer distringito.
Quod si vis validius fieri, par pòdus iterū ac ter-
tio similiter maceratū exprimito. Longè optimū
est quod solā irin olet, quale est in Perga Pamphi-
liæ, & Elide Achaïæ natū. Vim habet calfacto-
rii atq; emollientē, crustas adimit, sordida vlcera
& putrida purgat. confert feminis vuluæ causa-
rys, itē inflammationibus eiusdē atq; præclusioni-
bus, partus eijcit, hæmorrhoidas recludit, contra
auriū sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus,
prodest: diuturnis destillationibus, naribus illitū,
& cõtra graueolentia earū vlcera, quas oxenias
vocant, auxiliatur: aliuū purgat cyathus epotus,
facit ad ilei cruciatus, vrinā mouet, difficileis vo-
mitiones adiuuat, perūctis eo digitis & immisis,
vel ijs quæ ad vomitū ciendum induntur angine
etiā illinitur, aut ex aqua mulsa gargariatur:
itē contra arteriæ scabritiam. datur etiam ijs qui
sicutā, coriandrū, aut venena fungorū hauserūt.

Glen

Gleucinum. CAP. LVI.

Gleucinum absolute cōstat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, asspalatho, fertula campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vuluæq. vitis auxiliatur, omni acopo iuvantius, quippe quod emolliat.

Amaracinum. CAP. LVII.

Amaracinū lōgè optimū in Cyxico fieri solet ex omphacino et balanino, spissamētis è xylobalfamo, iunco odorato, et calamo factū, cōditisq. amaraci, costi, amomi, nardi, cassiæ, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quò pretiosius fiat, cinnamomū addūt Mel autē & vinum assumūtur: hoc in vasorū illitionē, illud ad cogēdus tu sorū aromatis offas. Amaracinū calfacit, soporem mouet, venarū spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinā cit, putrilaginibus ac fistulis pquā vtile: necnō humētibus herniis, postquam medica manus operā suam impenderit: crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocat, rumpit: difficili urina, illita sede, & eius inflātionibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditū mēstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tumores discutit, vulneratis nervis, & musculis cōfert, lamento

eo centunculo modice madfactū & impositum.

Megalinum. CAP. LVIII.

Factitabatur olim megalinum, sed nūc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad hīstoriæ complementum meminisse non ait alienum. Mīstura cum amaracino eadē erat, ad resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedycroum. CAP. LIX.

Quod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditū viribus, & mīsturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Metopium. CAP. LX.

Et in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbanī nīstionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nucibus, amphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calano, melle, vino, myrrha, balsami semine galbano & resina. Probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quàm galbanū resipiat. Calfacit vehementer, & adurit, atq; extrahit, ora venarum aperit, vlcera purgat, extrahitq; ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias
hum

humore cōtractas, cū erodentibus medicamētis efficacax est: ceratis et malagmatis inseritur, horribilibus, cōuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, et retrorsum cōtracta est, vtile habet: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdē duritias laxat: in summa, molliendi naturā habet.

Mendesium. CAP. LXI.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addūt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullā exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multā.

Stacte. CAP. LXII.

Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua iussæ, & origano expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentum per se facit, quod stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mīstionē admittit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfacentiam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum. CAP. LXIII.

Cinnamominū confit ē balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur.

Laud

Laudatur nō acre, molli odore, planē myrrhā re-
 dolens, crassum, odoratū, gustū perquā amaro.
 Id non à resina, sed myrrha crassitudine obtinuit:
 resina enim neq; amaritudinē præbet, neq; vllam
 odoris gratiā adūcit. Vim habet admodū acrem,
 amarā, & calfacientē. Itaq; ora venarū aperit,
 calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus at-
 trahit, caput aggrauat, contra vulua vitia cū du-
 plo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferē
 multū acrimonia exoleſcit, & quedā emolliendi
 vis contrahitur alioqui adurit, & præ omnibus
 crassis vnguentis indurat. Facit mirū in modum
 ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitium sense-
 runt: itē ad hernias humidiores, carbūculos, febriliū
 horrores, tremores, gāgrænasq; cū cardamodo:
 aduersus serpentiniū morsus illinitur, scorpionū &
 phalangiorū ictilus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. CAP. LXIIII.

Ratio nardini faciendi euariat. Nā aut mā-
 labathrino folio, aut sine eo fit: plerūq; autē
 balanino oleo, aut omphacino: iūcus odoratus spīs
 samēti gratia adūcitur: sicuti propter odoris sua-
 uitatē, costus, amomum, nardum, myrrha, balsa-
 mum. Laudatur tenue, non acre, nardi aride aut
 amomi odorē referens. Vis ei extenuās, acris, ex-
 purgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit.
 Hoc liquidū est, nec habet strigmenti crassitudinē,
 nisi resinā recipiat. Fit etiam simplex ex ompha-

D

cino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinum. CAP. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet, in super myrrha plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Iasminum. CAP. LXVI.

A pud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans, in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori convenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactione, laxationemque desiderant: gravius enim spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. CAP. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes, alia circum caudicem concrevit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, quæ expressa, Staete emittitur. Alia gabirea pinguis, lato & pingui solo nascentis, ea copiosam sudat Staeten. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo provenit: splenders, subviridis, ac mordens. Quinetiam legit

egitur tenuis quædã, quæ à troglodytica secunda
st, bdellij modo mollis, verũ odore grauiuscula,
ipricis nascens. Alia caucalis cognominatur, præ-
ter modũ expleta, nigra, & retorrída. Omnium
leterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens,
cano situ obducta, acris, ad gummi imaginẽ ver-
gens, & viribus eius p̃xima. Improbatur amin-
nea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pingui-
bus pingues, & odorati: è sicciõribus haudqua-
quã pingues, & inodorati: minus odore pollet,
quæ oleũ non admisit, cum in pastillos digerebat.
adulteratur macerato gummi aqua, in qua myr-
rha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita,
leuis, vndiq; cõcolor, quæ confracta venas vnguiũ
modo candidas & leues ostēdat, minutis glebis,
amara, acris, odorata, calfaciens: superuacua &
inutilis est ponderosa, coloris piceĩ. Calfacit, cohi-
bet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit,
vuluam emollit, & præclusam aperit: menses &
partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorũ
cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ
deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterũ pe-
ctorisq; doloribus, in alui p̃fluio, & dysenteria:
horrores discutit, duabus horis ante febrĩũ acces-
siones, fabæ magnitudine pota cum pipere & a-
qua: subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ
expolit: obtusam vocẽ expedit, ṽtrĩs tineas enecat,
contra grauẽ oris halitũ mādatur, & aduersus

alarum tedia cū liquido alumine illinitur: gingi-
nas & dentes stabilit, colluto cū vino & oleo ore:
vulnera capitū illitu glutinat, medetur fractis au-
ribus ac ossibus nudatis, peracta cum cochleæ car-
nibus. Itē purulentis auribus inflammatisq; cum
meconio, castorio, & glaucio ad varos autē cum
cassia & melle illinitur, impetigines ex aceto pur-
gat, defluentes capillos cū ladano & vino myr-
teo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, il-
litis pēna naribus: oculorū vlcera cōplet, albugines
tollit, caliginem discutit, scabritiem laeuigat. Fit ē
myrrha, perinde atq; thure, fuligo, &, vt postea
ostendemus, ad eadē conueniēs. Bæotica myrrha,
dissecta radix est arboris cuiusdā in Bæotia na-
scentis. Melior est quæ myrrham odoris suauita-
te repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit di-
scutitq;, suffimentis commodissimē inseritur.

Styrax. CAP. LXVIII.

αιπάρους
id est, pin-
guis. **S**tyrax lacryma est arboris malo cotoneæ si-
milis. Præfertur * sordescens, flauus, resino-
sus, albicantibus grumis, quāplurimum in sua
odoris gratia permanens: qui dum mollitur, mel-
leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pissi-
dia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surfu-
rosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum la-
cryma inuenitur gummiū similitudine, perluci-
da, & myrrhæ emula: verum per pauca manat.
Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi eroden-
tes

LIBER PRIMVS.

55

es excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbuti, fragrantissimis solibus cum styrace subiungunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, vāundantq;. Sty-
racem hunc [quoniam in vermiculorum speciem contrahatur] scoletiten cognominant, tanquam Adiectum
ab inter-
prete. yncerum imperiti approbant, nō animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: si quidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur ussi, destillationibus, raucedini, grauedini, et inter-
ceptæ voci: vuluæ præclusæ duritiæ laboranti conuenit, cit menses potu apposituq;, alium leuiter mollit, si exiguum cū resina terebintina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisq;. Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem cōueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styraciniū oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq;, & soporē adfert.

Bdellium.

CAP. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelcon: lacryma est * saracenice arboris. Pro * vox adul-
batur gustu amarum, translucidum, taurini glutinosa Mar-
tinus in more. intus pingue, liquefcens facile, ligni cello.
ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile.

D 3

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrū, vberioribus glebulis in offas conuolutū, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiā à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundū. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinē repræsentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratū. Calfacit et emollit duritias, & turgētia guttura, humidatq; her-nias discutit, cum ieiuna salina dilutū: vulnē spiracula laxat appositū & suffitū, & partus humiditatesq; omnes extrahit, calculos potu comminuit urinam mouet, tussietibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterū dolores, & discursantes spiritus: malagma in inferit, quæ cōtra duritias et neruorū nodos p-sunt: cōtusū resoluit affuso vino aut aqua calida.

Thus.

CAP. LXX.

* ὑπόκις-
ῖος, id est,
subrusum
est.

* ὁ ἀρα-

βίας καὶ ὁ

ἔρ Σμίλῳ,

id est, Ara-

bias dictū,

& quod in

Smilo pro-

uenit.

THus in ea gignitur Aralia, quæ thurifera cognominatur. Primatū tenet in eo genere masculum, stagonias appellatū, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidū, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicū vero * fuluescit, & colore liuet, sed rotundū industria faciliat: nam in quadrangulabias dictū, res formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi thus tē-pore flauescit, quod atomum aut syagrum appellat. Secundum locum habet * Arabicum,

&

& in Similo nascens, quod aliqui copiscū vocāt,
 minus multò & fuluius. Est & genus aliud. cui
 amomite cognomen est, alioqui candidiū: quod dū
 molitur, masthiches more digitis cedit. Adultera
 tur * in iunere, pini resina & gūmi, quod facile * μετοδευό
 deprehendi potest: siquidē suffitum gūmi flammā μεν & , id
 non ei aculatur, & resina in fumū euanesceat, illius est, artificio
 verò statim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad sē cōforma-
 calfaciendū & astringendū pollet, oculorū calig: tum. Sic
 nem discutit, caua vlcera complet & ad cicatri- Marc.
 cem perducit, cruēta vulnera glutinat, infrenatq;
 tunc las sanguinis eruptiones, etiam si cerebri mē-
 branis effluat: vlcera quæ cacoēthe vocantur, &
 sedis & reliquarū partium permulect tritū cum
 eo & lacte linamentū, formicantes verrucas in-
 ter initia, impetiginesq; , ex aceto & pice illitū,
 tollit: ambusta igni, pernionesq; cum suillo adipe
 aut anserino, & vlcera in capite manātia cum
 nitro, si infricetur, sanat: paronychijs cū melle, au-
 ribus fractis cū pice, medetur: ad reliquos auriū
 dolores cum dulci vino infunditur, inflammata à
 partu māmæ cū cimolia & rosaceo magna uti-
 litate perunguntur, additur ad arteria viscerūq;
 medicamenta, prodest sanguinis excreationi po-
 tum. sed in secunda valetudine haustū insaniam
 mouet, & largius cum vino potū intersuit. In si-
 ctili mūdo thus crematur, flagrate glebula succē-
 sum à lucerna, donec exuratur: post perfectam

ustionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alii crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uacuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporumve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex.

CAP. LXXI.

Praefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, laevis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporum ei aculatur. Thuris modo utitur, & vis eadem quae thuri, sed validior astringentiorque. Quare potu cruentis excretionibus, vuluis fluxione laborantibus in pessum confert, ad cicatrices oculorum, & caua sordesque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris.

CAP. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inuaidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant: sed haec igne deprehenduntur

thur

ur. Neque enim aquæ suffitu ærium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permittum suæ uolentiæ halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictile ollam cōcavā imposito: & æreo vase in medio perforato, deterfa diligēter sorde, obtegitto: alterā admoneto, ex altera eius parte aut vitraque, subiectis quaternū digitorū altitudine lapillis, quò facilius perspiciqueat, si vrantur: & quā locus capax fuerit, glebularum alias supponito. et antea quā prorsus prior gleba restinguatur, aliā imposito, donec sufficientē fuliginē videaris coegisse. Continuò tamen externæ aramenti partes spōgia, aqua frigida madefacta, abstergātur: ita enim tēperato aris feruore, fuligo omnis inharerebit: quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admiscetur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfactū tibi videtur, obeundū. Oculorū inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, ulcera purgat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, vligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quādam flagitant specierū distinctionem,

80 DIOSCORIDIS

arbores vulgò cognita: quarū cortex astringit,
prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus
summū corpus occupātibz, ambustisq; cū spuma
argenti & manna. Vlcera delicatulorum acrimo-
niam recusantiū, cerato myrtino exceptus, ad ci-
atricem perducit: tritus cū sutorio atramēto ser-
pentia colibet, suffitu partus & secundas eūcit,
potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorū tri-
ta & illita inflammationes leniunt, vulnera ab
inflāmatione vindicant, trita autem & decocta
aceto, fernētū collutione, dentiū dolores mulcēt: he-
paticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut
mulsa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idē
præstant. Teda earum particulatim secta si in ace-
to coquatur, & decocto dens colluatur, dolores le-
uat. Ex his etiam fit spatia acoporū pessorumq;
cōpositionibus idonea. Quinetiam earum crema-
tarum fuligo ad librarij atramenti cōfectionem
excipitur: ea circumlitionibus efficacissimè impo-
nitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mētun-
tur, callibrephara Græci vocant: arrosis oculorū
angulis, callosis glabrisq; genis, & collacrymatio-
nibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum
piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim a-
stringentiam habent, & aliquantum excofacien-
tem: tussi & pectoris vitis auxiliatur, per se, aut
ex melle sumpti. Noces pineæ cū Strobili repurga-
te māduntur, aut cū passo aut cucumeris semine
bib

Pityides.

buntur, vrinam cient: acrimonias in renibus & sica hebetant, stomachi rosiones leniunt: datae in portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus deceptæ, in passo franguntur, & decoctæ vetustæ ipsi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. CAP. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest astringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque, cognatæ insunt vires. Iliquamētū autem fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquantur, & ubi abunde cocta refrigerataque sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquit, donec mellis habeat crassitudinē. Lentiscus sua astringēdi donec, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionē sanguinis è vulua, & eiusdē aut sedis prociētia. In totū acaciæ & hypocistidis vicē repræsentat. Idē facit succus è tritis folijs. Decoctis fotu cana replet, et fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinā pellit, motus dentium collutione stabilit. Virētes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine olcū, ΣΥΠΤΙΚΟΝ.
 *quod prodest cū quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, Mastix offatur, & ab aliquibus, *mastiche. Pota utilis est cinis.

(sang

sanguinem reijcientibus, & tussi veteri: stoma-
cho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in de-
tificatione & illitiones faciei, ad nitore cuti concilian-
dum. Palpebras oculis incommodas replicat, ma-
ducata halitum oris commendat, gingiuas con-
Interpreti ab trahit. Optima & copiosissima in insula Chio
prouenit. Praefertur [utendulae modo] resplen-
descens, & candore Tyrrhenicae cereae similis, adul-
ta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens.
Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, re-
sineq; pineae nucis mistura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, et
semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad-
que lentiscus conueniunt, simili parata modo sum-
ptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduer-
satur: excalfacit, urina mouet, venerem excitat,
contra phalangiorum morsus conuenienter in vino
bibitur. Resine eius ex Arabia petraea defertur.
Prouenit etiam in Iudaea, Syria, Cipro, Aethiopia et
Cycladibus insulis: sed praevalet candida, perluci-
da, vitreo colore & in caeruleum vergente, odora-
ta, terebinthum olens. * Terebinthina resinas o-
fficinis Terpentina. mineis antecedit: proxima lentiscina, & e pinu,
& abiete: has sequitur e picea & pineis nuci-
bus resina. Natura omnibus calfacere, mollire,
discutere, expurgare. iussi ac tabi conueniunt
per se, aut in eodem gmate ex melle, vitia pecto-
ris

pectoris expurgant, urinā cient, cruda concoquūt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant, lepras tollunt, cū erugine ac sutorio atramento, utroq; : auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtilis: malagmati, acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

Liquidā resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atq; olim à Colophonia petebatur: hinc Colophoniam sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina: quā vernaculo nomine laricē appellat incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distāt: siquidē alia cādidā est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiā liquidā fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridariū generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alie abiete, alie picea & pinu exierūt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucēs, non retorrīda, neq; diluta, quandā ceræ faciem præbens, & friabilis. Epicea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitātur. Præstantiores à pityussa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupressō manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ

illa sumi solet. Lentiscina terebinthinae respondet.
 Vritur resina omnis liquida in vase quadrupli
 capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaque resi
 na coctius, in duobus aquae pluviae coquitur, sub
 etis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec
 omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrid
 reddatur, ac digitis cedat. Ceterum ubi refriguit
 in fictile non picatum, quod aconitum vocant, id est in
 illitum reconditur. Fiet etiam eximie candoris, si resi
 na omnis eliquata praeoletur, quod feculenta sor
 des excernatur. Vritur quoque sine aqua, primo
 lento igne: & ubi coire ceperunt, maior carbon
 strues supponitur, & triduo citra intermissione
 discoquuntur, usque dum ante dictas naturae suae no
 tas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Arida
 unius diei spatium decoxisse satis est. Vt & odorati
 malagmatibus, & acopis, & unguentorum color
 tionibus magnopere utiles sunt. Et resina perina
 atque thure fuligo excipit, ad circulations idonea
 quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur.
 Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisque
 oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium

Pix liquida. CAP. LXXVIII

Pix liquida, quam alij conum vocant, & pin
 guissimis pini piceaeque lignis congregatur.
 Optima est splendens, sincera, levis. Contra
 venena, phthisin, purulentam excreationem, tu
 ses, suspiria, & pectoris humores qui difficile ex
 tuantur.

tusiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarū & vnae inflammatio- nes, anginae q; vtiliter perunguntur: purulentis auri- bus infunditur cū rosaceo, & illinitur cū trito sa- le serpentii morsibus: adiecta verò pari cera sca- bros vngues extricat, impetigines q; emendat: vut- uae duritias ac sedis tubercula discutit: cū farina q; hordacea & pueri impubis vrina decocta, stru- mas rumpit: cohibet vlcera quae sepiūt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cate- rùm cū thuris manna & cerato profundos vlce- rū sinus conglutinat, rimis sedis & pedū, magno auxilio illinitur: vlcera replet, et cū melle purgat: quin & cū vna passa, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpit q; erodenti- bus medicamentis, quas septas vocāt. pbe immiscet.

Picinum oleum. CAP. LXXIX.

E Pice fit quod pisselaon appellāt, separato li- quore aquoso, qui supernatat picis, sicut seruū lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescunt, accepto q; ha- litu eius exprimuntur in vas. * Quas pix liqui- da, praebet utilitates. alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur, iumentorum vlcera scabiem q; emendat.

Fuligo liquidae picis. CAP. LXXX.

Fit hoc modo ē liquida pice fuligo: In lucerna noua quae ellychnium habeat nonnihil picis

Hae de sunt,

καὶ τὸ

ἀπὸ γίνετ

ἐφ' ὅσον

ἀπὸ χρόνου

ἢ πικρὰ

ἐκ τῆς

incen

incendito, lucernamq; fictili vase in clibani specie conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficiente vsui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vsi est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genus pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Pix arida. CAP. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, hoscias cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, & sinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinaq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannosq; discutit, vlcera replet, vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXII.

Zopissam aliqui ciunt dera sam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinã hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. CAP. LXXXIII.

Bitumen Indicum ceteris anteponitur. Cuius prob

probatio est, vt purpura modo splēdeat, sitq; ponderosum, ac validum odorē vibret. Nigrū autem & sordidū, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phoenice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Li- quidū inuenitur in Agragantino Sicilię, fontibus inuatās, quo vtūtur ad lucernarū lumina, olei vi- ce. Hallucinātur, qui id Sicilicum oleū nominant: nanque liquidū bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epi- daurum, quę pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetū fluminis ra- pitur, aestuq; in litus expuitur, illic coacta in gle- bas, mistā bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis co- lamē, colore candidum: inuenitur etiam ni- grum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio pro- tinus in eam trāsiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, gluti- nat, emollit, ab inflammatione tuetur: vuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, in- positu, emēdat: comitiales morbos suffitum depre- hendit, gagatę lapidis more: purgationes mulie- rū cum vino, & castorio potiū elicit, tussim vete- rem & anhelitum adiuvat, serpentium morsibus, coxēdicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur coeliacis in catapotio deuorandū, cum aceto potius

E

discutit sanguinē concretum, dysentericis cū ptisana liquatū infunditur, destillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum, ceterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum: concalsactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitū, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceatur, potest.

Cupressus.

CAP. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passō, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliatur. Pilulæ autē ex vino tusa in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, cōuenientissimè bibuntur: earū decoctū eosdē præbet effectus: tusa cū sico duritias emolliunt: nariūq; polypo medetur: in aceto coctæ, & cū lupinis detrita scabros ungues eijciunt, hernias intestinorū plapsu erumpētes illitu reprimunt. Folia eadē præstāt. Pilulæ cū arboris coma suffita, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant: sanguinē supprimunt, capillū ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cū polēta ignibus sacris, vlceribus q̄ serpūt, carbūculis & oculorū inflammationibus, adnota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus.

CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera minor, utraq; acris est. Excalscit, & urinā mouet,

uēt, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ
 nucis inglandis magnitudine nonnunquam gran-
 descere, aliæ & nucem Ponticam æquare inueniun- *Auellanæ
 tur: rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, suba- intellige.
 maræ, quæ arceuthides etiam, id est baccae iuni-
 peri, nominantur. Modicè calfaciunt, & astringunt, stomacho vtilis: cōtra pectoris vitia, tussim,
 inflationes, tormina, & serpentium ictus effica-
 cissimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, con-
 uulsis, & vuluæ strangulatu subueniunt. Folia
 acrimoniā habent: idē tam ipsa, quā eorum
 succus ex vino contra viperarū morsus illini aut
 bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras
 eximit. Ramenta ligni deuorata interficiunt.

Herba Sabina. CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cu-
 presso similis, spinis horridior, grauiter olens,
 acris & feruens: arbor est coacta breuitatis, quæ
 sese magis in latitudinē fundit: huius folijs nōnul-
 li pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio simi-
 lis est. Viriusque folia nomas sistunt, collectiones
 illitu mitigant, & cum melle nigritias sordesq;
 repurgant, carbunculos cum vino pota rumpunt,
 sanguinem per vrinam eliciunt, partus apposita
 extrahunt, & suffitu idē præstant, vnguentis cal-
 facientibus immiscetur, & priuatim gleucino.

Cedrus. CAP. LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colli-

Cedrus
mortuorū
vita di-
eta.

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas
parit: baccarū myrti magnitudine, rotundas. Ce-
dria optima est crassa, perlucida, grauis odoris:
quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit.
Cui ea vis inest vt defuncta corpora conseruet, &
viventia corrumpat: quæ ex causa mortuorum vi-
tam aliqui appellauere. Vestimenta quoq; & pel-
les eximia calfaciendi & siccandi dote, corrūpit:
magni ad ocularia medicamenta vsus, quippe illi
ta oculis claritatem affert, albugines cicatricesq;
detergit, instillata autē cum aceto vermes aurium
necat, cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilosq;
sedat, canis dentium indita eos frangit, & dolo-
res leuat, idem facit cum ex aceto colluitur: perun-
cto ante coitum genitali abortiuum fieri constat,
angine ea perunguntur, tonsillarum inflamma-
tionibus auxilio est, lentes pediculosq; illitu ene-
cat, cerastæ morsibus cum sale imposita subuenit,
cōtra hausta leporis marini venena, in passo sum-
pta, auxiliatur: in elephātia, aut linctū, aut per-
unctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & si
cyatus eius sorbeatur, persanat: vermes & tineas
subter indita necat, & partus extrahit. Fit &
oleū, à cedria separatum, dum coquitur, velleribus
supra halitū eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad
omnia vsus: priuatim vehementer perunctum sca-
biem quadrupedū, canum, boum q; persanat: inha-
rentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tōsura accepe-
runt,

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguria: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporē marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quae eandem, quam picea fuligo vim praebet.

Laurus. CAP. XC.

Laurus quaedam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturā habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in mulieres infusus additū, vuluae & vesicae vitij conuenit. Virētia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparū apiumque ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachū effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate trita cum melle vel passo prosunt tibi, orihopnea, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionū ictus ex vino bibuntur, vitilignes emaculant. Succus baccarū utilis: imē auriū dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autē adiunguntur, quae neruorū lassitudines reficiunt, ac opavocant: & ad vngueta, quae calfaciunt, & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit, partus necat, hepaticis

prodest, tribus obolis in vino odorato potas.

Platanus. CAP. XCI.

Tenerrima platanī folia in vino decocta, mox illita, oculorū fluxiones sistunt, tumores, & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dētes in dolore colluit. Virides pilulæ in vino potæ, serpentū moribus auxiliatur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. insulens foliorum pilularūq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus. CAP. XCII.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum icibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scorbemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus. CAP. XCIII.

Potus albae populi cortex vniæ vnius pondere, ischiadicis ac vrinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoq; cū vino post purgationes pota, idē præstare proclit. Tepens foliorū succus vtiliter aurī doli instillatur. Pilulæ, quæ primo foliorū partu exiliunt, illitæ cū melle, oculorū hebetudini medētur. Memoriae prodiderūt, corticē albae populi, & nigrae particulatim casum, & sulcis stercoreatis mandatū, omni tēpore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cū aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinūtur. Resinam
popu

populus fundit, quæ in malagmata additur. Semē potū ex aceto comitialibus vtile est. Lacrymā populorū cōmemorāt, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum De ortu ele
vocat, alij chrysophorum. Id attritu incundum tri multa
odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum lib. vltimo,
potumq; stomachi ventrisq; fluxiones sistit. cap. 3. et 4.
apud Plin.

Macer. CAP. XCIII.

MAcer ex Barbaria aduehitur, cortex flavescent, crassius, gustu perquam astringens: qui contra cruentis excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

Vlmus. CAP. XCV.

VLmi & folia & cortex & rami, vim habet spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fascia loco intorqueatur: nam in lori morē flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vniatim potus, puitas trahit: fracta ossa celerius solide sciūt, si decocto foliorū corticis aut radicis foveantur Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitore inducit, faciemq; splendidiorē præstat. Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia vsurpantur.

ELignorum marcor. CAP. XCVI.
EX candicibus lignisq; veteribus caries cōge-

ritur, quæ farina modo illita, vlcera purgat, et ad cicatricem perducit: serpentia colibet, si cum pari amiso & vino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Harundo. CAP. XCVII.

IN harundinum genere quedam nastos, id est farctior, vocatur, ex qua sagitta factitari solent. Alia femina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud omnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncta cum aceto alopecia sanantur, panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. CAP. XCVIII.

Papyrus qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatum, humor completur, & intumescendo fistulas operit. Habet nescio quid alimeti radix: itaq;

Aeg

Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & māsā expuunt. Ipsi radicibus pro ligno vtuntur. Crematae papyri cinis depascētia vlcera cum omnium partium, tum oris maximē, cohibet: verum melius id combusta charta praestat.

Myrica.

CAP. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis est, cum apud pigras & stagnantes aquas Tamari-
enascatur, fructum quasi florem, ferens compage scus.
muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt
mitiorem, syluestri cat. ra similem. Fructum pa-
rit gallae proximum, inaequaliter astringentem
gustū: quo conuenienter vtimur vice gallae in me-
dicaminis oculorum orisq;. Datur cruenta ex-
creationi in potu, & celiacis, & cōtra profluvia
feminarum, regium morbum, & phalangiorum
morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eosdem
vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino po-
tum, lienem absomit: ad dolorem dentium in col-
lutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulua
opportunis in desensionibus, phthiriasi lendibusq;
circumfusum prodest, abundantia feminarū sistit
impositus arboris cinis, potorios calices è caudice
lienosis moliantur, quò datus in his potu proficiat.

Erica.

CAP. C.

Erica * fruticosa arbor, myrice similis, longē * Plin. fru-
minor: cuius flore apes reprobiū mel efficiunt, ticē dicit.
cā flos quā comā serpētū iētibus illitu medetur.

E 5

Acacalis.

CAP. CI.

Acacalis fructus est nascētis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadamtenus similis: cuius aqua in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus.

CAP. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadamtenus rulētibus: cuius rami quinam ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigētibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuem, folliculari specie, & verticillo simile.

* ροικὸς ἄ-
σφοδελῶ,
id est, a-
sphodeli fru-
ctui simile.

Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fam. est ramos huius valuis fenestrisve impositos, veneficia depellere.

Halimus.

CAP. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus.

CAP. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum in-

nep

venitur: quod potum tussi opitulatur, vesicae calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, rita & imposita.

Acuta spina.

CAP. CV.

Acuta spina, quam pyrinā aut pityanthem *Officinarij* aliqui vocant, arbor est pyraastro similis, *Berberis.* spinosa valde & minor, baccas proferit myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendente. Huius bacca potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam feminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriatur, aut perungatur.

Rubus canis.

CAP. CVI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum.

CAP. CVII.

Ligustrum arbor est oleæ folijs circum ramis *Officinis* similibus, latioribus, mollioribus, & *Alcanna* colore

colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia astringentiam vim habent: quare commanducata ulceribus oris medentur, illita febrilibus inflammationibus, carbunculisq; prosunt, decocto eorundem igni ambusta fontur, capillum rufant trita folia, quæ in radice la succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitq; nervos: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

Tilia. CAP. CVIII.

*Χρίεω. **T**ilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu *lentis, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem uti lia ad quæ oleaster, cum astringente est opus: maxime ad oris ulcera, commaducata, aut si decocto colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus. CAP. CIX.

Cistus, quæ aliqui citharon, aut cissarō vocāt, Cramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. * Vox ex flos * masculo ut mali punice, femina albet. Vis astringens: unde flores in vino austero bis in die positi, p sunt dysentericis, & nomas per se illi cohibent, vetustati ulcerū, & igni ambustis cū cerato medetur. Hypocistis, orobethrō, aut cytinus à nō-
nul

ullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur,
oris punici similitudine. Quædã rufa, altera her-
acea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Ali-
ui tamẽ exiccant, fractãq; macerant, & incoquunt,
aliquaq; vt in Lycio prosequuntur. Vires acaciæ
abet, verum aliquanto magis siccatur, & astrin-
git. Prodest dysentericis, celiacis, sanguinem ex-
creantibus: fœminarũ profluuiũ & pota et induta.

Ladanum.

CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis
appellatum, frutex simili modo nascens, loi-
ioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempo-
re quiddã contrahunt pingue. Foliorum vis astrin-
gens, ac eosdem quos cistus effectus præbens. Fit
ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti Colligendi
frondes pascuntur capræ, hirciq;, pinguitudinem ladani mo-
conspiciuẽ barba carpunt, & suo lentore villosis dus.
ruribus adhaerentem reportant: quam depe-
tentes incole, colantesq; cogunt in offas, & ita
recondunt. Alij verò attractis funiculis, insiden-
tem fruticibus lentorem abstergunt, conglome-
rantq; in ladanũ. Maximè probatur odoratum,
subuiride, faciliẽ mollescens, pingue, quod arenas
non collegit nec squalore obsitũ est, resinosum qua-
le in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumq;
vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, mollien-
di: ora venarum patefacit, capillum fluentem con-
tinet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cica-
trici

tricibus decorem reddit, cum vino illitū: medetur aurium doloribus, cū hydromelite aut rosaceo infusum suffitus secundas eicit, pestis immistū uiae duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem sinq; finiūt, & malagmata utiliter inferitur: aurium sistit cū vino vetere potum, & urinam cū

Ebenus.

CAP. CXI.

Ebenus optima habetur æthiopica & nigra. Nullos habet venarum discursus, factitij coloris leuore: cū frangitur densa apparet, mordacitū, atque leniter astringens. Suffitur incuncto odore supra carbonēs, sine summi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis: cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdā sesamina aut spinea ligna consimilia pro ebena vaneunt quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasq; mirū in modum pullet: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentāre vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq; eundē in modis peragunt. Alij pro

vi

ino aqua vtuntur. Vritur in fictili nouo, donec
carbonēs redigatur. Lauatur plumbi vsti mo-
do, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca mul-
tò magis. Succus recentibus folijs exprimi-
ur, defectis forfice vnguibus (sic appellatur can-
didæ foliorum partes) reliquum in pila premi & *Quid vn-
guis in ro-
sa.*
eri debet in vmbra donec cogatur, & ita ad o-
culorum circumlitiones recondi. Siccantur etiam-
um folia rosarum, continuò versata, ne muceant,
ne sit in eis insideat. Aridis rosis & in vino
lecoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis,
urium, oculorū, gingiuarum, sedis, recti intesti-
ni ac vuluæ, penna illitus aut infusus. Eadem sine
expressione tusa, præcordiorum inflammationibus,
humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest:
siccis ac tritis femina asperguntur. Misceri solent
ulneratis antidotis, atq; cōpositionibus, quas an-
theras vocant. Folia vruntur in calliblephara.
Rosælos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingi-
uarū fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita
pota citam aluiū, & cruentas reiectiones sistunt.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

Pastilli quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridum, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chma quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-
cem

cem, myrrha drachmæ sex, trita digeruntur in
pastillos, qui trium obolorum pondus æquent: sicca-
tiq; in umbra, in fictili non picato, atq; obturati
reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas
iridis Illyricæ totidē, & vinum Chium cum mi-
le miscent. Mulieribus monilium vice collo circum-
dato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris vi-
rus. Tritis etiā vtuntur ad illitiones & diapaema-
ta, quæ sūt ad sudores coercendos, ita vt à balnei
inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan vocant,
arbor est spinosa, ramis trium cubitorum,
aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu pipe-
ris, nigro, laui, amaro, densoq; cortice pallido, non
dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obli-
quis, lignosis. Nasclitur plurimum in Cappado-
cia, Lycia, & plerisq; alijs locis. Aspera loca a-
mat. Succī extrahendi ratio hæc est: Rami cum
radiculis tusi & antè per multos dies macerati
coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, do-
nec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium,
adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo,
aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquen-
dum exempta, oculorum medicamen: is additur:
reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium,
semine expresso & insolato. Optimū quod vri po-
test, restinctumq; rubetem spumam ostendit, gle-
bis

bis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis,
 & odore minimè viroso, cū amaritudine adstringens, crocino colore (cuiusmodi Indicum est) ceteris nio.
 præstātius atq; efficacius. Lyciū adstringit, cali-
 ginem oculorū discutit, genarū scabiem, pruritus,
 veteresq; fluxiones sanat: facit ad purulētas au-
 reis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorū fissu-
 ras, sedis rimas, attritusq; illitū: celiacis, dysente-
 ricis, potū inditumq; cōuenit: datur sanguinē ex-
 creantibus & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis
 morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua libi-
 tur: flauos facit pilos: reduuijs, vlceribus quæ ser-
 punt aut putrent, medetur: feminarū profluuia
 appositū sistit: rabiosorū iclibus ex melle potum,
 aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. * Tra-
 dunt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide
 appellato: ea spinarum generi ascribitur, ramos
 rectos habens terminū cubitorum longitudine,
 maioresve, rubo crassiores, à radice numerosos.
 Fractus cortex rubescit, folia olea similia. Herba
 in aceto decocta proditur lienis inflāmationibus
 & regio morbo mederi, & feminarū purgatio-
 nes elicere. Assēuerāt etiā crudam in potu, eosdem
 effectus præstare. Semen cyatho dimidio potum,
 pituitam expurgare: venenis quoq; auxilio esse.

Acacia.

CAP. CXV.

Acaria in Aegypto nascitur spina instar ar-
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens.

F

* Videntur
 Marcello
 quæ hinc se-
 quuntur, no-
 tha.

* Non est
 genuina ofi-
 ficinarum
 Acacia,
 quāuis ea-
 dem vi ac
 natura præ-
 dita,

Florem habet candidū, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligat modicè rufus et odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succū. Manat et gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandū, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamētis utilis. valet ad ignem sacrum: vlcerā quæ serpiūt, pernioes, pterygia, et oris vlcerā: prociētes oculos reprimat, mensū abundantiam sistit, procidū vuluā colibet: citā aluū supprimit, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lauat oculorū medicamētis, trito in aqua, mox effuso quod cōcreuerat, donec pura extet aqua: et ita cogitur in pastillos. Vritur etiā in cruda fidelia, donec fictile formacibus percoquatur: torreturq; in carbonū halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorū speciem contrahatur, & vitri modo perlucet, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustis ex ovo illitum, pusūlas non patitur erumpere. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoq; provenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habet rutæ. Semen lentisculæ

licula minus fert autumnis, in loculis cōnexis, terminum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

CAP. CXVI.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminū ripis, asperisq; locis, ac torrentiū alueis: ramos gerit longos, fractu peruiacces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius, vna harū album florē mittit cū purpureo: altera tantū purpureū, & semen, vt piper. Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potū venenatis ietibus, aquæ quæ cutē subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet: drachmæ pōdere in vino potū: genitura exoluit, caput tentat & soporē affert. Decoctū herba & seminis in desessione, mulieribus vuluæ malo opportunitis opitulat, itē inflammationibus: purgationes moue semē cum pulegio potū, etiā suffiū vel appositū: capitis dolorē dissoluit illitum, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoq; serpentīū morsibus auxiliantur: testium duritiæ cū butyro & folijs vitū emolliūt: rimas sedis semen cū aqua illitum mitigat, & cū folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginē sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Grægi ratio.

Barbaris
agnus castus.

Nominum
agni & lygi ratio.

ci, quoniam matronæ in thesmophorj's Athenien-
sum castitatem custodientes, folijs huius cubi-
tus sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter
inuiictam ferè ramorum flexilitatem.

Salix.

CAP. CXVII.

Salix vulgo notæ est: cuius semen, folia, cortex
& succus spissandi vim habet. Trita folia cū
exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniunt: sum-
pta per se & cū aqua præstāt mulieribus ne cō-
cipiant. Salignum semen in potu sanguinem ex-
puentibus prodest: cortex eosdem præbet effectus.
Corticis cinis admixto aceto maceratus, illitu
clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus
cū rosaceo in calyce punici calfactus, aurium dolo-
ribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri
vtilissimum: furfures purgat in corpore. Excipi-
tur succus qui manat ex ea cum floret, exciso cor-
tice. in plaga enim cōcretus humor inuenitur, que
ad purganda, quæ obstat oculis, suam vim præbet.

Sylvestris olea.

CAP. CXVIII.

Sylvestris olea, quam Latini oleastrum appel-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia astrin-
gunt: trita autē & imposita ignem sacrum, vl-
cera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, re-
duuias nomasq; colibent: cruistas emarginant
cum melle illita. Quinetiam sordida vlcera repur-
gant: inflammationes panosq; cum melle impo-
sita discutunt: cutem à capite vulsam conglu-
nant:

nant: oris vlceribus, & priuatim infantium, cō-
māducata medentur. Succus & decoctū eorūdem
habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebres
profluuiū, admotus succus inhibet: vna oculorū,
pus tūlisq; prodest: vlcera & veteres defluxiones
sistit, (quapropter in collyria additur.) ad gena-
rum erosiones perquā vtilis. Exprimitur succus
tūsis folijs, affuso vino aut aqua, siccatusq; sole in
pastillos digeritur: sed longè validior ad recōden-
dum succus habetur, qui cū vino quā cum aqua
expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, si-
ue pus effluat. Folia cōuenienter celiacis cum fa-
rina hordeacea illinuntur: Vruntur cū floribus fo-
lia, vt spodij vicē cinis prāstet, in cruda olla, obli-
to ore luto, vsquedū figlinum percoquatur: restin-
etāq; vino & rursus subacta, eodem modo vtun-
tur, postremo cerusae modo elota coguntur in pa-
stillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis ocu-
lorū constat spodio nō cedere, sed eisdem viribus
prāditū esse putandū est. Foliorū satinae oleae ea-
dem vis intelligitur, sed aliquanto inferior: vnde
ocularibus medicamentis ob suam mitiorem vim cō-
uenientior est. Sudor ligno virenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, et
vlceribus quae depascūt vorantq;: quod autem in-
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros un-
gues excutit. Colymbades trita & ambustis il-

litæ pustulas gigni prohibent, sordida ulcera purgāt, muriæ succus collutas gingiuas cōtrahit, & motus dentiū firmat. Oliua flaua & recēs stomacho vtilior est, vētri difficilis: nigra autē et matūra corruptioni opportuna est, stomacho aduersat, oculis nō cōuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascētia ulcera sistit, et carbūculos emarginat. Oleū syluestris oliuæ gingiuis putri vligine laborātibz colluitur, dentiū mobilitates stabilit, calfacti fofus gingiuis fluxiōe laborātibz vtilis est: lanā enim specillo circumligatā oleo madefacere oportet, et gingiuis admouere, donec albæ spectentur. Lacryma æthiopica olea.

CAP. CXIX.

Lacryma quam æthiopica olea stillat, scammonio similis quodātenus est, fulua, stillis exilibz constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastrisq; similem lacrymā sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis dentium impressa ad dolores efficax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sanat. Appellatur autem æthiopica & agrestis olea.

Amurca. CAP. CXX.
Murca (expressæ oliuæ recrementum) decocta

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præhens lycij effectus. Insuper dentium dolori et vulneribus, cum aceto, vino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruētia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinē, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiē cum decocto lupini, & chamaeleonte illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras articulariosq; dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimit.

Quercus, glans, fagus.

CAP. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putaminis glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericus, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in peso, feminis fluxione vuluæ laborantibus subijcitur. Glandes eodem effectus exhibent: urinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitæ venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias quas caecothæ vocant, & malefica vlcera cum salsa axuu-

gia conveniunt. Iligneæ glandes viribus quernæ antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radicis cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium trita & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castaneæ.

CAP. CXXII.

Sardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent. præsertim tunica quæ carnem et corticem media intercurfat. Caro his qui ephemerum biberunt, conveniens est.

Galla.

CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus, Aliqua omphacitis appellatur, parva quidē sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, levis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusq; vis vehementer adstringere. Trita excrecētia in carne, fluxiones inguinarū & ruiæ, atq; oris ulcerationē cohibent. Nucleus, dentiū caueris inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acidamuria extincta, sanguinē supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & cōtra vulvas procidentēs, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis cæliacisq;

cum

cum vino aut aqua trita cōueniēter illinūtur, aut bibuntur: obsonijs addi debēt, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est: quod his affectibus conferat. In summa, his vtendū ad adstringenda, aut succanda quæ opus sunt.

Rhus.

CAP. CXXIIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus *Officinis* erythros appellata, semē est coriarij fruti- *sumach,* *Arabum* cis, sic vocati, quoniā coriorū infectores eo vtunt, *more.* ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascēs, binū ferē cubitorū altitudine, folijs oblongis, sub- rubētibus, in ambitu serratis, acino vuarū gra- ciliū denso, magnitudine terebinthi, quadāmtenus lato: cuius corticosa tunica perquā vtilis est. Fo- lia vine habent adstringendi, & acaciæ effectus præbēt. Decoctū capillos denigrat, dysentericis in- funditur, & in potus eorū infususq; adiicit: in- stillatur auribus purulentis. Gangrænas & ptery- gia cohibēt folia ex aceto aut melle illita. Ligua- mentū fit ex aridis folijs, ad crassitudinē mellis in aqua decoctis, ad eadē, vt lyciū, conueniēs. Semen eosdē effectus exhibet: celiacorū, dysentericorūq; obsonijs inspergitur: fracta, desquāmata, luidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lin- guæ asperitates cum melle abstergit, candida fœ- minarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; effica-

cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium ca-
vis imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio matu-
ritatis vigore, autumnio decerpi solet, Arabici
myrobalani similis, pomatis cognomine, colore vi-
ridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturita-
tem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Pal-
ma acerba est & adstringēs: cōtra alui fœmina-
rumq; profluvia, in vino austero hibitur: hæmor-
rhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœnicoba-
lani recētes plus siccis adstringūt, capitis dolorem
afferunt, copiosiores in cibo inebriāt, sicciore sanguinem
excreantibus, stomachicis, & dysentericis
vtilis in cibo: illinūtur cū cotoneo et cerato ænan-
thinove sic vitis. Cariotæ, præsertim esu, faucium
asperitati medentur. Thebaicarū decoctū potu æ-
stuationē sedat, vires recreat cum hydromelite ve-
teri sumptū: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinū ad
eadē conueniens. Decoctū per se potu & gargari-
zatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, caterorū more, cremati in crudo sicci-
li, & vino restincti, cinere loto, spodij vicem effi-
ciunt: muscenturq; in calliblephara. Quod si non
iustā vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim
adstringēdi habent, et spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum ruam & pustulas,
palpebrarum defluvia, cum nardo effectum præ-
bent:

*h*nt: corporis excreſcentias cum vino reprimunt,
 vlcera ad cicatricem perducūt. Sed inter primas
 vtiles ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. CAP. CXXVI.

Palma, quā aliqui elatē aut ſpathā appellāt,
 fructus palmarū adhuc florentiū, inuolucris
 eſt calix q̄; in quo in ſpiſſamētū vnguentarij vtū-
 tur. Optima habetur odorata, adſtringēs, pōdero-
 ſa, praecluſa, intus pinguis. Vis ei adſtrictoria: ſi-
 ſtit vlcera quae depaſcunt, laxatos artus cōmittit,
 trita miſcet cataplaſmatis & malagmatis: pro-
 deſt prae cordijs, imbecilli ſtomacho, et iocineri aſſe-
 cto, miſta cōferētibus cataplaſmatis. Eius decoctū
 ſubinde deterſum, capillos denigrat: datur bihēdū
 congruē, renū, veſicae, et viſcerū vitijs: vuluae ac
 vētris fluxiones ſiſtit: ſcabiē cū reſina, & cera ſa-
 nat, ſi viginti diebus recens apponatur. Inuolu-
 tus q̄; in ea elate fructus, quē ſuo amplexu fouet,
 elate etiā vocari ſolet, & ab aliquibus boraffus.
 Adſtringit, & ſpathae effectus praestat, nō ſic vn-
 guentū expetit. Alba medulla caudicis recens
 ni cibo, aut decocta eadem facit, quae boraffus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

Malum punicum omne boni ſucci eſt, ſtoma-
 cho vtile, perexiguū ſufficiens alimen-
 tum. Dulcia ſtomacho vtiliora habentur, ſed
 aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes
 pariunt, vnde in febris abſcuntur. Acida ad-
 ſtrictio

Vulgò ma-
 lum grana-
 tum.

stringunt, æstuantî stomacho auxiliatur, & multo magis contrahunt, ac urina cient. Ora gingivasq; lædunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorû acidi punici in sole siccati, & olivis insparsi, concoctive, fluentem aluum stomachumq; sistunt, Cælesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinẽ excreantibus: ad desensus dysentericorum feminarumq; fluxione vulvae laborantiũ vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduvias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia:

Cytinus. præsertim acidorû. Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicũ, præstant utilitates: humida gingivarũ vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, herniã prolapsu intestini erumpentẽ cataplasmate repellunt. memoriæ tradunt, qui tres, quàm minimos cytinis deuorauerit, nullã eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis

Malicoriũ. exemplo. Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctum radicis potu latus vètris tineas pellit, &

Balaustiu. easdem euocat. Balaustium sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui

adstr

adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypoci-
stis, & cytinus.

Myrtus.

CAP. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina
quàm cædida, et in hoc genere multò ma-
gis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis
& myrti & seminis adstringit. Semē viride aut
aridum in cibo datur sanguinē excreantibus, et ve-
sicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expres-
sus eosdē effectus exhibet: stomacho utilis, urinam
cit: prodest cōtra phalangij morsum, & scorpionis
ictus in mero: seminis decoctū capillū tingit, ius
decocti in vino vlcera in extremis membris nata
sanat, oculorū inflammationes illitum cū polline po-
lentæ lenit, cōtra egilopas illinitur, crapulā arcet
præsumptū vinū, quod feruefacto aliquantū eius
semine exprimatur: aliàs enim acorē cōtralheret.
Præstat idem seminis effectus. Utile procidentie
vulvarū in defectionibus, sedis vitij, & fæminis
fluxione vulvæ laborantibus: purgat fursures, vl-
cera capitis manantia, atq; eruptiones papularū,
fluentes capillos continet. Additur quoq; in me-
dicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod
ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad
defectiones balnearum convenit, & contra laxa-
tos artus, & malè solidescentes. Eo fracta ferru-
minationi repugnātia utilissimè fœuentur, vitili-
ginem emendat, purulentis auribus infunditur, &
capē

capillos denigrat. Succus eadē efficit. Trita folia,
 & ex aqua illita humidis vlceribus, & parti-
 bus omnibus fluxiōe laborātilibus, celiacisq; pro-
 sunt: et admisto omphacino oleo, aut exiguo rosa-
 ceo cū vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, te-
 stium inflāmationes, & epinyclidas, & condylo-
 mata. Arentiū foliorū farina vtiliter inspargitur
 paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū feminūq;
 perfusiones: cardiacorū sudores colibet. Folia cru-
 da seu cremata cū cerato, ambustis, paronychijs,
 pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus
 adfuso vetere vino aut aqua cœlesti, cuius recētis
 vsus est: nam exiceatus planē cariem sentit, &
 vires amittit. Myrtidanū dicitur, adnatum inæ-
 quabile, verrucosum intumescensq;, & concolor:
 quod perinde quasi manus myrti caudicē ample-
 ctitur. Magis quāmyrtus adstringit: tusum ad-
 dito austero vino reponitur, coactumq; in pastil-
 los siccatur in vmbra, multo efficacius, & folio et
 semine, cerato, pessis, in seſsionibus, cataplasmatibus
 admistum, vbi adstringendum aliquid est.

Ceraſia.

CAP. CXXIX.

Ceraſia alio vtilia sunt, si viridia sumantur:
 eadem siccata, illam sistunt. Gummi quod
 cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetustē
 medetur: colorem commendat, visum ex acuit, ap-
 petentiam inuitat: idem ex vino potum calculo-
 sis auxilio est.

Siliq

Siliquæ.

CAP. CXXX.

Siliquæ recētes stomacho aduersantur, aluum Graecis Cæ
soluunt : eadem siccatæ sistunt, stomachoq; ratia: arbor
tiliores sunt. Vrinam ciunt, sed præcipuè, quæ autem ipsa
inaceis condiuntur.

Galeno cera

Mala.

CAP. CXXXI. tonia dicta

Folia, flores, & germina cū omnis mali, tū tur.
maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acer-
is adstringendi vis inest: maturis verò longè se-
us. Ex ijs vernabile gignūt, nervos omneis laxāt,
inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, vri-
nam ciunt: verū tosta mitiora habentur. Prosumt
aliacis, dysentericis, purulenta extusientibus,
holicis, præsertim cruda. Maceratorū liquor cō-
modè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui
latur. Succus crudorū assumptus orihopnoicis sa-
utaris est. Decocto fouetur vulua, & sedes si pro-
idat. Cotonea quæ melle condiuntur, urinā mo-
uent: mel autē sibi cōstringentē illorum vim, &
inspissantē adsciscit. Quæ cū melle coquuntur. sto-
macho atq; ori gratiora sunt, sed minus inspis-
cant. Cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cōhi-
bendū aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vo-
mitiones effundatur, ad mammarum inflamma-
tiones, præduros lienes, & cōdylomata. Fit vinū
ex ipsis tuis expressisq; : sed quò perduret, quin-
decim sextarijs succirni mellis adiungitur, alio-
quin in acorem degenerat. Prodest ad omnia.

qua

quæ dicta sunt. Fit & oleū ex ijs, quod melinu
 vocauimus, quo vtimur quoties astringenti ol
 est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotūdi
 parua & odorata: quæ verò Struthia dicuntur
 magna quidē sunt, sed minus vtilia. Flos & v
 ridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs cōm
 niens, quæ adstrictionē desiderāt, inflammationi
 bus oculorū, reiectionibusq; sanguinis. Cōtra cit
 aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. M
 limela ventrē molliunt, & ab eo animalia expel
 lunt, stomacho negotiū exhibēt. Aestiuosa. Ea mu
 tis dulcia mala vocantur. Epirotica mala, quæ
 Latine orbiculata dicunt, stomacho vtilia: sistun
 aluum, vrinas euocant, malis tamen cotoneis inu
 lidiora. Syluestria mala similia sunt vernis, &
 adstringunt. Sanè in hunc vsum immatura o
 mnia opus sunt. Persica poma matura tā stoma
 cho, quàm vētri vtilia sunt. Acerba aluum cōhi
 bent, sed sicca vehemētius. Decoctū ē siccis alui sto
 machiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à La
 tinis prœcocia dicunt, minorā sunt supradictis, et
 stomacho vtiliora. Medica mala Persicæve aut
 cedromela, quæ Latini citria vocant, nemini non
 cognita. Arbor ipsa omnibus anni tēporibus po
 misera, alijs deciduis, alijs subnascētibz. Malū
 oblongū est, rugosum, colore aurū imitās, cū gra
 uitate odoratu, semen habet pyri. Id in vino potū
 venenis resistit. aluū mouet, oris suauitatem com
 mend

mendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiarijs impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra.

CAP. CXXXII.

Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata ledunt.

Achras pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vim pyro adstringentiorē habet, & ad eadem conuenit: stringūt etiā eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus.

CAP. CXXXIII.

Mespilus, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyxacanthæ: fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: iqua ex causa id nonnulli triccon appellauere. Tardè maturescit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptius, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor.

CAP. CXXXIIII.

Lotus arbor est vastæ magnitudinis, ferēs, baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gra-

G

tam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramen-
torum ligni decoctum siue potu, siue infusione
dysentericis ac feminis fluxione vuluæ laboranti-
bus, auxilio est, rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus.

CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ
modo oblongas, quæ primū virent, dein per
maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem repræ-
sentant. In cibo adstringunt, profluvio alui atq;
dysenteria salutare, siue in edulio, siue in defruto
exhibeantur. Muria, ut oliuæ, cōdiuntur. Sanies,
quam virentia folia torrendo resudarunt, in peti-
gini conuenienter illinitur.

Sorba.

CAP. CXXXVI.

Sorba colore luteū referētia prius, quā ma-
turescāt, dissecta & sole siccata madunt, ut
albū sistāt. eadē est functio molitorū farinae, si po-
lēte loco sumat: quod et decoctū eorū in potu præ-
stat Prunus. CAP. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomū estur: sed
stomachū malè habet, aluum mollit. Syria
ca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur,
exlicata stomacho utilia sunt, aluum adstringūt.
Folia pruni in vino decocta collutione, & gar-
garizatu vnam, gingiuas, & tōsillas fluxione la-
boranteis reprimunt. Præstant idem syluestriū
prunorum bacca, post maturitatē exiccata: cum
sapa verò decocta, stomacho utiliores redduntur,
aluum

aluumq; magis adstringunt. Gummi prunorum
 agglutinat, potum in viuo calculos cōminuit: ex
 aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. CAP. CXXXVIII.

ARbutus sive vnedo arbor est cotoneæ malo
 nō dissimilis, tenui folio: *cuius fructus prun
 u magnitudinē implet, nullo intus nucleo: huic magnitudi
 nem acylo cognomē est: maturus aut flauet, aut ne quidem
 ubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, ca- hic fructus
 itisq; dolorem mouet. nequaquā
 cedit: cæte-
 rum effigie
 adeo exs
 pressè re
 fert fraga,
 vt nil que
 at expres
 sius.

Amygdalæ. CAP. CXXXIX.

AMygdalæ amaræ radicis tritarū decoctum
 vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idē
 munus præstāt, menses admotæ ciūt, capitis dolori
 auxiliant, illitæ fronti aut tēporibus cū aceto vel
 rosaceo: epinyctidas sanāt ex vino, itē putrescētia
 vlcera, & quæ serpiūt, & morsus canis cū melle:
 earū autē esu dolores finiuntur, aluum emolliūt,
 omniū faciunt, vrinā cient, cōtra sanguinis reie-
 ctiones cū amylo assumuntur, renis vitij, et pul-
 monū inflammationibus ex aqua in potu aut ecle-
 rmate cū resina terebinthina dātur: calculosis dif-
 ficiliq; vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cū
 nelle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus co-
 i, nucus auellanae magnitudine: quinis septenisve
 irasumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vul-
 nes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriū-

tur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijciē-
bus sanguinem, potū auxilio est: impetigines quā-
summum corpus occuparunt, illitum cum acet-
tollit: tussē vetustā cum diluto vino potum med-
tur: calculosis cum passō bibere prodest. E nucibu
græcis, dulces cibo idoneæ, sed multò minus valent
in remedijs, quā amari: attamen extenuant,
vrinam ciunt, recentium esu cum suo putamine,
humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia.

CAP. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis
nucibus similia sunt, & stomacho amica:
trita cum vino contra serpentium ictus prosunt,
sive edantur, sive libantur.

Nux iuglans.

CAP. CXLI.

Nuxes iuglandes, quas nonnulli Persicas vocāt,
sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles,
biliosæ, capitis dolorem inferētes, tussietibus inimi-
cæ, et vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cū ruta verò
& ficis præsumptæ, et à summo cibo, venenis resi-
stūt: nec minus si à veneni haustu comedant: lar-
gius esitata tinea latas pellit, illuminat māmariū
inflammationi, abscessibus, luxatisq; cū mellis exi-
guo, et ruta: cū cepa autē, sale & melle, canis ho-
minisq; morsui proficiūt: tormina: cū calyce suo
perustæ, et umbilico admotæ, sedant. Putamen cō-
bustū tritūq; in oleo, et vino, infantiū capite per-
uncto, nutrit capillis, alopecias repletq;. Sifūt mē-
ses

es nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur: idem
veteribus, illiti carbunculis, gangranis, & agi-
opis medentur: alopecijs commanducati, & im-
positi praesenti sunt remedio. Nucibus tussis oleum
exprimitur. Rectes stomacho innocentiores sunt,
potius suauiores: itaque allio mixta eximunt acri-
moniam. Luores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. CAP. CXLII.

Nuces auellanae, quas & leptocarya vocant,
stomacho infesta sunt: ipsae tamen tritae, &
in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tostae
& cum exiguo piperis potae destillationem con-
sequuntur, crematarum cinis cum axungia aut ad-
e vrsi perunctis alopecijs capillum reddit. Aunt
nonnulli vsta earum putamina, & in cineris spe-
ciem redacta, cum oleo, castorum oculorum pupil-
lis infantibus denigrare, perfuso sincipite.

Morus. CAP. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum
soluit, stomacho inutilis est, & facile cor-
ruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus: de-
fectus autem aereo vase atque insolatus, adstringen-
ter redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & ton-
illarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed
iolescit vis eius, adiecto scissili alumine, galla,
roco, & myrrha: item myricae semine, iri, & thu-
re. Immatura: mori poma siccant, tusaque acinorum
hois vice olsonijs miscetur, ut cxliacos inuenit. Ra-

dicis cortex decoctus in aqua & potus alium refecit, latus ventris tinea excutit, his quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntque capillum vitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postmodum concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula disscuit, & alium purgat.

SYCOMORUS. CAP. CXLIIII.

SYCOMORUM aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nasceitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici seracibus: ubi prouentu facundo restitilibusque iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum alio utile est, sed perquam exile praebeat alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis iclu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga

viol

violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctionem repugnantes. bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu primi magnitudine, multo dulciore, supra dictis cætera similis.

Fici.

CAP. CXLV.

Fici matura recētes stomachū lædunt, aluiū solvunt: sed faciliè contracta ab eis fluxio sistitur. sudorē euocant papulasq; sitim sedant, colorem restringunt. Siccis natura excalfaciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant aluo vtilis, rheumatismis vētris & stomachi cōtraria: gutturi autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima, feruefacta cū hyssopo & potæ, thoracē purgant: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conueniunt: aluum molliunt iussæ cū nitro & cinco, dem māducata. Decoctū arteriæ & tonsillarū inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fetus cum fenograceo & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ torminti-

bus infunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutit, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri aut calce addita. Cruda si cū antedictis tundant, eadē efficiunt: cū malicorio, pterygia purgāt: cū atramēto sutorio, deploratis ferè tibiariū fluxionibus, et cacoethicis vlceribus medentur: quin & cū vino decoctæ addito absinthio & hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinunt, Crematæ cū cerato sanāt per- niones, prurigines, somitusq; si crudæ terant, & sinapi liquoreq; aliquo exceptæ auribus instillent. Tam syluestris, quàm sativæ fici lacteus succus coaguli modo lac cōtrahit, cōcretumq; dissolvit, ut acetū: exulcerat corpora, meatus aperit, solvit al- uum, vuluā recludit cū detrita nuce græca potus, menstrua ciet cū luteo oui appositus, aut Tyrrhe- nica cera: podagricorū cataplasmatibus cū farina fœnigræci & aceto utilis: lepras, lichenas, vitili- genes, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manātia, cū polēta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venenatorū ictibus & ra- biosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, et cauis eorū additus: verru- carum informicationes tollit cum adipe, circūlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è tene- ris ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, si- lente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponun-
tur

tur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facile afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendū ficulneo surculo spathæ loco moueatur.

Grossi. CAP. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ, illitæ strumas nodosq; omneis emolliunt: cruda formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritia perfricantur. Nigræ ficus folijs cauliculisq; candidæ vitiligines perunguntur, faciunt ad canis morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, vocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiunt, contra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quàm sativæ lixiuiū, crematis ramorū cauliculis: quod subinde macerari opus est & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest: nanque expurgat & consumit, quæ excrescunt: eoq; sic vtendum est: Spongia assiduè hoc lixiuiū imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras cõmittit, non secus

atq; emplāstra quæ cruentis vulneribus iniiciuntur: enema vocāt. Bibitur ad discutiendū sanguinem concretum, & cōtra præcipitationes, rupta, cōuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatū: addito olei exiguo, celiacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: neruorū vitijs, conuulsionibus commodè illinitur ex oleo, vtpote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorū morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiua, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea.

C A P. C X L V I I.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem: in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinā redacta, illitu sanguinis eruptiones sistūt. Arborem hanc proderut aliqui in Perside exitiosam esse, trāslatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis.


C A P. C X L V I I I.

Iberis siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virētiōra: caulē cubitalē, aut minorē: in incultis nascitur, æstāte lacteum florē promit, quo tēpore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfaciētes & adurētes: ipsæ enim ischia dicis cum salsa axungia emplāstri modo viles, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas descendatur, & postea oleo cū lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,
Liber I I.

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
 interprete.



N primo chariſſime Aree libro, quē
 de medicinali materia condidimus,
 de aromatibus, oleis, vnguentis, arbo-
 ribus, & naſcentibus ex eis ſuccis, la-
 crymis ſeminibusq; diſſeruimus. In hoc autem ſe-
 cundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugi-
 bus, atq; oleribus explicabimus, ſubnexi herba-
 ceis quæ acri prædita ſunt facultate, vtpote quæ
 cum ipsis cognatione iuncta ſint: qualia allium,
 cepa, ſinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognato-
 rum vires diſiunxiſſe videamur.

Echinus ſiue erinaceus. C A P. I.

Marinus echinus ſtomacho ventriq; utilis
 eſt: vrinam cit, huius teſta cruda maſ-
 ſata commodè medicamentiſ admiscetur, quæ
 pſoras abſtergunt: crematæ verò cinis ſordida
 vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit.

Terr

Terrestris erinacei coriū cōbustū alopecijs cū pice liquida aptissimè illinitur, assiccātū corpus & cū aceto mulso potum, renum vitijs auxilio est: item aquæ quæ cutē subijt, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactū, ad eosdē vsus vtilissimè recōditur.

Hippocampus.

CAP. II.

Hippocampus marinū animal est exiguum cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vnguēto illitus, alopecias replet.

Purpupura, buccina, eorumq; volutæ.

CAP.

III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrescencias in carne colubet, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis salis plena, fictili crudo adurat, dētifricio conueniunt: ambustis vtiliter illiuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam postea quā vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum indurātū, spōte sua decidet. Fit etiā calx è buccinis, vt in eius mētiōe demonstrabimus. Cionia vocātur purpurariū buccinorūq; mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiore purpuris buccinisq; facultatē vrendi cōsequuntur, quoniā apprimēdi naturam
obtin

LIBER SECVNDVS.

obtinēt. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho vtilēs: sed aluum non molliunt.

Mituli.

CAP. IIII.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle vtilēs habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus vtilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

Recentes tellinæ aluo vtilēs, sed maximè ius earum: salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos * renasci * τῶν βλεφάρων. non patiuntur.

Chamæ.

CAP. VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

CAP. VII.

Vnguis siue onyx conchiliæ tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in India nardiferis lacubus inuenitur. suauè ideo spirans odorem, quod conchyliæ inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquàm stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inaruerint. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur.

citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquā
nus castoreum olent. Iidem suffitu excitant fa-
minas vuluæ strangulatu oppressas, comitiales q̃
poti ventrem molliunt. Crematum conchylium
eadem efficit quæ purpura & buccinum.

Cochleæ.

CAP. VIII

Terrestris cochleæ stomacho vtilis sunt, &
nō facile corrumpunt. Optimæ Sardonica
Aphricana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, a
Chio gignunt, et quæ in Liguria alpibus, poma-
tia, id est operculares, cognominatæ. Marina sto-
macho idonea, & facile aluo excernit. fluuiatili
virus olet. Quæ verò, vepribus frutetis q̃; glutina-
ta coheret, quæ vocat nonnulli sesilon, ventrē et sto-
machū turbat, vomitiōes excitat. Crematæ omniū
testæ excalfaciēdi & vrendi naturā sortiuntur:
purgāt lepras, vitiligrines, dentes q̃; emendāt ocu-
lorū cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines,
ac visus hebetudines, si cū carne sua vstæ tritæ q̃;
ex melle illinant. Cruda cū tegumētis impositæ,
aquæ inter cutē tumores exugūt: sed nō antè sol-
uātur, quōm omnis hauriatur humor. podagri-
cas inflāmationes leniunt, impactos corpori acu-
leos illitæ euocāt, mēses tritæ et admotæ ciūt. Car-
nes earū cū thure & myrrha illitæ, cū vulne-
ra alia, tum maximè quæ nerui acceperunt, con-
glutināt: tritæ in aceto, sanguinē naribus erūpen-
tē infranant: vinæ corpus, et præsertim Aphrica-

na

LIBER SECVNDVS. 113

et cum aceto deuoratum, stomachi dolores miti-
at, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum
ide bibatur, coli vesicaeque cruciatus sanat. Terre-
ris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu-
ntore eius, pilum attingat.

Cancrī.

CAP. IX.

C Ancrorum fluuiatilium exustorū cinis qui
duo cochlearia expleat, adiecto dimidio ra-
icis gēlianae modo, triduo potus cū vino, magno-
re prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum
disque, perniunculos, & carcinomata, cū decocto
ielle lenit: triti crudi, potiūque ex asinino lacte, au-
iliantur contra serpentium phalangiorumque mor-
us, atque scorpionum ictus: decocti autem & cum
ire esulati, is profunt qui tabe cōficiuntur, aut le-
orem marinum hauserunt: necant scorpiones tri-
, & cum ocymio admoti. Possunt eadem mari-
i, verū inefficacius omnia praestant.

Terrestris scorpio.

CAP. X.

T Errestris scorpio tritus & impositus, suae
plagae remedium est: quin estur assatus,
de eadem.

Marinus scorpio.

CAP. XI.

M Arini scorpionis fel conuenit ad suffusio-
nes oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus.

CAP. XII.

D Raco marinus dissectus & apertus imposi-
tusque ictus spinae suae qua ferit, medela est,

Scor

Scolopendra.

CAP. XIII

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auelli
capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis.

CAP. XIII

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus
admotā, cruciatus vehementiā mulcet: ea
dem apposita euersam sedē prociduatq; cōrret.

Viperæ.

CAP. XV.

Viperinæ carnes si cocta edantur, claritatem
oculis afferūt, neruorum vitij auxiliantur
increscētes strumas reprimunt: detracta autem
cute, caput caudaq; quoniā carne vacant, ampu-
tari debent. quippe commentitium est quod præci-
pitur, certam vtrinq; mensuram præcidi oportere.
Reliquum verò corpus exēptis interaneis elo-
tum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis
exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui viperas escent,
pediculos procreari: quod planē à veritate abhor-
ret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere,
qui eo cibo vescūtur. Sal ex eis ad eadem confici-
tur, sed inefficacior est. Vina autem vipera in fi-
ctile nouum demittitur, adijciuntur salis carica-
rumq; tritarū, singulatim quinq; sextarij, mellis
cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblutitur,
& fornacibus inasatur, donec sal in carhones re-
digatur, qui postea tritus in pulueris faciē, recon-
ditur. Plerūq; vt ori gratior fiat, immiscetur nar-
di spica, aut folium, aut malabathri momentum.

Senect

Senecta anguim. CAP. XVI.

Senecta anguim in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipue viperinam.

Lepus. CAP. XVII.

Lepus marinus loligini parvæ similis est, qui per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui valetudine contracti sunt: affrictu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vulvæ & alui fluorem sistit, comitiales iuuat, contra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. CAP. XVIII.

Marina pastinaca radius, qui eius cauda Menatus aduersis squamuis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

Sepia. CAP. XIX.

Sepiæ coctæ dum estur atramentum, agrè concoquitur, aluum mollit, collyrijs è testâ factis conuenienter genarum scabritiæ perfricatur:

H

ustum in sua testa donec id quod crustosum est
abscedat, postea tritum, expurgat vitiligines, fur-
fures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in me-
dicamenta oculorum addi solet: contra albugines,
oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia
oculorum absument, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis.

CAP. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum he-
betari constat. Is marini draconis, aranei,
ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atq; dis-
sectus admoueat.

Hippopotamus.

CAP. XXI.

Hippopotami testes exiccati ac triti contra
serpentium morsus bibuntur.

Fiber.

CAP. XXII.

Fiber ancipitis vite animal, plerumq; cum pisci-
bus & cactis ex aqua victum capeſcit. Huius
testes serpentium venenis aduersantur, sternutamen-
ta mouet, et in vniuersum varios obtinet usus: si-
quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis
cum pulegio poti partus secundasq; eiciunt: contra
inflationes, tormina, singultus, venena, ixiamq;
ex aceto bibuntur: letargicos, & vtrumq; veterno
obdormiscetes excitant infusi: cum aceto autem & ro-
saceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti
& illi profunt tremulis, conuulsionibus, & o-
mnibus neruorum vitis. In summa, calfactoriam
vim habet. Eligi debet testes qui ex vno ortu con-

LIBER SECVNDVS. 117

rexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus redolente, gustu acri, mordete, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quē fraude aliqui corrumpūt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacū cū sanguine & castorio subactū, & ita exiccantes. Vanū est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abijci, quū venatu vrgentur: siquidē tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eueniente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris. CAP. XXIII.

Mustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota, aduersus omnia serpentium venena presentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius ventriculis coriandro farctus inueteratusq; percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis cōfert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. CAP. XXIIII.

Contra omniū serpētiū venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, usq; earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earū cinis pro-

fluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinuntur. Viridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorum instillatus: decocta in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem praebet aluum: sale vero conditus, minimū suppeditat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem expedit. Illita saluti caro, aculeos & infixa corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fetus adiungatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosque reprimat: nomas cohibet, thymos clauosque absument. Caro non secus atque salsamentum prodest a scorpione percussis, aut a cane demorsis.

Mænæ.

CAP. XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus, si costata rima in duodecim aqua sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub diuo refertur.

igeratus potui detur, alius sine molestia deicit.
 illitus cōtra serpētium canūq; morsus auxilio est.

Thunnus. CAP. XXIX.

Conditanēi thūni caro, quam omotharichon
 vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera
 omne præster momorderit: sed oportet vinum
 in amplurimum subinde cogantur haurire, ita vt
 vomitione reddatur. Cōtra acrimonas esitatorū
 maxime v.ilet, canū morsibus vtilissimè illinitur.

Garum. CAP. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq;
 sale maceratis liquamen est, si ex eo fotus
 at, depascentia vlcera sistit: morsus à cane mede-
 ur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: non
 nullis, vt exulcerata adurat: alijs autem, ad lace-
 nda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXI.

Recentium piscium ius, modo per se, modo
 ex vino potum, aliū subducit. Præuatim ad
 unc vsum conficitur è phycidibus & scorpionibus,
 & iulide: è percis, & recentibus alijs saxa-
 libus, nec viris resipientibus, simpliciter cum
 qua, oleo & anetho.

Cimices lectularij. CAP. XXXII.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, canis fa-
 barum inclusi, si ante febrium significatio-
 es septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: &
 intra fabas sumpti, percussis ab aspidē profunt;

vulvarum examinationes olfactu reuocant: pol-
cum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abi-
gunt: triti & vrinaria fistulae impositi, vrinae an-
gustias leuant.

Millepeda. CAP. XXXIII.

Millepeda, quæ sub aquario vase stabulan-
tur, animalia sunt multis pedibus niten-
tia, quæ cōtacta manu cōtrahuntur in orbē: hæ ex
vino potæ difficili vrinae, et regio morbo auxiliā-
tur. Millepedas illini anginis cū melle vtilissimū.
Trita, & in cortice mali punici calfacta, dolori-
bus aurium, addito rosaceo, conueniēter instillātur.

Blata pistrinaria. CAP. XXXIII.

Blata eius quæ in pistrinis inuenitur, inte-
raneæ trita aut cum oleo decocta, aurium do-
lores instillatu mitigant.

Pulmones CAP. XXXV.

Podagras perniōesq; emēdat pulmo marinus
recēs, tritus & illitus. Suillus et agninus vr-
sinusq; pulmo impositu attritus à calceamētis con-
tractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò
si arefactus bibatur, suspiciosos adiuuat. Adeps
quoq; liquefactus, infususq;, auris dolorem finit.

Genitale cerui. CAP. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potū, à vi-
pera demorsi auxiliatur.

Vngula asini. CAP. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos binis

ochlearibus potus proditur comitiales adiuuare,
eadem oleo subactæ strumas discutiunt: & illitæ
bernionibus medentur. Caprinarij cinere perun-
ctæ ex aceto alopecia sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & * su-
per ungulas in flexu harum partium indu-
rati calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus
mederi traduntur.

κατ' ἐπι-
γναφὴν πῶ
ἐπιστρα-
φὴν.

Iocinera. CAP. XXXIX.

ASini iecur inassatum esu comitialibus pro-
dest, veruntamen ieiunis edendum præcipi-
tur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi li-
sciosos prodest: & diu coquitur, apertos oculos hal-
itu eius vaporari: prodest in cibo totum ad eadem.
Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehen-
di. Aprinij recēs si arefactū teratur, ex vino poti
contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est. Ie-
cur canis, qui rabie exagitur, totum & in cibo
ab emorsis sumptū, ne tēletur metu aquæ tueri cre-
ditur. Utitur autē ad arcēdos aquæ pauores den-
te eo, qui caninus dicit. hūc à cane, qui momordit
exēptum, & folliculo inditū, pro amuleto brachio
adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur,
ex hydromelite binis ligulis poti, secundas pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum

atritus sanat.

Gallinæ.

CAP. XLI.

Dissecta gallina, & adhuc calentes appo-
te, serpentium morsibus auxiliatur: si-
identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum
vino bibendum datur contra serpentium morsus, sang-
nem à cerebri membrana profluentem sistit. Quae in
teriore venticuli galli sinu residet membrana, sec-
ta in laminas cornu specie similis (ea verò inter ce-
quendum abijci solet) siccatur, tritaq; in vino conui-
nientissime stomachicis datur in potu. Ius è veteri
gallinaceo alium deijcit. Abiectionis itaq; interaneis
ilem cõijci oportet, & cõsuto ventre decoqui in vi-
ginti sextarijs aquae, donec ad treis heminas redi-
gantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Ali-
qui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicum
aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bi-
lem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, susp-
rionibus, articularibus morbis, & inflationibus stomachi.

Quorum natura.

CAP. XLII.

Ouum molliculum plus alit sorbili, & du-
rum plus molli. Luteum oui, contra oculo-
rum dolores utile est: inassatum sedis inflamma-
tionibus prodest, cum croco, & rosaceo: & con-
dylomatis, cum meliloto: cum vicia autem fruticis,
eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigi-
tur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta
cutis

cutis occludit, inflammationes oculorū infusum le-
nit, ambusta, si statim eo perungatur, pustulas nō
sentiunt: faciem à solis adustione tuetur, fronti im-
positū cum thure fluxiōes arcet, auertitq; inflam-
mationes oculorum lana exceptum, addito rosa-
ceo, melle & vino, mitigat. vtiliter contra hāmor-
rhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summē
tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulce-
rationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sangui-
nis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. CAP. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, vesicæ do-
loribus prosunt.

Locustæ. CAP. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu vrinæ difficultates ad-
liuuant, præsertim q̄ fœminas male habet: ea-
rū carnes nullo sunt in vsu. Est & quoddā genus
locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis,
pralongis cruribus. Exiccata autē si ex vino biba-
tur, cōtra scorpionis morsus magnopere proderit.
Hac abundē vescuntur Aphri, qui Leptim incolūt.

Osisifragus. CAP. XLV.

Venter eius auis, quam Latini osisifragum
appellant, particulatim potus, calculos cum
lotio pellere proditur.

Galerita. CAP. XLVI.

Galerita auicula est parua, apicem in verti-
ce, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cē

ho sumpta, celiacos adiuuat.

Hirundines. CAP. XLVII.

Diffectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore varium, alterum purum eximes: id priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, et saepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, ut ficedulae, in cibo, aciei visus medicamentum praebent. Tam pullorum, quam matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginae eo commodè perunguntur: vuae & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsae et pulli exiccati, si drachmae pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginae morbo conflictantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

Eboris scohe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

Svis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus collis, lorisque torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. L.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesicae doloribus cum tragacantha: feminis fluxione vulvae labor

borantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnū indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & de fluxionibus salutare est: infriſtum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruefactum in aceto, si eo gingiua colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca. CAP. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis beſtijs feriri negantur.

Cantharides. CAP. LII.

EFRUMENTIS congeſtæ cantharides ad recon- dendum idoneæ sunt, quæ fictili vaſe non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerſo ſuſpenduntur ſuper aceti feruentis, quam acerrimi halitum, donec æſtu exanimentur: poſtea lino tranſfixæ reponuntur. Potentiſſimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in penis tranſuerſas habent, promiſſoq; corpore craſſæ ac blattarij modo perpingues: ſed inertes ac imbecillæ, quæ vnius ſunt coloris.

Bupreſtes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

SIMILI modo recoduntur bupreſtes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ ſupra cribrum ſuſpenſum feruenti cinere pauliſper inſoſtæ, reponuntur. Vis omniū cõmunis erodere, vlc

ulcerare, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus addita. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod urinam moveant. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra. CAP. LIIII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle servatur ad eundem usum.

Araneus. CAP. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lac

C A P. L V I.

L Acerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixa extrahit: varicosos, fornicantes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictus scorpione leuamentum præstat.

CAP. LVII.

SEps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocarunt, in vino pota morsus suos sanat.

C A P. L V I I I.

S Cincus aut Aegypti, aut India, aut rubri ma-
 ris alumnus, quamvis inueniatur in Lydia
 Aauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui
 generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt *ιδιογενής
 urnes, quæ renes amplectantur, id sibi virium ταριχεύο-
 endicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, vene μὴ θ' ἐμ
 em accendant. Verùm decocto lentis cum melle καρδάμων.
 ut semine lactucæ cum aqua poto, veneris cupi-
 itates inbibentur. Additur in antidota.

CAP. LIX.

Terreni vermes impositi, præcisos nervos
glutinant, tertianas discutiunt: decocti cum
insperino adipe, & infusi, affectis auribus meden-
tur: cum oleo autem decocti, si in contrariam au-
tem instillentur, dentium doloribus præstant au-
dium: triti in potu ex passo urinam ciunt.

CAP. LX.

M45

MVs araneus dissectus, & impositus, sub
morsus veneficia luit.

Mures.

CAP. LXI.

MVres, qui in domibus, oberrant, concisos
scorpionum plagis utilissimè imponi, in
confessio est: si inassatos infantes ederint, oris sa-
liuam exiccare promittunt.

Lac.

CAP. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus
lalat, aluū emollit, stomachū & intestina in-
flatione vexat: vernū tamen dilutius æstiuo habe-
tur, & è viridi pabulo aluū magis emollit. Proba-
tur autē candidū, æquali crassitudine, quod vngui
instillatū cogitur. Aluū minus tentat caprinum:
quoniā pecus hoc adstringentibus pabulis, robore,
lentisco, & oleaginis frōdibus, & terebintho ma-
gna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatis-
simum reddi solet. Ouellū autē dulce, crassum, &
præpingue, nō vsq; adeo vtile stomacho. Bubulum
tamen, asininū, & equinum, vētri magis idonea:
sed ipsum turbāt. Quibus in locis pecora, scammo-
niam, veratrū, clematidē, aut mercuriale pas-
cuntur, lac omne ventrē & stomachū subuertit. qua-
le in Iustinis mōtibus esse, à nobis proditū est. Si-
quidem capræ, quibus candidū veratrum pabulo
fuerit, primo foliorū partu euomūt: & eorum lac
hausrū nauseā creat, & stomachū in vomitiones
effundit. Vētrē adstringit lac omne decoctū, præ-

cip

Ipueq; cādentibus calculis marinis exustū. & in
 summa, omnibus auxiliatur internis exulceratio
 nibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum,
 vesicæ, & renū: foris verò cōtra pruritū cutis, eru
 tiōes papularū, & vitiatos corporis succos, recēs
 ū melle crudo, addito sale, datur exigua aqua di
 utū. Minus inflat quodcūq; semel feruefactū. De
 octū cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas
 ventris fluxiones adiuuat. Lac quodcūq; s. rum
 cōtinet implicitū, quod vbi discessit, à lacte, multò
 potētissimū ad purgatiōes redditur. Datur quibus
 ine acrimonia volumus deiectionē moliri, vt me
 lancholicis, comitialibus, lepris, elephātis, et erūpen
 tibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod
 chistū, id est scissile, appellāt. Lac aut scissile nouo
 feruet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis,
 postquā bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsis
 cyathis, quot sunt hemina lactis: ita enim serefcēs
 liquidū ab eo diuidit, quod in caseū concreuit. Sed
 ū feruet, ne superfundatur, cōueniet spōgia ex fri
 da cōtinuò scissilis labrū detergere, sextariūq; ar
 genteū frigida aqua plenū demittere. Bibitur he
 minis per internalla singulis, vsq; ad quinas, ita
 vt intercedētibus statū, potātes ambulet. Lac au
 tem recens efficax est cōtra rosiones vstionesq; ab
 exitiis medicamentis factas: vt à cātharidi
 bus, aut salamandra, bupreste, aut pinorū eruca,
 ryoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: p̄ser
 tim

tim bubulū ad id eximiē confert GargariZatur
autem exulceratis faucibus, tonsillisq; Asininis pe-
culiariter collutos dentes gingiuasq; stabilit. Flu-
xiones alui, si vlcera sentiantur, tenesmosq; ouil-
lum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis
decoctū, sistit: per se autem & cum hordeacea pti-
sana aut halicaceo cremore infusum magnopere
intestinorū rosiones mitigat: exulceratæ vuluæ im-
mittitur. Humanū lac dulcissimū est, & maximē
alit: mānis autē exuctū, prodest tabi, & stomachi
rosionibus: contra haustum leporem marinū præ-
sidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cū thuris pol-
line instillatur: podagricis vtile est, cum meconio,
& cerato illitū. Lac omne respuendum splenicis,
hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum
vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus,
nisi si quis interdum purgationis gratia, vt osten-
dimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte
perunctos narrāt glabrescere: potū contra venena
anti doli vicem obtinet, abortus mortuos expellit.

Caseus.

CAP. LXIII.

Caseus recens sine sale sumptus alit, stoma-
cho vtilis est, & facile in membra delega-
tur: corpus auget, aluum modicē emollit: alius ta-
men alio præstantior, pro natura lactis à quo con-
ficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde in-
assatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflamma-
tionibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens
salit

salitus est, minus alimēti præbet: corpus aptè mi-
nuit, stomacho aduersatur, negotiū ventri inter-
aneisq; exhibet: vetustiore sistitur aluus. Sero
quod à caseo manauit, quamoptimè canes alun-
tur. Quod hippacem vocant, caseus est equinus:
ea virus redolet, magnopere alit, bubuloq; propor-
tione respondet. Nec desunt, qui hippacem, equinū
coagulum appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXIIII.

ELacte pinguisimo probatū sit butyrū, quale
ouillū est: sit & ex caprimo, agitato in vasis
lacte, donec pingue separet. Butyrū natura oleo-
sum est & emolliens: vnde largius epotiū, ventrē
resoluit: prodest, vbi oleū non adfuerit, cōtra vene-
na. Cū melle si infricetur, dentitiones adiuuat: gin-
giuarū pruritus, & oris vlcera infantibus emen-
dat. Illitū foris capaciora alimentorū facit corpo-
ra, & ab albidis pustulis per summa scatētibus
asserit. Cōtra inflāmationes & duritias vuluæ,
quod nec virus resipit, nec vetustatē sentit, butyrū
efficax est: dysentericis, & colli exulcerationibus
infundit: in medicamenta addi solet, quæ pus mo-
uēt: vtile præsertim cū nerui, aut cerebri membra-
næ, vesicæ ceruix, vulnera acceperit. Id autē pur-
gat, replet, carnē creat, ab aspidē percussis vtilissi-
mè imponit. Recens olsonijs additū olei vicē pen-
sat, et adipis vice fungit in bellarijs. Colligēdæ ex
eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernā no-

uam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare et adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celcriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

Succidæ lanæ molles, è collo feminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidè facile succos cohibunt quibus immerguntur, & ob pecudum sordè (sic enim æsypum vocat) emolliunt: capitis, stomachi, aliarumq; partiū doloribus, cū aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarū lanarū cinis crustas obducit, excrescētiās in carne cohibet, & ulcera ad cicatricē perducit. Mundæ autem et carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus sim. briati marinarum purpurarū flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & concerptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim

Et interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt: quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta recoditur. Lauat ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur: idque sepius, mutant aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum.

CAP. LXVI.

Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudine. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, vti respumet, agitur, aut linea rude validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: confidente pingui quod supernatabat, collectoque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum oesypum manibus emollitur, & si qua incedit spurcitia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recenti que affusa, manibus misceatur, donec ad motum lingue oesypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumque spectetur: tum in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi-

da aqua eluunt, & manibus, nō secus atq; ceratū mulieres, confricāt: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscunq; exēptis, ac lento igni in aëneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectū, aqua, vt diximus, lauant: colatumq; in fictilē patellam, quæ calidam aquam cōtineat, linteo operiūt, atq; soli mandāt, donec candulū fiat, et satis crassum. Alij biduū spatio aquam effundunt, nouamq; adiūciunt. Melius est leue, radícula non curatū, quod succidariū virus oleat, & si manu in concha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ, cū meliloto & butyro: in vellere appositū, menses & partus euocat, vlcera non aurū modo sanat, sed et genitaliū cū anserino adipe: cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorū defluuia, efficax est. In testā noua torretur, donec redactū in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, vti demonstrauimus: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

Coangulum. CAP. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morsibus, exliacis, dysentericis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reientenibus à pectore, auxiliatur. Sanguinē in grumos

mos concretū discutit. Post menstruas purgationes appositū vuluæ cum butyro, præstat mulieribus vt concipiāt: potius verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū, quam hippacen aliqui vocant, priuatim cæliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubaliq; coagula similes naturas sortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretū lac in aceto, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotū, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires representat: comitialibus, stragulatis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimētum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquecit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. CAP. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligen-

ter vase, flagrantissimo soli exponitur: eliquescent
 inde humor in fictile alterū excolat, donec adeps
 omnis absumat, mox loco vellemeter frigido re-
 conditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciunt
 super aquā calidam, aut tenuē & elanguidā pru-
 nam, quæ solis vicē penset. Est & alia curandi ra-
 tio. Exemptis mēbranis teritur, coniectusq; in ollā
 eliquatur, adiecto minuti salis momēto: mox lineo
 colo transfusus reponitur. Utiliter in medicamen-
 ta additur, quæ lassitudines & fatigationes le-
 uant. Suillus adeps & vrsinus hoc curantur mo-
 do. Recens, præpinguis, renibus potissimū detra-
 ctus, in largiore aqua cælesti & quā frigidissi-
 ma, exēptis tunicis, diligentissimē manibus cōfrica-
 tur, & exprimēdo fermē siccatur, subindeq; noua
 aqua abluatur: ceterum fictili capacitatis duplæ
 inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-
 bus prunis spatha mouetur: eliquatusque, colo
 trāsfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & gut-
 tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
 le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
 bet, & manu deprimi, quo facilius faculentū vi-
 rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-
 ctam transfunditur. Vbi coire cepit, residens in
 imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliqua-
 tur, repurgatusq; fictili bene operculato, perquā
 frigidis locis reponitur. Hircinum seuū, ouillum,
 ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunq;

zum

tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pila emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū virus excernat, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectet. Deinde in ollā fictilē cōiungito, & adiecta aqua vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquā colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili cliquato, & quæ antè diximus facito. Tertio sine aqua liquefactū, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratūq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuū, renibus maximè detractū, exemptis mēbranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendū diligenter, affusa maris aqua. Cum verò dissolutū fuerit, in fictilem ollam coniiciendū, & marina aqua, quæ non minus dolante superemineat, proluendū, decoquendū donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: operatumq; soli interdū credendum, vt ad candorē, reducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum sale msperseris, liquefacito: dein in nitentiē aquam excolato, & ubi concrefcere cœpit, manibus ite-

rum confricando vehementer lauato, aqua sæpius
infusa refusaq; donec quãoptimè elotū videatur:
rursus in olla cū pari modo vini odorati decoqui-
to, & cū iterū efferbuerit, deſto ab igni vaſe, ibulē
ſinito pnoctare: poſtridie ſi grauiter adhuc oleat,
nova olla repetitū, vincto odorato perfundat: eadē
quæ prius ſiant, dū omne virus euaneſcat. Colli-
quatur & ſine ſale, præſertim affectionū earum
cauſa, quibus ſal aduerſari ſolet, ſed ita paratū nō
magnopere albeſcit. Eodem modo pardorū ac leo-
num pingua curari oportet. Taurinū autem &
vitulinū pingue, necnō ceruinū, atq; etiam huius
animalis medulla, odoramētis imbuitur, hac ra-
tione. Pingue quod odoratū reddi debet, demptis,
quæ diximus modo, membranis, elotum & vino
quãmodoratiſſimo, nulla maris aqua diluto, fer-
uefactū, pernoctare ſinitur: alterū id genus vinū
eadē menſura infunditur, colliquat, & exquiſitè
colatur: nouemq; eius heminis, iunci Arabici ſe-
ptem drachmæ adijciuntur. Quòd ſi ipſum odoris
fragrantioris fieri voles, quadraginta ſloris eiuf-
dem drachmæ, cū paribus palmæ, calami, & ca-
ſiæ modis adduntur: et xylobalſami, aſpalathi ſin-
gulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, et nar-
di, ſingulæ vnciæ: omnia exactius tunduntur, &
aſſuſo vino odorato, in vaſe operto, quod ſupra car-
bones firmiter collocatū ſit ter efferveſcūt, & ſe-
moto ab igni vaſe inibi pernoctant: poſtridie vi-
num

um effunditur, aliudq; generis eiusdē adijcitur.
 et simili modo benè conferuescat. Deinde matu-
 nis exempto adipe vinū effundatur: & abluto
 ase, si quid imo subsidens hasit, detergatur. Po-
 remò eliquatum pingue & excolatū, ad vsus re-
 mnditur. Hoc autē modo odoramentis imbuitur,
 uod antea curatū est. Verū antè dicta prius in-
 bisari solent, quò facilius sibi odoramentorū vi-
 es adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horū vo-
 is, cum vino feruesfacito, impositis vnà myrti ra-
 nulis, serpillio, cypero, item aspalatho plenius tu-
 o. Aliqui tamē ad hūc vsum, vno duntaxat horū
 ontenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptū
 eniter, & lintheo colatū, aromatis, vti expositū
 st, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quē-
 unq; acceperis, oportet vt recens tundatur) Synce-
 rus & sanguinis expers adeps, reliquas habens
 iotas quas saepe retulimus, in ollam nouam de-
 mittitur, infuso vino albo, vetere, odorato, quod se-
 nipedis altitudinem superet: lento igni feruescat,
 lum vernaculus odor aboleatur, planeq; vinum
 edoleat. At vbi deposito vase refrixit, duæ adi-
 is minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiusdē
 sextarij, & seminis loti, eius inquā cuius è ligno
 udicræ ibiæ facitiant, tusi minæ quatuor adij-
 iuntur: lento igni subinde miscendo decoquuntur:
 ūq; odoris virus euanuerit, excolatusq; adeps re-
 fixerit, vna contusi aspalathi mina, cū amaraci-

ni floris minis quatuor, et vetere vino subigitur. Nocte vna hac odorē rapiunt, cōbibūntve. Post tridie in fictilē ollam tricongialē ea omnia cū adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, vnā feruescūt, quousq; & vim & odorē spissamentorū adeps ipse contraxerit: qui eliquesceus colatur, et reponitur. Quòd si maiore odoris fragrantia efflagites, drachmas octo quā pinguisima myrrhæ rino macerata, qđ multos in annos asseruatū est, misceito. Gallinaceus anserinus sic odoribusq; imbuti solēt: Cuiusvis eorū percurati sextarij duo fictili olla excipiūt: erysiseptri, xylobalsami, palmæ elatæ, et calami planē cōtusi, singulorū sescuncia admiscet: vini Lesbij veteris ciathus vnus adijcitur: ea ter effervescent prunis, mox vase sublato ab igne, die noctuq; refrigeratur: post tridie liquata per linteū crassum, mundū in vas excolatur. Vbi verò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto per frigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & vrsinus ceteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorē adeps ipse representabit hoc modo: Curati quā optime adipis, præsertim taurini, mina vna, tēpestiuiq; sampsuchi exquisitè cōfracti sescuimina misceito

secia

utur, & insperso largiore vino digeruntur in of-
 fassa, quæ in vase cooperto nocte quiescunt: matuti-
 in fictili olla leuisculo igni, affusa aqua, leui-
 coquunt: dumq; suum adeps odorem exuerit, defae-
 ctus ac bene opertus, nocte tota permanet: poste-
 die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi,
 dictum est, cotusi iterum sesquimina priori pastillo
 iungitur: eodemq; modo in offas cogit: alijs quæ
 prius peractis, decoquitur et colatur: & si qua
 quando hæsit spurcicia, deraditur, et frigido loco re-
 latur. Siquis tamem incuratum adipem anserinum, gal-
 laceum, aut vitulinum, à putredine tueri velit, ita fa-
 ciendum est: Quemuis adipem diligenter elotum & sicca-
 tum in umbra super cribrum, per lintea munda ma-
 nibus vehementer exprimatur, linoq; consutum umbro
 in loco suspendatur, & post multos dies noua
 carta inuolutum, frigido loco recodatur. Pinguia au-
 tem indito melle vindicantur à putredinis vitio.
 Omnis est exalfacere, mollire, rarefacere. Tan-
 tius adeps, bululus, & vitulinus aliquantum ad-
 iungunt: earundem virium copiosus leoninus: nam resi-
 re eum aiunt ijs qui insidias moliuntur. Cernuo,
 phantinoq; perunclos, serpentes sugiunt. Ad-
 ingentior est caprinus: qua ex causa decoctus
 in polenta, rhoë, & caseo, dysentericis datur, &
 in ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthi-
 sis in sorbitionibus prodest. Datur quoque utili-
 ter ijs qui catharidum venena hauserunt hircinus, ut
 qui

qui validissimè discutiat: podagricis auxiliatur
 cū sino capræ & croco impositus: huic proporti-
 ne respondet ouillus. Suillus verò cōtra vuluæ et se-
 dis vitia idoneus est: ambustis igni medetur. E su-
 vetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, &
 emollit: clotus vino pleuriticis prodest. Cinere au-
 calce exceptus, inflātionibus, fistulis, ac tumo-
 ribus succurrit. Asiniū tradunt cicatrices corpori
 cōcolores reddere. Anserinus gallinaceusq; cōue-
 niunt mulieribus malis, & ad labiorū rimas, an-
 manganizandī faciē, et contra auriū dolores. Vr-
 siniū constat raptos vitio alopecie capillos resti-
 tuere, perniōibus subuenire. Vulpinus medetur au-
 rium doloribus. Fluviatiliū piscium pingua per-
 unctis oculis claritatē afferunt, si in sole liqueścāt,
 & melli admisceantur. Vipera adeps contra ocu-
 lorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita
 cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis
 euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus
 obliterat, atq; renasci non patitur.

Medulla.

CAP. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox vitulina, post
 hanc taurina, dein caprina, & ouilla Colli-
 giuntur æstatis exitu, cūm appetit autumnus: quip-
 pe cūm alijs annī temporibus concrementum san-
 guinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inuenia-
 tur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus
 extrahat & recondat. Omnes medullæ molliūt,
 calfa

refaciunt, rarefaciunt: vlcera explent, ceruina
 truncos venenata fugiunt. Curantur recentes,
 dipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossi-
 bus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, do-
 ce aqua sincera emanet: & deterfa sorde pēna,
 qua innatet, liquatæ in duplicato vase in pilam
 exprimuntur: & ubi coire, omni face, quæ ad ima
 idit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet
 curatas reponere, facito omnia quæ de anserum
 & gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel. CAP. LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens praliga-
 to ore folliculi lino tādū demissum in feruē-
 tem aquā, dum quis spatiū trium stadiorū percur-
 ret, mox exemptū siccatur vmbroso loco, aspergi-
 rem nō redolēte. Sed quod ad oculorū medicamen-
 ta adijci solet, ligatū lino in vitreū vas, quod mel
 habeat, immittitur: circumuoluto ad os vasis lini
 principio, et operto vase reconditur. Est enim vis
 omniū acris & excalfaciens: intensus tamē & re-
 missis viribus differūt: siquidē pręstātius in effe-
 ctu esse videt fel marini scorpionis, et piscis qui cal-
 lionymus appellat, marinæ testudinis, hienæq;
 item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & sylue-
 stris capræ: quod priuatim prodest contra suffu-
 siones incipientes, & oculorū caligines, argemas,
 & genarū scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque
 ursino, taurinū multò efficacius. Felle onni perfa-
 cil

cilem, praesertim infantibus, deiectione quis metur, si intinctum eo tomentum aut simbriam sedi succiat. Priuatim taurino anginae cum melle perungitur: sedis ulcera sanat, et ad cicatricem usque peruenit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliere lacte aut caprino instillatum, medet: & sibilo eodem ex porri succo. Admisceri inuenit vulnera emplastris & circumlitionibus, quae contra venata parantur. Phagedenicis ulceribus, & colicis scroti doloribus, ex melle prodest: leprosis, furfuribus cum nitro et terra cimolia quam optime purgat. Oculum & versum contra eadem pollent, verum inefficacius haec praestant. Versum eclegmate comitiales adiuvat. Fel testudinis anginis, & in ore infantium nominis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Suestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberantiae illitu reprimunt. Suillum autem contra auri ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

CAP. LXX

Sanguis anseris, anatis & hœdi, utilissime: antidota miscentur. Palumbi autem, turtur & columbae, necnon perdices, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosis, illinuntur. Peculiariter columbae sanguis, cruo membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, caprae, cervi & leporis sanguis inassatus sartagi-

ne

e, dysenterias & coeliacorum profluvia sistit: in
 mo potius cōtra toxica efficax est. Leporinus san-
 guis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentigi-
 esq; emaculat. Caninus cōmodē ab his bibitur
 quos efferata in rabie bestia momorderit: contra
 notum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris
 unguinem epotum tradunt prodesse comitialibus.
 Larina autem testudinis cū vino & leporis co-
 gulo cuminoq; contra serpentium morsus, &
 austa rubeta venena, cōuenienter bibitur. Tauri
 us cum polēta illitus, duritias discutit, emollitq;
 anguis equarum quæ admissuræ expertæ sunt,
 & medicamenta additur quæ erodunt, septica vo-
 unt. Sanguine chameleonis genarū palpebras e-
 lli creditum est. Hoc enim viridium ranarum
 unguine præstatur. Menstruus sanguis fœmina-
 um, circūlitu conceptū inhibere existimatur, aut
 omninō mulier mēstrua superegreddatur, leuat
 odagra dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum.

CAP. LXXII.

ARmentaria bonis fimum si recens admo-
 ueatur, vulnerum inflāmationes mitigat:
 alijs autem inuoluitur, & calfactum cinere fer-
 entī superponitur. Coxendicis cruciatus fotu
 ompescit: illitum ex aceto duritias, panos, &
 brumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod ā
 nasculo bouæ redditum est, procidentes vuluæ
 eprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

Fim

Fimum caprarum, præsertim in montibus
gentium potum in vino, regium morbum emendat:
ses cit cum odoramentis haustum, & partus e-
cat: tritum in farinam, & impositum lanis cum t-
re, feminarii profluvia sistit, ceterosq; sangu-
impetus ex aceto cohibet: modetur alopecij e-
stum, & cum aceto aut oxymelite illitum: cum ax-
gia verò impositum, his qui podagra tentantur,
xilio est. Caprillum in aceto decoctum imponi
serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni
cro, & parotidibus. Utilem ischiadici vñtionem
hunc in modum accipiunt: In eo interstitio
pollex brachiali committitur, cava veluti lacus
subsidet, in qua lana oleo imbuta subternitur,
inde sigillatim feruentes stercoris caprini pilæ
imponuntur, dum vapor per brachium ad coxam
sentiat peruenire, & coxendicis dolorem mi-
gare: adustio id genus Arabica appellatur. Oli-
um ex aceto illitum sanat epiphyctidas, clau-
pensiles verrucas, thymos, & ambusta igni, ro-
ceo cerato exceptum. Fimum suis sylvestris ari-
in aqua aut vino potum, reiectiones sanguinis
stet: vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta
conuulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato ro-
ceo medetur. Tam asinorum quam equorum
mum siue crudum siue crematum, addito aceto, sa-
guinis eruptiones cohibet. Armentarii, qui her-
pascitur, siccum fimum liquatum in vino, m-

petu

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinū vehemētius & excalfacit, &urit, cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit: carbūculos emarginat, tritum cum melle, lini semine et oleo: ambustis igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen cōtra venena fungorū, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ fimū, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subdita infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cū vino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflāmatione vindicat, & obiter intumescere nō patitur: sed ea statim glutinat. Siccō ex melle anginae perungi commodissimè traduntur. Terrestris crocodili fimū, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est cādidissima & friabilis, amyli modo, minimè pōderosa, in humore statim eliquescent: quæ cū teritur, fermenti acorem quadāntenus refert. Adulterant eam sturnorū fimo quos captos oryza pascūt, ipsumq; nō dissimile vendūt. Alij amyllum aut cimoliam miscēt, & adscito anchusæ colore per rarum cribrū paula-

K

tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea veniunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina.

CAP. LXXIII.

Humanam urinam suam cuiq; bibere, cōtra viperæ morsus, ac venena, incipientemq; aquam inter cutē proderit: scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundēdos canis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manātia, furfures, pforas, & feruidas eruptiōes, multò magis abstergit: nomas, & præcipuè genitaliū, cohibet: auribus infusa manūs pus supprimit: decocta q; in calyce mali punici, earū vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cū melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen cōficiunt. Quod in vrina subsidit, illitu ignē sacrū mitigat: serues factum cū cyprino, inditumq; vuluæ dolores mulcet: strangulatus lenat, genas detegit, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cū myrrha insilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subijt, cum nardi spica quotidie binis cyathi cū aqua bibitur, urināq; per aluum extrahit.

extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina trahitur renū vitij mederi. Lynceis vrinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coiréve in calculi duritiam, vulgo creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quòd pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininae vrinæ potu renum vitia sanari traduntur.

Mel. CAP. LXXIIII.

PRincipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetio, mox Cycladibus insulis, & à Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratus, sub-Mellis pro-
flauum, nec humectum, graue, & minimè fluxū, batio qua-
quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpi-
tur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendū
vim habet: ora venarum aperit, humores euocat,
qua ratione in sordida vlcera sinusq; commodissi-
mè infunditur. Decoctum atq; impositum, absce-
dentem cariem glutinat, medetur impetigini coctū
cum liquido alumine & illitū, item aurium soni-
tui & dolori, cū fossili sale trito, tepidum instilla-
tur: lendes & fœda capitis animalia illitū necat,
nuda glandem recutitis operit, præsertim quæ cir-
cuncisione aperta non est, si melle præputium à ba-
lineo triginta diebus emolliatur: oculorum cali-

K 2

ginem discutit, faucibus, tonsillis, anginae col-
 lutum gargari. Atumve medetur: urinā ciet, au-
 xiliatur tussi, & à serpente percussis: contra ha-
 stum meconium, cum rosaceo calidum assumitur
 aduersus venena fungorū, & rabiosi canis mor-
 sus linctum aut potum proficit: crudum tamen a-
 uum inflat, tussim laceffit, & ea de re despuma-
 ti vsus aptior est. Primatum tenet in mellis gene-
 re vernum, deinde aestiuum: hybernum verò, vt-
 pote quod crassius constet, deterrimū reputatur.

Mel Sar- ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gi-
 doum ama gnitur mel, amarū est: quoniam apes inibi absin-
 rum. thio vescatur: quo vitia cutis in facie & maculae

aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto qui-
 busdam anni tēporibus, propria quorundam flo-
 rum dote, mel conflatur: quod qui edēre, mēte ab-
 alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt, esi-
 tata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsum,
 resumpta, quoties vomitione reijciuntur. acre au-
 tem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod
 cum costo illitum, feminarū cutem emendat, &
 cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concre-

Saccharū. ti mellis genus, quod saccharō nominatur. In In-
 dia verò, & felici Arabia in arundinibus inueni-
 tur: salis modo coactum est, detibus, vt sal, fragile,
 aluo idoneū, & stomacho utile, si aqua dilutū bi-
 batur: vexata vesicae renibusq; auxiliatur, illitū
 ea discutit, quae tenebras oculorū pupillis offendūt.

Cer

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadamtenus mellei referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album synce rumq; atq; transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, inspersoq; nitri momento, decoquunt: cumq; iterum tertiove inferbuit, separatim vas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua fortè adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum ollulae nouæ aqua frigida madefictum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quo celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino consuti, interuacante spatio, suspenduntur, & interdum, continuo sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfecte albescant. Verum si eximus ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ pretium est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum decoquant: dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt: postea orbiculos, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

cum sol remissa vehementia humorem pariat, & nō facile liquetur cera omnis mollit, calfacit, mo dicē explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutribus non patiuntur coagulari.

Propolis.

CAP. LXXVI.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracē referēs, in vehemēti ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat aculeos, et omnia infixa corpori extrahit, in vetere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit: ea in alueariorū foribus, cerosæ naturæ inueniūt.

Triticum.

CAP. LXXVII.

Optima ē tritici generibus ad secundæ valetudinis vsus habentur, quæ recētia, & iā perfectē adulta, colorē luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nōnullis sitania nominantur. Itaq; cruda in cibis teretes tineas gignūt, canum morsibus prosunt, māsā & imposita: cōfectus eorum similagine panis, plus alit, quàm cibarius: ē trimestriū farina panis leuiorē cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos vocāt. Item contra interaneorū inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedāt, viperarum iclibus auxiliantur, & torminosi prosunt. Farinacem
fer

fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedū, clauosq; extenuat, & cetera tubercula furunculosq; ex sale cōcoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino, cōmodissimè illinitur: eadē si decocta in glutini modū delingatur, cruētis excretionibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cū menta & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsā, aut hydrelæo decoquatur, omnē discutit inflammationē. Panis & crudus, & coctus cū aqua mulsā inflammationes omnes illitu mulcet: cū emolliat, et quadātenus refrigeret: sed herbis succisūe huic rei accommodatus admisceatur Vetus panis aridus, adiectus conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinū ex similagine, & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinē excreantibus prodest, si liquidus ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purumq;: id minus quā triticū alit. Ptisana tamen ob cremorem in decoctione redditū, plus alimentī prabet, quā polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atque gutturis scabritias, exulcerationesq; pollet: quibus etiam triticea ptisana praesidio est: sed plus alit, magisq; vrinam mouet. Lac abundē suppeditat, si cum faniculi semine deco-

Et sorbeatur. Hordeum absterget, urinā cit, inflammationē parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina ordeacea decoquit in mulsa aqua cū fico, vt inflammationes collectiōesq; discutiat: duritias cū resina, & fimo columbarū concoquit: cum meliloto autē, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciat: aduersus intestinorū inflammationes cū lini semine, fenograceo, & ruta, illini iuuat, strumas cū pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad concoctionē perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluuiā sistit: podagricis inflammationibus, cū cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farine ex aqua, atq; cum pice, & oleo decoctus, puri mouēdo est: cū aceto subactus itidē, & cū pice, cōtra articularū fluxiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum.

CAP. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & nervos tentat, membranis, præsertim cerebrum vēstientibus, officit: inflationem parit, vitiosum succum creat, elephātiāsin gignit: perfusum zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi.

CAP. LXXX.

FIt & ex hordeo potus, quē curmi nomināt, eoq;

eoq; sepe potu, pro vino vtūtur: verūm dolorē capitis mouet, malū succū gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zea, seu semen. CAP. LXXXI.

ZEa duorum generum est: vna simplex, al- Vulgò spel-
ta.
tera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit, ob id diococos appellatur. Plus quàm hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quàm triticum alens.

Craſsior fariua. CAP. LXXXII.

Crimmon, craſsior est ex Zea triticoq; farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, facile conficitur, aluum vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. CAP. LXXXIII.

EIdem generi siligo adscribitur, sed minus alio quanto nutrit: in panes, vt Zea, cogitur. Fit quoque è siligine craſsior farina, quam Græci crimmon vocitant.

Athera. CAP. LXXXIIII.

Athera ex Zea fit tenuissimè molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

Tragos. CAP. LXXXV.

TRagos quandam halicæ frugis figuram gerit: multò minus, quàm Zea nutrit, quòd multum aceris habeat: quare ægrius conficitur,

aluūq; magis emollit.

Auena.

CAP. LXXXVI.

AVena genicula quædam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeū. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza.

CAP. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum supprimit.

Halica.

CAP. LXXXVIII.

Halica fit ex Zea, quam dicoccon appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longè utilior. decocta in aceto illitaq; lepras tollit, vnguiū scabritias extricat, incipientibus ægilopys medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium.

CAP. LXXXIX.

Milium in panes coactū, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, urinam cit. Torretur milium, feruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur, auxilio sit.

Panicum.

CAP. XC.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemq; modo in panes.

sub

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama.

CAP. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus graui statem facit, quoties inter mandendum cōmissuris dentium inhæsit: neruorum crassitiem illitis discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosacea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, præsertim inflammationibus oculorū doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

CAP. XCII.

Lolium quod inter segetes nascitur, mollitū, illi tu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasq; emarginat: sanat cū raphanis, sale et aceto feros lichenas: & ex aceto, & sulphure vino, lepras: strumas quoq; discutit, cū fimo columbino, & lini semine decoctū in vino: rumpit, quæ agrius ad coctionē perducuntur. Decoctū ex aqua mulsa, vtilissimè ischiadicis illinitur: si cū polēta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

Amylum.

CAP. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod sine amola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum
emol

emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimū esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teritur: tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquūq; quallo sportisq; siccātū tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole: nāque si paulisper vltum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; vlcerā efficacē est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atq; obsorīs admiscetur. Fit etiam amyllum ex Zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIII.

FOenigræci farina vim habet emolliēdi discutiēdiq;: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflāmationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminariū malis subuenit: et siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouētur, & insidēt. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manātia capitis vlcerā purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcerā sen-

lien

mentibus. Decoctum eius prodest aduersus tenes-
mos, fetidamq; dysentericorum proluuiem. Oleū
quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & ge-
nitalium cicatrices absterget.

Linum. CAP. XCV.

Linū vulgò notū est, cuius semen easdem quas
farumgraciū vires habet. Discutit, & emol-
lit omnē intus forisq; inflammationē, cum melle,
oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto ex-
ceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum tollit,
illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas du-
ritiasq; discutit: vlcera quæ serpunt, fauosq; cum
vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit,
cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pecto-
ris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem sub-
stituatur: tuſsim lenit, venerem stimulat: si farina
biperis, & melle exceptū, pro placēta largius ad-
sumatur. Huius decoctū inter ancorū vuluæ erosio-
nibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vul-
uæ inflāmationes in defecationibus perquā vtile.

Cicer. CAP. XCVI.

Cicer sativum alio idoneū est, urinā ciet, in-
flationē parit, colorē commendat, menses ac
partus expellit, lac auget, cū ervo decoctū illini-
tur ad inflāmationes testiu, verrucosas informica-
tiones, ad scabiē, vlcera capitis manātia, impetigi-
nesq;: cōtra carcinomata, & vlcera, quæ cacoëthe Cicer arie-
vocatur, cū melle & hordeo prodest. Alterū genus tinum.

ariet

arietinu nominatur: vtrūq; cit vrinas, dato, cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorū decocto. Lædūt ea exulceratā vesicam, & renes. In verrucarū formicantiū pensiliūq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Syluester: cicer, folijs satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satium præstat.

Faba.

CAP. XCVII.

Cyanus.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnē gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & cœliacoriū profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior cōtrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cū polenta illitum, inflāmationes quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, turgētes grumoso lacte mammas, etiā si inflammatione tentētur, adiuvat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum fœnigraci farina & melle discutit: cū rosa autem, ihure & oui candido, procidētes oculos, tumores, vuasq;, reprimat: subactū vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur:

ur: decocta in vino testiu collectiones sanat: quò-
ardius pubes erumpat, pueris imo ventri illini-
ur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti ca-
illi, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt,
& minus alimenti capeffunt: cum polepta, scisso
lumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas
discutiunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba
delecto cortice in illas partes diuisa, in quas sua
te natura scinditur, imponi solet sanguinis de-
fluxionibus ab hirundine concitatis: namque eas
supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Pōticā vocāt,
in Aegypto & plerunq; prouenit: in Asia etiā * ωλᾱς Θ.
Ciliciāq; lacubus, inuenitur. Folia habet ampla id est, pluri-
& etiā si ad arborum frondes cōparentur, caulem ma.
cubitalē, digiti crassitudine: florem roseum, dupla * Sic Plin.
papaueris amplitudine: & ubi flore exuitur, fert lib 21. c. 15.
folliculos vesparū fauis similes, in quibus faba su Græcus ha-
pra operculū, bullantis ampullæ modo, prominet. bet,
Ciborion, aut Cibotion idē nomināt, id est arcu- ὡς πῆτα
lā, quoniā feratur ipsa, humēti glebæ mādāta, et σορ, id est,
ita in aquā demissa. Radice firmatur harundine instar gale-
crassiore, q̄ cruda coctāve estur: ei colocasiæ nomē ri.
est. Faba virens mādatur, & exiccata nigrescit,
vulgare magnitudine superat. Adstringēdi facul-
tatē obtinet, & stomacho vtilē: dysentericis, cœlia-
cisq; proudest, insparso, polēta vice, lomento: datur
quoq;

quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti si terni inde cyathi bibantur, magis proficiet. Facit ad aurium dolorem, quod in eorum medio ride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

CAP. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, agre coquitur, stomachum male habet, eumque & intestina inflat: sed alium cum cortice cocta sistit. Praestat in cibo, quae facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi, quae ex causa aluum cohibet, si detracto ante cortice discoquatur accurate, primaque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somma tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmone inutilis: melius succum fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quae post decoctionem abijciuntur, vel uuarum rhois quae obsoniis insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias alium conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in
acet

aceto durities et strumas discutit, cū cotoneo aut meliloto medet inflammationibus oculorū, sedisq; edito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remediū exigūt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenā euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpūt, igni sacro, perunonibusq; ut antea dictū est: cōtra mammæ in quibus lac in grumos coit, et præ nimia sui copia pfundit, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur. Phasioli. CAP. C.

Phasioli inflant, spiritus cient, agrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum.

CAP. CI.

ERuum paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valuulis habet, Officinis è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi orobus, græ vsus conueniens. Eruū capiti onerosum est, aluum ca appella esu turbat, sanguinem per vrinam extrahit, elixio tione voca boues saginantur. Paranda farine ratio hæc est: tur.
Vberiora grana candida q; deliguntur, permiscendoq; aqua respergunt, donec sufficienter combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur: molitaq; farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Hæc alio utilis est. vrinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-

L.

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera
cū melle purgat, lentigines, & vitia cutis in fa-
cie, & maculas totūq; corpus emēdat: nomas, gā-
granas, duritiasq; serpere nō patitur: māmārum
duritias emollit, atra vlcera quæ theriomata vo-
cant, fauosq; emarginat, carbūculos rūpit: cū vi-
no subacta illitu morsibus viperarū, canū, homi-
numq; medetur, vrinae difficultates tenesmosq;
ex aceto mitigat. Erui tabidis, qui alimentū non
senciunt, tostū, & ad nucis magnitudinem melle
exceptū, sumptumq;, conuenit. Eius cremor per-
niones, & pruritus in toto corpore, sanat fouēdo

Lupini.

CAP. CII.

signos.

Satius lupinus notus est: cuius farina cum
melle delinctu, aut potu, ventris animalia ex-
pellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amari-
tudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorū idē
munus praestat, cum ruta & pipere potum: quan-
tū lienosis prodest. Eodem vlcera tetra, quæ therio-
mata vocant, gangranas, incipientem scabiem,
eruptiones pustularum, vlcera in capite manan-
tia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimum. Mi-
ses & partus extrahit, cū myrrha & melle sub-
ditum in vellere. Eorum farina cutem liouesq;
corrigit, inflammationes cum polenta & aqua
mitigat, tubercula & coxendi cum cruciatu ex
aceto lenit, strumas in aceto cocta illitaq; dissi-
pat, carbunculos rumpit. Decocti celesti aqua
do

donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt:
medetur pecorum scabiei, cum radice nigri cha-
meleontis, ita ut tepente decocto abluantur. Cit
urinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi
maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti, fa-
studium detrahunt, & cibi aviditatem faciunt,
Cognuntur & sylvestres lupini, sativi similes, sed
omnino minores, qui eadem quæ sativi possunt.

Rapum.

CAP. CIII.

DEcocta rapi radix alit, inflationem parit,
humentem ac fluxam carnem creat, venerem
stimulat: decocto podagra, perniolesq; foveantur,
contritoq; rapo atque imposito iuvantur: si exca-
vata radici rosaceum ceratum adigatur, & fer-
uenti cinere eliquescat, exulceratis pernioibus
proficiet. Cymæ eius decocta manduntur, & uri-
nam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præser-
tim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant,
idoneum est: potum contra venena salutare est,
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-
nus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam
recreat. Sylvestre rapum in arvis nascitur. *fru-
ticosum in cubiti altitudinem assurgens, ramosum,
laeve in cacumine folia fert lævia, digitali latitu-
dine, aut maiora: & fructum in siliquis calycula-
tis: cumq; eorum involucra aperiuntur, alia intus
siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem
præbet, in qua semina parvula concipiuntur, fo-

* Vox ex
Plinio ad-
iecta.

ris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergenda cutem in facie, totoq; corpore, utimur: praesertim quae ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus.

CAP. CIIII.

COeta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

CAP. CV.

Radix (qua Graecis rhapsanus dicitur) ex-
calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed sto-
macho aduersatur, ructus ciēt, urinā pellit, aluo
aptior. *sumpt.* summo tamē cibo jūmī debet, quō magis
eius distributionē adiuuet, quū aut praesumit, ci-
bum suspēdit: quare vomituris cōmodissimē dat
ante cibū. Sensuum aciē excitat: decocta cōtra ve-
terem tussim, & pituita crassitiē in pectore, effi-
cax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitio-
nes mouet: hydropicis cōmodissimē illinit, lienosis
utilis, sugillata cū melle rapit, et nomas amolit:
cōtra viperarū ictus auxiliatur, alopecias ad pilū
reducit, lentigines cū loliacea farina emendat, his
qui fungis strangulantur, tam cibo quā potu sa-
lutaris est. Semen vomitiones facit, urinam mo-
uet, mēses ciēt, lienem extenuat, cum aceto illitum
gangrenas validissimē emarginat: coctum cum
aceto mulso anguis perquā vtiliter gargariza-
tur, contra cerastis morsus, potum ex vino, auxi-

lio

ho est. Sylvestris raphani, quam Romani armo-
raciam vocant, folia satiuo similia. sed magis lam-
osanam imitantur: radix gracilis, & tenera sub- *μυλακή,
seru. Tam folium quàm radix in olera recipitur: id est, mol-
led hęc ex calsfacit, vrinam concitati: æstiuosa est. lis.

Sifer.

CAP. CVI.

Sifer vulgo cognitum, cuius radix decocta ori-
grata est, & stomacho utilis: vrinam ciet, &
appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant,
quod in acutum tendit, dura habes extrema, Officinis
in palustribus nascens. Alius est satius, illi disti- lapathum.
milis. Tertium genus sylvestre, paruum, plantagini
proximum, humile et molle. Quartum est quod alij *Acetosa.
oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon vocant. Fo-
lia eius sylvestri ac exiguo rumici similia, caule
non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caude
& agnatis appendicibus, emicante. Omnium deco-
cto olere aliis: emollit. Crudi illitu, melicerides,
rosaceo aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris
& oxylapathi, & eius quæ oxalida nominant, se-
mẽ ex aqua aut vino vtiliter bibitur, contra dysen-
terias, & celiacorum affectus, stomachi fastidia,
scorpionum ictus. Quod si quis in potu presumat, ni-
hil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto co-
cta aut illite cruda, lepras, impetigines, & sca-
brofos vngues per sanat: sed antea locus aceto &

L 3

nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctū earū sedat, si foveatur, aut in solis balneariū confricetur. Coctae in vino & instillatae, aurium dentiumq; dolorē mulcēt. Strumas parotidasq; discutiunt, lienē cū aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicū gestamine utuntur, eas collo appendentes. Trita & admotae feminarum profusua sistūt. cum vino autem potae regio morbo medentur, calculos vesicae comminuit, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Lampfana.

CAP. CVIII.

Lampfana sylvestre olus est: plus alit quam Rumex: & stomacho utilius. Cuius folia caulesq; coquuntur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

Blitum estur oleris modo, alio utile est, melius in medicina usus.

Malua.

CAP. CX.

malache,

Malua sativa esui longè aptior sylvestri: stomacho aduersatur, alium iuvat, sed multo magis caules: interaneis & vesicae utilis. Cruda folia cū salis exiguo māducata, agilopas ex melle sanāt: verū cū cicatricē trahere experint, ea demū citra salem utendū est. Contra aculeatos apium vespariumq; ictus, illita efficax est: eadē cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera manar-

lia in capite, fursuresq; cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq; vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in-
fessione mollit: prodest erosionibus vesicæ: & inte-
stinorum, vuluæ, sedisq; clystere infusum. Ius de-
coctæ cum radice sua, contra omnia venena auxi-
liatur, si continuò à bibentibus renomatur. Con-
tra phalangiorum morsus remedio est, lac euocat.
Semen in vino potum addito loti syluestris semi-
ne, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex. CAP. CXI.

Atriplicè aliqui chrysolacanon vocant, cogni-
tum olus est. Duo eius genera, syluestre &
satiuū. Coctū estur, vt olus. A luū mollit, panos di-
scutit, siue crudū siue coctum illinatur. Semen cum
aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Brassica. CAP. CXII.

Brassica satua alio est idonea, si modò leui-
ter feruefacta edatur (nam percocta aluum
sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixi-
uio coquitur) stomachum autè malè habet: acrior
est æstiuā. In Aegypto propter amaritudinem non
estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest:
summo cibo sumpta crapulā discutit, & vini no-
xam restinguit. Melior stomacho cyma, sed a-
crior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condi-
ta stomacho inimica est, aluum conturbat. Cru-
dus succus cum nitro & iri deuoratus aluū emol-

crambe

lit: cum vino quoq; epotus viperarū morsibus auxiliatur: cum fenigraci farina podagris & aricularū vitis illinitur: prodest et sordidis vlceribus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cū loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cū polenta irita, cōferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyclidas, ignem sacrum, leprasq; sanant: carbūculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus depascētia vlcera, gangranasq; valent: lienosisq; ex aceto cruda prosunt. Mansa, deuorato succo, recusam vocē instaurāt. Decoctum eius potu, alui & menses ciet. Flos post conceptionem in pessō subditus, partū abortu vitiat. Semen eius, praesertim quae in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota theriaca additur. faciei cutē lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica sylvestris. CAP. CXIII.

Sylvestris brassica, maritimis praeruptisq; locis, magna ex parte gignitur: sativae similis, sed candidior, hirsutiorq; amara. cuius cyma in luxuria cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutināt, & inflammationes tumoresq; discutunt.

ANNOTATIO.

Cōtendunt doctissimi quique eā esse
her

herbam, quam vulgò Soldanā aut Sol-
danellā vocitāt, quæ certè aristolochiā
rotundā, vt à Dioscoride hīc depingi-
tur brassica marina, foliis adamussim
repræsentat. Quòd aut̃ in descriptione
prælōga quoq; adñciat, niēdosum pla-
nè suspicamur, ac fortè pro μακρά, vt
Græci codices habēt, legendū μικρά, id
est, parua: quod & ipsum Soldanæ no-
stræ pulchrè respondet. Quomodo em̃
folia Brassicę marinę prælōga rectè di-
xeris, si aristolochiæ rotundæ foliis simi-
lia? quę cū ex ei⁹ descriptiōe, tū oculata
fide nō in lōgitudinē ptensa, sed circina-
tæ ferè esse rotūditatis, sepe cōperimus.
Suū tamen cuiq; in hac re esto iudiciū.

Brassica marina. CAP. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret,
quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, præ-
longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeūt,
singulari, vt hedera, pediculo albo succo prædita
est, sed paucò, salso gustu, et aliquantū amaro, pin-
gui concretu. Herba in totum stomacho inimica,
acri: vehementissimè aluina. iet, in cibo cocta. Co-
quitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta. CAP. CXV.

Beta duorum generum est: è quibus nigra co-
quitur cū lēticula, vt ventrē sistat: quod ma-

* Antiqui *gis radice eius præstat*. * Candida aluo *utilis*
 hoc genus *est*. Vtraque tamen propter nitrosum humcrem,
 betæ, ut au *quæ habet in se, noxij succi est*. Vnde succus earum,
 thor est *cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium*
 Theophras- *doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum,*
 tus, Sicu- *furfures lentesq; deterget, perimones fotu mitigat.*
 lum voca- *Crudis folijs vitiligines, nitro antea perfrictas: a-*
 runt quo- *lopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas:*
 rum exem- *atq; depascentia vlcera, illini prodest. Eruptioni-*
 plo extrita *bus papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medet.*
 vna tantum
 litera Sicla
 hodie dicunt,

Portulaca.

CAP. CXVI.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus,
 inflammationibus oculorum, cæterisq; cum po-
 lenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni,
 vesicæ doloribus, auxilio est: commanducata, den-
 tium stupores sedat: stomachi & intestinorum
 æstuationem, fluxionesq; mulcet: renes & vesicam
 adiuvat, etiam si erosionem sentiât: veneris impe-
 tus exoluit: succus epotus simili effectu prodest,
 in febribus valens. Contra teretes ventris tinea,
 cruentam excreationem, dysenteriam, hamor-
 rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax
 est. Item contra sepiæ morsus. Ocularibus medi-
 camentis utilissimè commiscetur, interaneis flu-
 xione laborantibus, atque vulnarum erosionibus,
 infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit,
 caput ex rosaceo & oleo fonetur: eruptiones pa-
 pularum in capite, cum vino emēdat: vulnibus

quæ

qua ad syderationem spectat ex polenta illimitur.

Asparagi. CAP. CXVII.

Corruda sine sylvestris asparagus vulgaris Officinis
est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti ven-
trem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum con-
tra urinam difficultatem, regium morbum, renum vitia,
& coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum vi-
no autem phalangiorum morsibus auxiliatur. Si de-
cocti succus super dente contineatur, eius dolori me-
detur. Semen potum ad eadem valet. Canes, ut aiunt,
si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam
nafei prodiderunt, arietis cornibus contusis, atque de-
fossis: quod, quantum equidem sentio, plane a veri-
tate abhorret. * Altilis autem asparagus multis ra-
mis fruticat, folijs feniculi, longis, numerosis: ra-
dice rotunda, gradali, spongiam habente. Huius te-
neri cauliculi triti in vino albo, renum dolores se-
dant. Assius autem coctus ve, urinam stillicidium,
difficultatemque, ac dysenterias, mitigat. Radix cum
vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Deco-
cta cum ficiis aut ciceribus sumpta, regium mor-
bum sanat: coxendicis cruciatus stranguriamque le-
uat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum,
conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Plantago. CAP. CXVIII.

Dvo plantaginis genera: minor folia habet
angustiora, minora, molliora, lauiora: &
tenuiora: cauliculo anguloso in terram inclinato:

fl.

* In graeco
codice haec
ad sylvestre
quoque as-
paragum refe-
runtur, nec
fit altilism
tio. Marcel-
lo autem vi-
dentur adul-
terina.

floribus pallidis: semine summis caulibus emicāte.

Altera maior, latior, virentiorq; latis cōstans fo-

* Oleris lijs, * oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudi-
nomine per nem petit, angulosus, subruber, à medio ad verticē
antonoma tenui semine circūdatus: radicibus nititur teneris,
siam Bras- hirsutis, cādidijs, digitū crassitudine aquantibus.
sicā intelli- Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis.
ge. Nec e- Multo vtilior magna est. Vim habet folia exicca
nim simpli toria, cōstringētē: quare omnibus malignis vlceri
citer ad bus, et fluxioni opportunis atq; eleph. itivis, sordi-
quælibet disq; illita prosunt. pfluua sanguinis, vlcera quæ
olera quo- serpūt, epinyctidas, carbūculos, nomasq; cohibent:
rum diuer- vetera vlcera & inæqualia cicatrice obducunt,
sa admodū facies, folia chironia sanāt, sinus cōglutināt: morsibus canis,
plantaginis ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidi-
referri pos- bus, strumis. egilopis, illita cū sale prosunt. Co-
sunt, ctum cū aceto et sale olus, dysentericis, cæliacisq;
sumptū subuenit. Datur et in locū heta cū lenticu-
la coctū. Et ad aquā inter cutē cui leucophlegma-
tie nomē est, datur & herba decocta post aridas
epulas, sic vt media antecedit comitialibus & su-
spiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta
subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut ce-
russa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest,
lippitudinibus & aurium doloribus idem succus
instillatur. Additur quoque in oculorum collyria.
Ginguis cruore suffusis, & sanguinis reiectioni-
bus, potu cōfert: clystere dysentericis infunditur,

otra tabe datur in potu, aduersus stragulationes
 ulue in vellere subicit, etia si vulua fluxione la-
 oret. Semē ex vino potū, alui fluxiones & san-
 guinis excreationes sistit. Decocta radix & man-
 lucatu, et colutiōe, dentiū dolores sedat: eadē cum
 olijs, vlceribus renū et vesicæ in passo dat. Ferunt
 reis radices cū tribus vini cyathis, & pari aquæ
 nodo, tertianis auxiliari: & quatuor quartanis.
 sunt qui radices gestamine, discutiēdis strumis vti-
 tur. Lauer seu Sium. CAP. CXIX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, Officinis
 folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, Berula.
 & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu, calculos rum-
 bunt, atque excernunt: vrinas cient, menses &
 partus extrahūt, dysentericis in cibo auxiliatur.
 De sio Cratenas tradit, herbam esse fruticis spe-
 cie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm
 menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium. CAP. CXX.

Sisymbrium (alijs serpillum syluestre vocant) Officinis
 in solo inculto nascitur, menthæ hortēsis simi- Balsamita.
 liudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis.
 Calfaciendi vini habet: contra stillicidia vrinæ,
 calculosq; semen ex vino bibitur: tormina &
 singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut
 temporibus illinuntur: item contra vesparum a- Vulgo na-
 pumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Alte- sturtiū a-
 rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, quaticum.
 alijs

alijs sion appellant. Ea herba riguis gaudet, et eisdem in locis, quibus sion, prouenit: quæ ideò nonnullis cardamina nominatur, quòd gustu cardamum, id est nasturtium, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta eruca modo finduntur. Id excafacit, urinas mouet, crudum estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus imposuim, matutinisq; detractum.

Crithmum.

CAP. CXXI.

CRithmum, seu potius, ut aliqui, crithamon, fruticosa & undique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, saiso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, et folia incocta vino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctumve in oleo, seruatur etiam in muria.

Fuchsis

Cornu cerui
vulgò dictum.* isopw
rop, id est,
strata.

Coronopus.

CAP. CXXII.

Coronopus oblonga herbula est, per terram * repens, fissis folijs: coquitur in oleo: radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coacta facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

Son

Sonchus. CAP. CXXIII.

Sonchi duo genera: syluestrior quidā est, & magis spinis horret: & alter tenerritate quadam *Vulgò ro-
 mollescit, cibus expetitus, anguloso caule, *inani, strum porci
 interdū rubēte: folijs in ambitu per intervalla dis-
 tinctis. Vtriusq; vis refrigerat, modicè adstringit: *Vox ex
 inde aestuati stomacho & inflammationibus illiti Plinio re-
 rosunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione posita.
 mitigat, lac elicit, in vellere appositus sedis ac vul-
 æ collectionibus opitulat. Tā herba quā radix il-
 la vibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter son-
 chus tenerior, arboris instar, latus cōstās folijs: caule
 in ramos exeuntē folia distinguunt, sed ad eadē pollet

ANNOTATIO.

Non video, quāvis & Græcus codex
 sic habeat, quomodo Seris satiua hor-
 tensi, quod planè est idē, stomacho uti-
 or dicatur, vt subesse errorem non pa-
 rum suspicemur. Marcellus, qui aut in-
 tegriori vsus fuit exemplari, aut locū,
 quē & ipse corruptum iudicabat, resti-
 tuere conatus est, sic vertit, Latioribus
 folijs altera, satiua & in cibus gratior.

Seris sine intybus. CAP. CXXIII.

Seris duūm generum est. altera syluest'ris, quæ
 spicris & cichorion vocatur: * altera satiua, * Officinis
 latioribus folijs constat, stomacho quā horten- scariola.
 sis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

vna

una folio latiore prodit, lactucarū simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: alium sistit coctā, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum. & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacū, per se, aut cum polenta, utiliter illuminantur: podagris, & oculorū inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, et aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla.

CAP. CXXV.

* μεγέθει
κυμαία
id est, magnitudine
fabæ.

Chondrilla, quā aliqui cichorion, alij serin appellant, caulē, flores, et folia habet cichorio similia: quæ ex causa nonnulli syluestris intubi specie esse pronuntiarūt, verū tenuior tota est: in cuius ramulis, gummi mastiches simillimū & tuberculo fabæ inueniri solet: quod cū myrrha tritū, et lintheo appositū, instar olivæ, feminarū menses trahit. Tusa cū radicibus herba, adiecto melle, diuidit in pastillos, qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordnatos pilos replicat: quod itē tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoueat. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctus, in vino, aut per sese potus, alium sistit. Aliud habet chondrilla genus, foliū ferens oblongū, circūrosum, humi sparsū, caulem succo mactetem lacteo:

Cteo:

LIBER SECVNDVS. 179

Ptero: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia cōcoquēdi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nasctur in lētis, & cultis.

Cucurbita. CAP. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus cōtra capitis ardorē, quā syriasin vocāt, in sincipite illinūtur: oculorū inflammationes podagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis tuis per se, aut cū rosaceo infusus, aurium doloribus auxilia tur: adustiones cutis in ardētī febre illiū adiuuat: totius feruefactæ, & expressæ succus, cum melle exiguo, & nitro potus, alui leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recentem excavatam infusum, si niētum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

Cucumer satiuus. CAP. CXXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur: refrigerat, corruptionem non entit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos aninus liquerit. Semen modicē vrinam mouet: cum acle aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & pinxetudas, cum melle. Peponis caro in cibis, vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius cōtra adustionē infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti adnota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum

M

semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgat, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachme pondere, vomitione mouet. Si quisquam moderate secundum cœni vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoq; illita cum melle vlcera cœcreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Lactuca. CAP. CXXVIII.

opidas.

Lactuca satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habetur: somnus conciliat, alui emolluit, lac euocat: verum decocta magis alunt. stomachis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, cōpescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus, & ignibus sacris opitulatur, muria condiuntur. Cū in caulem exierunt, vim quandā nascuntur, succo aut lacti syluestris lactucæ similē.

Lactuca syluestris. CAP. CXXIX.

Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & viribus aliquantulum papaueri similis: vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argentea caliginemq; repurgat, contra adustiones efficaciter illinitur, cū lacte mulieris. In summa, somnum allicit, doloris leuamētum præstat, men-
ses

ses trahit, contra scorpionum & phalangiorum
ictus bibitur. Semen, non aliter, quàm sativa, libi-
dinū imaginationes in somno amolitur, ac vene-
rem arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus in-
firmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea,
vt in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

Gingidium. CAP. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cili Nostrum
cia & plerunq; nascitur: herbula syluestri pa- Cerefoliū.
stinace similis, tenuior, & amarior: radice par- * πλᾶσop
ua, candicante, subamara. Olus hoc crudū, coctū, id est, pluri-
conditū, ve estur magna stomachi utilitate: vri-
nam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest. * τινρότε

Scandix. CAP. CXXXI. ρop, nō πu-

Scandix, syluestre olus est, amarum, subacre: κνότερop.
Squod crudum coctū, ve manditur, stomacho Scandix,
& ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, reni- Aetio lib.
bus, & iocineri confert. j. authore,
agreste o-

Caucalis. CAP. CXXXII. lus est, gin

Caucalis, quam alij syluestre daucum vocāt, gidio limi
cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhir- le, acre &
suto: folijs apio similibus, feniculi modo per ex- subamarū
trema multifidis, hispidisq;: candida in cacumine
umbella, suauiter olente, Crudum coctū, ve ole-
rum modo estur, vrinam mouet.

Eruca. CAP. CXXXIII.

Eruca eruca venerem largiore cibo cōcitāt.
Semen eodem effectu prodest: vrinam cit,

concoctioni prodest, alio perquam commodata. Semina ad condimenta utuntur: quod, ut in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ utuntur. Vrinam vehementius pellit, multò satius acrior.

Ocimum.

CAP. CXXXIII.

Officinis
Basilicon.

Ocimum vulgo cognitum. Id copiosiore cibus oculorum acie hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: agere tamen conficitur. Illitum cum polline polenta, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urinae, inflatisque naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiciunt, si feriatur a scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche.

CAP. CXXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg

vergēte: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis fistulosa. Hāc inter quaedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobāche sibi cognomentū vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, et in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionē accelerare creditur.

Barbula hirci. CAP. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herbae sui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVII.

Ornithogalū cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatus: a quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthiū. Radix bulbosa, cruda & cocta mādatur.

Tubera. CAP. CXXXVIII.

Tvbera rotunda radices sunt, sine caule, sine folijs flauescētes: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. CAP. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semē à nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamē: tenues caules, & capreolos vicinis

* Gracè est, fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt,
 ἐν μίση δὲ ὥς ὅτι τοπιarias ſcenas repræſentare videantur: ſili-
 ὡς οὐ πύρι- quas ſenigraci proferit longiores & toroſiores, in
 ἰοῦλα, quibus ſemina renum ſimilia, ſed in æquali colore
 qđ rectius recluduntur, * quæ quadā ex parte fulueſcunt. Si-
 forſitan reſt liqua cocta, cum ſemine in oleribus, aſparagi mo-
 dideris: quæ do, eſt tur. Vrinā ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

magna ta-

Medica.

CAP. CXL.

mē ex par-

te fulueſcunt,

ut intelliga

folia cōtrahit,

caules edēs trifolys,

& ſiliquas cor-

mus, Smila

uiculorū modo intortas,

in quibus ſemen lētis ma-

ca hāc diuer

gnitudine dependet. Id ſucatum,

iucundi ſaporis

ſi quidem co

gratia, conditaneo ſali admisceſtur. Viride, quibus

coloris ſemi

refrigeratione opus eſt, illitu ſuffragatur. Herba

na, magna

tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

tamen ex

parte fulue-

ſcentia pro-

creare.

quibus terna quaternāve ſemina nigra, lente mi-

Est quam

nora, continentur: quæ adſtringendi vim habent:

rura Viciā

quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-

ſylueſtrem ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

Aphaca.

CAP. CXLI.

Phaca in aruiſ naſcitur, altior lente, tenui-

bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in

quibus terna quaternāve ſemina nigra, lente mi-

Est quam

nora, continentur: quæ adſtringendi vim habent:

rura Viciā

quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-

ſylueſtrem ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

vocitant.

Porrum capitatum.

CAP. CXLII.

Capitatum porrum inflationem facit, no-

xiūm ſuccum creat, tumultuoſum ſomnum

parit, urinam ciet: aluo accōmodatur, extenuat,

oculorum aciem hebetat, menſes pellit: ſed ledit

exul

exulceratam vesicam, renesq; cum ptisana verò
coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in
aqua maris, & aceto cocta, in desensionibus, ad
præclusiones vuluæ, & duritias, utilis habetur.
Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida ma-
ceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen
acrius est, & quâdam adstructoriam vim habet:
quare succus cum aceto, addito thure aut manna,
sanguinis profuua sistit, maximè si naribus erū-
pat. Venerem stimulat contra omnia thoracis vi-
tia tabemq; pro delinctu efficax est: arteriam esu
pungat, sed si assiduè estur, visus obscuritatem
inducit stomacho aduersatur. Succus ex melle po-
tus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio
est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, la-
ele aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & so-
nitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum
vua rhois, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi me-
dentur, crustas ex sale illita rumpunt, veteres san-
guinis reiectiones cohibent, si binis drachmis, &
equali baccarum myrti pondere bibantur. Am-
peloprasum stomacho magis aduersatur, & plus
porro exalfacit: vrinam & menses vehemētius
ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cepa. CAP. CXLIII.

CEpa longa acrior est, quàm rotunda, item *Croton.*
flaua quàm cãdida, & sicca quàm viridis,
& cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes ta

men mordent, flatus gignunt, appetentiam inui-
tant, suum movent, & extenuant: fastidium pa-
riunt, & expurgant: aluo vtilis sunt. E& detra-
ctis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoi-
das, reliquosq; excretionum exitus referant, sub-
dite pro balanis. Succus cum melle illitus, oculo-
rum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & inci-
pientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem
perunguntur: suppressos menses pellit, caput pur-
gat naribus infusus: canis morsibus cum aceto, ru-
ta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas
in sole, vitiligines sanat: & cum pari spodio, sca-
bras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat:
contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo
adipe vtilis est: citæ aluo prodest: in auribus soni-
tû ac gravitatē emēdat: ad purulentas aureis, &
eliciendū earumdem aquā, valet: alopecie earum
succo perfricantur, qui celerius, quàm alcyoniū pi-
los euocat: largiore cibo cepa capitis dolores ciet,
cocta q; vehementius vrinam pellit: eos lethargicos
efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta,
plus equo vescantur: elixa, & cum passis vnis, &
fico illita, tubercula cōcoquit, & celerrimè rūpit.

Allium.

CAP. CXLIII.

Allium quoddam satiuū atque hortense ha-
betur, quod in Aegypto, singulari, vt por-
rum, capite cōstat, dulce, in purpureū vergēs, par-
num: reliqua verò magna, et cādida, ex pluribus
coag

oagmentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas,
 Græci nominant. Aliud est sylvestre, quod ophio-
 orodon, id est anguinū, vocant. Vis allij acris est:
 xcalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, infla-
 tiones facit, stomachū exiccat, sitim gignit, flatum
 permouet, summā corporis cutem exulcerat, aciē
 oculorū esu hebetat. Eosdē effectus præbet angui-
 nū, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris
 tinea in cibo sumptū ahigit, vrinas detrahit: con-
 tra viperarū ictus, & priuatim hæmorrhoi, pro-
 dest, ita vt nō aliud magis, si cū vino iugiter assu-
 matur, aut tritum in eodē ebibatur: contra rabio-
 sorū morsus & illitu, & cibo valet. Magnæ &
 allio vtilitates contra aquarū mutationes: vocem
 clarificat, veterem tussim crudū coctūmve lenit:
 potum autem cum origani decocto, pediculos, &
 lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus
 cū melle, & alopecij cum nardino vngine, me-
 detur: eruptiōes papularū cum oleo & sale sanat:
 vitilignes, lichenas, lentigines, vlcera capitis ma-
 nantia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cū
 thure, & teda decoctum, dentiū dolorem leuat, si
 in ore contineat: contra venenatos muris aranei
 morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illini-
 tur. Feruefactæ comæ ius, fœminarum desessioni-
 bus additū, menses, & secundos partus extrahit.
 Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo,
 & nigra oliua intritum, quod myttoton vocant,

esucit urinā, ora venarū patefacit, hydropicis v-
tile. Scorodoprasum magnitudine porri, æquat,
qualitatū porri, et aliū particeps: unde p̄miscuas
sibi vires ex utroq; vendicauit, effectus aliū, &
porri prehens: inefficacius tamen Coctum, porri
modo, dulce fit, & in olerum vicem transit.

Sinapi.

CAP. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi vocant. Eligi de-
bet adultum, valde rufum, nō magnopere sic-
cum, sed quod fractum internē vire scat, & velu-
ti quorūdam succo madeat, cāsum colore: siquidem
recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfa-
ciendum, extenuandum, extrahendum, effuax
est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur:
contra præduros tōsillarum tumores, ac veterem
callasamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua, et
melle, conuenienter gargarizatur: sternuta men-
ta ciet, tritum & naribus admotū: comitialibus
quoque auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulatū
oppressas excitat: leihargicis, derafo capite, illini-
tur. cum ficis admistum, donec rubeat locus, &
ad coxendicum cruciatus impositum, * ad lienes,
& omne genus dolores confert, cum permutandæ
valetudinis, causa ex alto vitia extrahenda sunt.
Alopecijis illitum medetur, faciem purgat, sugilla-
ta cum melle, adipe aut cerato rapit. Feræ impe-
tignes & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
tra febrim circuitus aridum bibitur, aut potui,

pol

* κ̄ σπλ̄-
vas καὶ κα-
θόλου ὅς
πᾶν χρ̄-
σιον ἀλγ-
μα.

olentæ modo, inspargitur: extrahentibus empla-
ris, scabiemq; extenuatibus, vtiliter admisceri so-
t: tritū, gravitati aurium & sonitui, cū sico im-
positum prodest. Succus ad hebetudines oculorum
& genarū scabritias magna vtilitate illinitur.
expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtium. CAP. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylo-
nicum. Omnium semen est acre: ex calfa-
it, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
excitit, lienem imminuit, partus examinat, men-
ses cit, venereū stimulat, sinapis & erucæ simile
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Il-
litum cum melle, lienem extenuat, fauos expur-
gat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus inco-
ctum. Serpentium venenis potum resistit, atq; eas
suffitu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbon-
culos ad suppurationem perducit, & rumpit: co-
xendicibus cum polenta commodè ex aceto illini-
tur, tumores collectionesq; discutit, emittit furun-
culos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem
effectus, licet minor.

Thlaspi. CAP. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis foliis, digitali lon-
gitudine, in terram versis, suppinguibus, in
cacumine diuisis: binam dodrantum cauliculo,
tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-
ca ipsum totum, ab extr. mo in latius se panden-

* *Δισκοει* te: semine nasturtij incluso & lenticulae vasis ejus, id est, gae, nisi quod infringitur (vnde nomen accepit disci figura. flos albicat. Nasceitur in semitis, & sepibus, & sisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilis utrinq; extrahit, potui acetabuli mensura: pro ischiadicis infusum: sanguinem potui educit, internas suppurationes rumpit: menses ciēt, sed peritus enecat. Alterū thlaspi tradit Cratenas, quod aliqui Persicon sinapi vocant, latis folijs, radicibus magnis: utile ischiadicorum infusioni.

Draba CAP. CXLVIII.

Alij arabis. **ῥάβδος*, re folia, ceu lepidij, sed molliora, & cādidiora: id est, vir- cacumine verò sambuci umbellam gerit, cādidiores flores habētem. Herba haec cum ptisana coquitur in Cappadecia maximè. Semen aridum pro piperis obsonijs admiscetur.

Irío. CAP. CXLIX.

Erysimon, Latini irionē vocāt, iuxta vrbes rudera, hortosq; nascitur, folijs erucæ sylvestris: cauliculis in lori modū lentis & obsequiosis floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vifoenogræco, cornicularis: semine nasturtij, exiguo: vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & purulenta extussumuntur: regio morbo, & coxēdicibus prodest: contra venena in dēunctu cū melle datur: illinitur ex aqua aut melle utiliter

ecis carcinomatis parotidibus, duritijs mamma-
rum, & testium inflammationibus. In totũ ex-
muit, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet,
aqua madescat atq; torreatur, vel luteo illiga-
m, pinsita farina oblitum perassetur.

Piper. CAP. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur:
quæ inter initia, prælongum fructum, veluti
liquam promit, quod longũ piper est: habet intus
liquidum tenui milio simile, quod tandè in perfectũ
piper euadit. Id autem suis tẽporibus, deliscẽs, pã-
rens q; sese racemos emittit, grana ferentes qualia
videmus. Ea acerbam candidũ piper faciũt, aptum
ocularibus remedijs, antidotis, et medicaminibus,
quæ cõtra venenata parantur: theriaca vocant. Lon-
gum verò vehemẽtius mordet: & quoniam prius
quàm ematurescat decerptum est, subamarum re-
inquitur, antidotis & theriacis medicaminibus
expetitũ. Nigrum verò, vtpote quod tẽpestiua ma-
turityte collectũ sit, odoratũ esse cõstat, cãdido sua-
uius, acrius, & ori gratius, necnõ ad condimenta
vtilius. Sed candidũ, & adhuc in acerbum ver-
tẽs, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissi-
mũ, plenũ, nigrum, sine multis rugis, recens ac mi-
nimè fursurosum. Inueniuntur etiamnũ in gene-
re nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania,
minimi q; ponderis, quod vocant brassia. Vis o-
mnium excalfacit, vrinam ciet, cõcoquit, extrahit,
discut

discutit, absterget caliginē quæ oculis obuersatur.
 Piper, febrium horroribus circuitu repetentibus
 siue potu, siue illitu, subuenit serpentium morsibus
 auxiliatur, partus extrahit: conceptū adimere cre-
 ditur, statim à concubitu suppositum: tussi, omni-
 busq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, suc-
 currit: anginae eo & melle cōuenienter perungun-
 tur: potū cum recentibus lauri folijs, tormina dis-
 cutit: cū vna passa manducatum, pituitam à capi-
 te elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appeten-
 tiam mouet: concoctionem adiuuat, ad intinctu
 esculentorum additum: strumas cum pice discutit
 vitiligines ex nitro emaculat. Ficuli nouo, vt flen-
 tacula, motum torretur. Non est huius arboris ra-
 dix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo
 post ostendemus. Namq; piperis radix cōsto simi-
 lis est, ora gustantium accendit, salinam ciet. Ele-
 lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput
 etiam purgat, manducata cum semine pedicularis
 herbae, quam staphudem agriam vocant.

* φακί, nō
 φασίμ.

Gingiberis.

CAP. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglo-
 dytica Arabia magna ex parte nascēs: qua
 virente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtur-
 tur, & primis potibus & edulys admiscet. Huius
 radices, cyperi modo, paruae sunt, candican-
 tes, & odoratae, atque piper sapore imitantur. Eli-
 gi debent quæ terebinthes non nouerunt. A multis
 iamem

men ob id & concludunt, quod celeriter carie sen- * ταριχεύε
ant, at fistulibus in Italiam asportantur. Gingibe ται διὰ τὸ
s cibo conueniens est, & cū cōdimento assumitur. εὐσχηπτον,
excalfactoriam vim & excoquēte habet: aliū le id est, sale
iter emollit, stomacho utilis est, efficax aduersus consperguntur,
i quæ oculis caliginem offundunt. In antidota tur, quod fa
ddi solet. In summa, piperis viribus respondet. cile putre-

Hydropiper. CAP. CLII. scant.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ sta-
gnant, aut pigro lapsu repunt: caulē edit ^{σεριόρ,}
reniculatum, * prædurum, multis alis concavum: id est, solidū
folia menthæ, maiora, molliora, candidioraq; gu
stu piperis, acri, citra tamen vllam odoris gra-
tiam: fructum acrem, in surculis paruis, prope
folia racematim coherentem. Folia cum semine
illita tumores veteresq; duritias discutunt, sugil-
lata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro
pipere in obsonijs admiscetur. Radix parua, nul-
lius in medicina momenti.

Ptarmica. CAP. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos ha-
bens paruos, multos, & rotundos, abrotono
non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa,
multa, & in cacumine capitulum, ut anthemi-
dis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster-
nutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia
cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores
sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in

monte

montibus & petrosis.

Radícula seu lanaria herba.

CAP. CLIIII.

Cēsetur ea **S**Truthiū herba vulgò nota, qua purgandis la-
quam vul **S**nis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est
gò saponaria acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, or-
rū dicūt thopnæ ex melle sumpta, cochlearis mensura:
aliū soluit. Eadem cum panace & capparis ra-
dice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du-
ritiam lienis absūmit: menses imposita trahit,
partus efficaciter enecat. Cum polenta autem &
aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum
farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur &
malagmatis, & ocularibus collyriis, claritatis
causa. Sternutamenta mouet. per os purgat, trita
cum melle, & naribus infusa.

Cyclaminus. CAP. CLV.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
varia, in quibus suprà infraq; allicant ma-
cula: caule nudo, quaternos digitos æquante: flo-
ribus in eo * purpureis, rosarum effigie: radice
nigra, & aliquantum lata, vt rapū videri pos-
sit. Quæ cum hydromelite pota, pituitā aquamq;
detrahit: menses potu appositūve ciet. Tradunt,
si prægnaans radicem transgrediatur: abortū fie-
ri. Partum appensa accelerat: contra venena,
præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita
contra serpentū iclus, remedio est: immista vi-

no

LIBER SECVNDVS. 195

io inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passò aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & à persfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deicienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito umbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix autem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absorbet: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, perniciosesque foveri congruum est: ipsaque in oleo vetere feruifaceta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere feruente imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica momento, ut strigmenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile perniciosis. Radix, scilla modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nasceitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

N

Altera cyclaminus. CAP. CLVI

Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, seminoribus: gemculatis caulibus, crassiq; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachma vnius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus quadraginta diebus, lienem per vrinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur, reliquias à partu purgat.

Dracunculus. CAP. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguē planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cū ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq;: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aron non absimili, tenui obducta cortice. Nasct in sepibus vmbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiā ex lana impositus, polypum absomit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorē aiunt posteaquā flaccidi flores emarcuerunt, cōceptus adhuc teneros enecare. Radix ex-calfacit: orthopnoeis, ruptis vulsis, tussi, destilla-
tion

tionibus. auxiliatur: humores pectoris excreatu facile reddit, siue cocta tostataq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinā pellit, venerem excitat, cum vino pota: phagedenas vlcerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cū melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos parius fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitiligines emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino perniomibus apposuisse prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro oleris recipitur: in Gymnæsij insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, succatur in vmbra, & ita reconditur.

Arum.

CAP. CLVIII.

ARon, apud Syros lupha vocitatum, folia Iarus offi-
emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceū semen exit. radice dracūculi alba, quæ decocta estur, ut pote cum minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix,

N 2

semen & folia, dracunculi vires habens. Priuatim radix ex simo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum.

CAP. CLIX.

Arisarū exigua herbula est, cuius radix olea magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimonia: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

Hastula regia.

CAP. CLX.

Officinis
Aphrodi-
tis.

Hastula regia vulgaris notitia est, folijs maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt: vrinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & iussibus, drachma pondere pote ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida & depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosq;, decoctis in face vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, sitq; perquàm vtile oculis medicamen-

tum

LIBER SECVNDVS. 199

tum: ad purulentas aureis per se, & cum thure,
melle, vino et myrrha tritus, prodest: in contrariā
urem infusus, & dentium dolorem mitigat. Cinis *καθ' ἑαυ-
radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum τὸν ἐγχυσ-
in excavatis radicibus igni decoctum, illitu exulce- θείας.
atis pernionibus & ambustis igni, conducit: &
surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Can-
lidam vitiliginem, & linteo antea perfriatam in *προανα-
sole, illita radix emendat. Semen floresq; in vino τριφέντα
noti, scolopendrea & scorpionum venenis, mirum ἐν ὀθνίῳ
in modum resistunt: aluum purgant.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

Escultēus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur:
stomacho & alui utilis rufus, et qui ex Aphri-
a defertur. Amarum verò & scillimus, stomacho
iptior est, & concoctionē adiuuat. Bulbi omnes a-
rimoniā habent, exalfaciūt: venerē stimulant, lin-
guam tōsillasq; exasperant, multum alimēti præ-
ēt, carnes creāt, inflationē pariunt: luxatis, fractis,
articulorū doloribus efficaciter illinunt: spicula ex-
rahunt: gangranas & podagras ex melle aut per
se, hydropicorū tumores, & canum morsus cum
melle & piperis polline illiti cohibent: sudores cō-
escunt: stomachi dolores mitigant: furfures &
lcera quæ in capite manāt, cum tōsto nitro abster-
runt. Sugillata varosq; per se aut ex oui luteo, &
entigines cum melle vel aceto, emendant: fractis
uriculis vnguibusq; ex polenta medentur: idem

calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus : item cum cinere è manarũ capitibus, impositi : cremati verò & cū alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; catrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius.. CAP. CLXII

Bulbus quem vomitorium vocant, folia habent lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus : radicem similem. & cortice nigro. Ea radice mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet.

Scilla.

CAP. CLXIII.

Officinis
Squilla,
Varronis
more.

Scilla vim acrem atque feruentem habet: assata ad multa viliore esse constat. Polline aut crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducen crusta sufficienter intosta fuerit : qua exempta, non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt : nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum admittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medium, direptis vinctenus tunicis, quod frustatin confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat traiectaq; lino frusta ficcantur in umbra, ita ut nulla quidem parte se contingant: his scillæ segmibus

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vti-
mur. Ad rimas pedū, interna pars crude scillæ in
oleo feru facta, aut cum resina liquefacta imponi-
tur: decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma
est. Ad singulas assæ parteis adiectis octonis tostis sa-
lis, cochlear vnum aut alterum damus ieiunis, ad
emolliendā aluum: in potu autem & odoratis me-
dicaminibus, & quibus urinam ciere volumus, hy-
dropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, re-
gio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, et
ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex melle
sumpsisse satum est. Coquitur cum melle, & estur eo
rundem gratia, maximè ut concoctionem adiuuet.
Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili
sumpta modo, eosdem præbet effectus sed cauendus
scillæ vsus, his qui intestinum sentiunt vlcus. Ad
pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter illi-
nuntur. Tertium semen, & in carica aut melle deno-
ratum, aluum emollit. Scilla tota in limine ianua
suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio. CAP. CLXIIII.

Pancratium, quod aliqui scillam appellant,
radice est magni bulbi, subrufo colore aut
suppurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs li-
lij, sed longioribus. Scilla vires & præparatio-
nem habet, eodemq; ponder: in morbis efficaciter
assumitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas
inest. Radicis succus cum erui farina digeritur

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissimè dantur.

Capparis.

CAP. CLXV.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis punicorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui plerunque solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & urinam cruentumq; excrementum emittit: bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radialis cortex ad eadem proficit: vlcera omnia Vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutunt. Aurium vermiculos infusus suc

CH6

tus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica cap-
baris, vehementer inflat. Apula vomitus facit. &
quæ à Libyco, & quæ Rubro mari defertur, mirum
in modum acris est: siquidem in ore pustulas exci-
tat, gingiuasq; osse tenus exest: quare in cibis non
abire damnatur.

Lepidium.

CAP. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Censetur
vulgo nota: muria cum lacte seruatur. Vis piperitis o-
foliorum acris & exulcerans: quapropter ischia- litorum.
dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum
helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lieno-
sis simili modo prodest. lepras eximit. Radix ap-
pensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum.

CAP. CLXVII.

Complura ranunculi genera. vis tamē omni- Vulgò A-
bus vna, acris, & vehemēter exulcerans. Nā pium risus
vnum coriandri folijs constat, latioribus, subalbi-
dis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: cau-
le gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, ama-
raq; multis capillamentis, hellebori modo, fibrata:
nascitur in limitibus humidis. Alterum lanugino-
sus, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, *ple * πλῆσον,
runque in Sardinia proveniēs, quam acerrimum, id est, copio-
quod sylvestre apium appellat. Tertium minimū, sum.
odore graui, flore aureo. Quartū huic simile, flore
lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illi ex-
ulcerant, & crustis non sine dolore gignūt: quare

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigma-
ta delent: formicantes verrucas, & pensiles, alo-
peciasq; paulisper illita tollunt. Tepēte decocto per-
niones fouentur. Sicca radix, tritaq;, sternutamen-
ta ciēt, naribus admota: dentium dolorem appen-
sa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone. CAP. CLXVIII.

DVo anemones genera, vnum syluestre, alterū
in cultis nascens. Cuius multae species: vna
phoeniceū florem profert: altera candicantem, aut
lacteum, aut purpureum. harum folia ccriandro
similia, ceterū scissa tenuius in terram inclinan-
tur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt pa-
paueris, & in medio capitula nigra, aut caerulea:
radix oleae magnitudine, aut amplius paulo gran-
descit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Syl-
uestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, et
duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus,
& multis radicum capillamentis. Acrior est, quae
nigra habet folia. Vis vtriusq; acris: ea de cau-
sa succus naribus infusus, purgat caput. Comman-
ducata radix pituitam trahit: decocta in passo &
illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatri-
ces eorundem & hebetudines emendat, sordida vl-
cera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana de-
cocti edantur, copiam lactis praebent: menstrua
ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras exi-
munt. Sunt qui errore ducti, argemonem nomina-

ri eup

ri eupatorium putent: quoniā à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellāt (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationē in floribus, distinguere nō possunt. Verū papauer & argemone colore minus saturato spectatur, & vtraq; tardius floret. Quinetiā argemone crocēū succū, gustu admodū acrem, reddit: rhœas verò candidiorē & acrē. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. CAP. CLXIX.

ARgemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem, dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt.

Anagallis. CAP. CLXX.

DVo anagillidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotunda. Vtraque mitigandi

vina

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gargariZatu purgat: & naribus infusus, dolore dentium lenit, si in aduersam na rem inijciatur: argēma cum melle Attico emendat: retuse oculorū aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris et renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ cæruleum ædit florem, prociduum sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu euocare.

Hedera.

CAP. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa, & * concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens: nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborū succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres capitis dolores * caput eo cum aceto, & rosa ceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut eposi corymbi, corpus infirmat, mentemq; turbant

* εὐθυμώ-
τερα, non
ἐπιδρά.

* ἀρμόζει
αἱ.

ant largius sumpti. Acini quinq; triti, calfactiq;
 in pinici mali cortice cū rosaceo, si instillētur à con-
 traria aure, dolore dentiū mitigant. Denigrat ca-
 pillū, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illinūtur
 minimū vlcerū generi, etiā si cacoēthe sint: vitia cu-
 is in facie, & ambusta sanāt, vti antea diximus,
 decocta. Mouēt mēses triti & subditi corymbi: idē
 poti, post purgationes fœminariū, draughta pōdere,
 incipiendi spem adimūt. Pediculus foliorū melle ir-
 rigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & partus ex-
 rahit. Instillatus succus putrida tadia nariū, gra-
 uolemiāq; emēdat, & sanitati restituit. Lacry-
 na hederæ psilothrū est: illitu pediculos enecat. Suc-
 cus radicū in aceto potus, contra phalāgia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubi-
 tali aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranun-
 uli. mollioribus tamen, & colore cæsis: flore vio-
 læ albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo
 succus croci, mordax, acris, & aliquantulum sub-
 imarus, grauter olens: radix supernè singularis,
 infernè in multa crocea capillamenta fibratur: si-
 qua, ceteris corniculati papaueris, tenuis, in metæ
 figuram longa: in qua semen papauere manus re-
 luditur. Succus in aëreo vase, cum melle prunis
 decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, ra-
 dice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus
 in vmbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso
 &

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpūt: imposita cū vino, aut māducata, dentitū dolorē sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinū exoriatur, & discerpsu emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matres excacatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIIII

Vulgo **Scrofularia minima** **Vor.** **C**helidoniū minus, quod triticū syluestre alii qui nuncuparūt, herbula pediculis ab radice pēdens, sine caule: folijs hederæ, multo rotundioribus, et minoribus, teneris, & suppinguibus: radice habet ex eodē callo cōplures, pusillas, in granorum tritici modū acervatim cōgestas: quarum tres aut quatuor in longitudinē exeūt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo, summam cutē exulcerat: psoras et scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgādū caput naribus infundit. Decoctū eius cū melle gargarizātū, magnificē id præstat, et omnia pectoris vitia extrahit. **Othonna.** CAP. CLXXV

Varie de Othonna sententie. **O**thonnam aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij. Alii succum foliorum corniculati papaveris expressum. Alii permistos cæruleæ anagallidis, hyscyami, & papaveris succos, esse contendunt. Alii troglodytica cuiusdam herbæ succum, quæ othonna vocatur: nasci q̃; eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribra-

mo

LIBER SECVNDVS. 209

modo, & veluti à tinea derosis, squallore obsitis,
 aucis: flore croci, latifolio: quare quidam anemo-
 nes speciem esse putauerunt. Extractus succus ocu-
 lorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est
 pus: mordet enim & absterget omnem caliginē,
 quae oculis offunditur. Tradunt humorem quendam
 ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in
 astillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affir-
 mant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascē-
 rem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum
 ruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. CAP. CLXXV.

Muris auricula, quā myosotida vocāt, herba
 est caulibus pluribus ab vna radice, aliqua-
 tus ab imo rubētibus, et cōcauis: folijs angustis,
 blongis, dorso acuto, elato, nigricātibus, per inter-
 alla assidue geminatis, atq; in mucrone desinenti-
 us, et tenuibus, cauliculis ex alarū sinu prodeūti-
 us: flosculo, vt anagallidis, c.eruleo: radix digitali
 crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix il-
 la egilopia sanat. Sūt qui alsinen, muris auriculā
 vocitāt. Glastum. CAP. CLXXVI.

Satium glastum, quo insectores lanarū vtun-
 tur, folium habet plantagini simile, verū pin-
 tius nigriusq;: cuius caulis duū cubitorum al-
 tudinem exedit. Illita folia tumores omneis dis-
 utiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis pro-
 fluua sistunt, ignem sacrum, phagedaeras, putre-
 scentī

scientia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Sylue.
 stre glastum satiuo simile est: folia fert maiora, la
 *λεπτοτέρη Etucaceis proxima: caules *prætenues multifidos,
 pss, id est, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine folli-
 tenuiores. culi multi dependent, quadam linguarum effigiem
 referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eade
 quæ & suprâ dicta præstat: potu & illitu liena
 sis auxiliatur.

Telephium. CAP. CLXXVII.


Vulgò **T**elephium herba portulacæ similis est, & can
 Crassula le, & folijs: alas binas in singulis foliorum
 maior, & geniculis annectit, ramuli à radice semi septenarij
 faba inuer prodeunt, folijs referti exruleis, crassis, lentis, ac can
 sa. nosis, flore luteo, aut candido. Nascitur inter vites,
 & locis cultis vere. Folia senis horis illita
 albam vitiliginem sanant: sed post-
 ea hordeacea farina illini de-
 bet. perunctam ex aceto
 etiam in sole vitiligi-
 nem tollunt, sed
 vbi inaruerunt,
 abstergun-
 tur.

S E C V N D I L I B R I
 F I N I S.

P E D A N I I

D I O S C O R I D I S

A N A Z A R B E I, D E

*Medicinali materia,**Liber III.*Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.

V P E R I O R I B V S charissi-
me Aree commētarijs, tradidimus
de aromatibus, vnguentis, oleis, ar-
boribus, earum fructibus & lacry-
mis, item de animalibus, cereali-
bus, oleraceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc
autē tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ
vernacula & inter se cognata censentur: quæq; plu-
ribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

CAP. I.

A Garicum radix fertur laserpitij similis, sed
facie summa solutior, & rariore fungosoq;
ota cōtextu. Duo eius genera: femina, quæ præfer-
tur rectis intus venarum discursibus constat. mas-
cotidus est, & vndiq; compactior. Vtriq; gustus
in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudi-
nem transit: gignitur in Sarmatiæ regione, quæ
Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affir-

Q

ment: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus
quadam putredine. Cignitur in Galatia, Asia, &
Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstrin-
gendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est con-
tra tormina, cruditates, & rupta: prodest itiden
contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus oboli
in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosi
verò, in aqua mulsa. Arquatis quoq; suspiciosi, io-
cineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis
Item si vrina agrè recidatur, si vulua strangulatu
urgeat, si paller membra decoloret, drachma vi-
dari solet: si talis infestat, ex passo: si lien nego-
tium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi
est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine ulli
humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acidi
ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones si
stit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxae
dicum, & articulorum dolores, & comitiales mor-
bos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur
menses ciet: foeminis, quas inflatio vuluae vexat, vt
liter equali modo datur. Horrores soluit datu ant
februm accessiones: aluum purgat drachma vna
aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum
antidotum est denarijs instar, cum diluta potion
sumptum: si serpentes iclum vibrarunt, morsumq;
subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè aux-
liatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit
pro viribus, & etate datum, nunc ex aqua, nunc

x vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. CAP. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhaponticum vocant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, est, quod centaurio magno similis, sed minor & rufior, sum. Reupontici rosa, aliquantum lenis, sine odore. Optimum habet nomine hoc, quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa die indicæ adstrictione lentescat, manducatumque colorem reditur. dat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id eorum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, lenosos, hepaticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intenta præcordia, & vuluæ mala, coxendicium dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem, quo agaricum ponere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passò: si lienis exercet, in aceto mulso. si dissolutione est stomachi, id est cum cibi tenax non est, mandatur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia lichenasque tollit, cum aceto illitum. inflammationes omnes veteres ex aqua oblutum dissipat. summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

Gentiana. CAP. III. *Græcus

Gentianæ inuentio prima assignatur. *Gentio Gentida.

Illyriorum regi, à quo cognomētum habuit. Folius partim proximè radicem, in glandi plantaginivē similibus, subrubris, partim à medio caule, & praesertim iuxta cacumen paulum dissectis: caule cauo, & leni, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervallis maioribus foliato, binum saepe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, glumoso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longæ aristolochiae, crassa, amara. Nasceitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice ex-calfactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & convulsis, prodest: hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit Radix collyrii modo subdita, partus eicit: imposita, ut lycium, vulneraria est, & vice-rum cuniculatum depascetium medela. Succus praecipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrii acerbis immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio haec est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia. CAP. II. III.
Aristolochia nomen ex eo sibi adoptavit, quod exist

existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germi-
nibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pi-
lei similitudine, in quibus quod rubrū est, grauter
olet. Longa, mascula appellatur: nonnullis dactyli-
tis, longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis,
dodrantalibus: flore purpureo, grauter olente, qui
marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Ra-
dix rotunda, in orbem conglobata, rapi modo. Lon-
ga verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis
longitudinem implet, nonnunquam paulo maio-
rem. Ambæ colore entus buxæ, gustu amaro, &
gravi. Est etiamnum tertia longa, quæ clematidis
vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs sub-
rotundis, minori semperuino similibus: flores rutæ:
radices longiores, tenues, crasso cortice odoratæque
vestitas: priuatim vnguentorum spissamentis con-
uenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa
verò aduersus angues, & venena, drachmæ pon-
dere ex vino bibitur, & illinitur: pota cum pipere,
& myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum
mora eicit: eadem efficit subdita in pessō. Rotunda
ad eadem pollet: in super singultibus, suspirijs, hor-
roribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cū
aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula
extrahit, ossium squamas illius adimit, vlcera pu-

trida exest, & sordida expurgat: caua cum iri, & melle explet. gingiuas, & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

CAP. V.

Liquiritia officinis.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguis, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, & maxis, qui siliquas letium modo habet, rufas & paruas: id est, longas. radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxæ, subacerbis & dulcibus: quæ densantur in succum, lycij exemplo. Is in arteria scabritia efficax habetur: verum oportet ut lingua subditus eliquescat, æstuantis stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, commanducatus ori prodest: recentis radices decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

Centaurium magnum.

CAP. VI.

Censetur Reupontinarum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis quibus

busdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnaus, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, cõuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuētibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Kamenta eius in collyrii formam vuluæ subdita, menses atq; partus extrahunt. succus eadem præstat: vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. CAP. VII.

Centauriū, limnesion aliqui vocauerunt, quoniā origina amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedere: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: foliis rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & superuacua, quæ gustanti amaritudinē adfert. Herba recēs tusa, suo illitu vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bilē crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimum.

mē infunditur: trahit enim sanguinem & dolore leuat. Succus oculorum medicamentis perquā vtilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. in vellere appositus, mēses & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vitis succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pragnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec superemineat aqua: mox vbi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, vsq; dū mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentē gravidamq; contundunt, atq; succum sicili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum sancibus vasis adhærescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt. No. Tu diligenter operiunt: nanq; ros nocturnus, liquores coalescere nō sinit. Quæ autē siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (vt in gentiana mentione retulimus,) preparantur: sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis faciliantur, in sole, vti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succus: sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lycium tamen, & absinthiū, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

Chamaeleon albus. CAP. VIII.

Chamaeleon albus, ixia ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscus circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche vtuntur
mul

mulieres: folia habet silybo aut carduo similia, *a- *Sic Plin.
 superiora, acutiora, nigroq; camæleone validiora: græcus co-
 caulem non promit, verum ex medio spinas, echini dex παχύ
 marini, aut cinara modo, erigit: flores purpureos, τερα, id est
 veluti papporū lanugines emittit: semē cnici simile: crassiora:
 radicē in latis collibus crassam, in mōtosis verò gra ni fortè
 ciliore, in profundo albā: aliquātenus aromaticā, τραχύτε-
 graui odore, dulcē. Quæ pota acetabuli mēsurā, la- ρα legen-
 tas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in vino dum: quod
 austero, cum origani feruefacti succo. Hydropicis ex herbarū
 commodissimè drachma in vino datur, etenim eos collatione,
 extenuat: contra difficultatem vrinæ decoctū pro- si quādo vi-
 pinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resi- dere contin-
 stit: occidit canes & sues. mures itē necat, subacta gat, facilè
 cum polenta aut aqua, & oleo madefacta. dydicane
 ris.

Chamæleon niger. CAP. IX. ris.

Chamæleon niger, folijs scolymo similis esset,
 nisi minora, tenuioraq; . ac rubro distincta
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi-
 tudine digitali, subrubrum: & in umbella flo-
 res spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ
 dissecta flavescit, & commāducata mordet. Pro-
 uenit in campestribus, siccis, & cliuosis tracti-
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asci-
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines ab-

Nominis
ratio.

sterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera cblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, vitilignesq; cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedenas, tetraq; & cera illitu sanat. Quare chamaeleo vocetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alicubi caerulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

CAP. X.

CRocodilion chamaeleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantum lata, odore, vt nasturtii, acuto. Feruefacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scitum, quod suapte vi urinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP. XI.

Virga pastoris vulgò.

DIpsacum aculeatarum generis est: caulem habet aliud, spinis horridum, folijs lactucae, spinosis, binis genicula singula cōplectentibus, praelongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorso medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula surculis capit

capitula insunt, oblonga, echinimata spinis: quæ are facta, candida spectantur, dissecta; medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in vino radix, vsquedum si crassitudo cere, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucisq; pessilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantulum hispida, & aculeata: caule supra binna cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen cernuum, sed rotundius. Huius radix pota, cæliacis, stomachicis, & qui cruenta extussumt, efficax est: vrinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes indolores collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. CAP. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasque fluxiones radix etiamnum valet.

Pro

Sedeguar

Prouenit in asperis.

Carduus.

CAP. XIII.

Est gallorū
Artichau.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamaeleonis habet, aut albæ spinæ nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in vino bibatur. Copiosam autem urinā fetidamq; expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium.

CAP. XV.

Poteriū, Iones neurada vocāt, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lētis, tenuibus, tragacanthæ proximis folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nasctur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternūve cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tussæ, præcisus neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium.

CAP. XVI.

*Additum
ex Plinio.

Acanthium albæ spinæ simile, folijs nucleatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis } ex qua collecta & neta, vestes hombycinis similes texunt. Folia vel radices ad remedia opisthoroni bibuntur.

Acan

Acanthus, Romani paderotam vocant, nasci Officinis
tur in hortis, petrosis, & riguis: folia habet Branca vr
multo lactucaceis latiora, & longiora, erucæ diuina.
sura, nigricantia, pingua, lævia: caulem binum cu
bitorum, digitali crassitudine, lævem, prope verti-
tem ex interuallis circundatum foliolis, ceu nuc-
menta quædam oblonga referentibus, spinosis, è
quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum:
caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, muco-
sis, rubris, & glutinosi: quæ vstis igni & luxatis
artubus illitæ subueniunt: potæ vrinam ciunt, sed
aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentienti-
bus, mirè prosunt. Nasctur & syluestris acanthus,
colymo similis, aculeatus, breuior quàm satiuus,
& is qui hortis prouenit: cuius radix ad eadem ad
quæ superior efficax.

Anonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò, Re-
mos habet fruticosos, dodrantes, aut pau- sta bonis.
o maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis ala
um multis, capitibus rotundis, folijs lenticula, te-
uibus, pusillis, ad rutæ aut prætensis loti folia ac- * Suspicio
edentibus, subhirsutis, odoratis, nō iniucundè olen- lotum syl-
ibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat, cibus uestre in-
ratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spi- telligendū:
ali firmioribus horrēt: radicem mittit candidam, ac ob id for
ma exalfacit, & extenuat: huius cortex ex vino tē præten-
potus,

sem dici, potus, vñiam ciet: calculos comminuit, margines quod trifo vlcera erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolus pratesis lozem dentium collotione mitigat. Decoctum eius constat fo- potu hemorrhoidas sanare creditur.

lijs: vt volu-
mine quar-
to à Diosco-
ride depin-
gitur.

Leucacantha.

CAP. XIX.

Leuacantha, prædita est radice cyperi, valida & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atq; ischiadici prædest, decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbere effectus.

Tragacantha.

CAP. XX.

Tragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriantur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est euamni Dragagā- tragacantha, lacryma: quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, leuis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoq; linguæ liquecit, & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vñto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryn

Eryngium.

CAP. XXI.

Nūc corrū

ERyngium aculeatarum generis est. Cuius fo-
lia in principio, sale condita, in cibos recipiun-
tur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, dicitur.

gustū aromatica. Sed ubi adoleuerunt circa com-
blures caulium eminentias in spinas aculeantur. in
quorum summitatibus glohosa capitula, durarum
acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim cir-
cumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās al-
bus, interdum cœruleus inuenitur. Radix oblonga,
lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudi-

ne, odorata. Nasctur in asperis & campestribus.
Vim habet calfactoriam: pota mēses & vrinas pel-
lit, tormina inflationesq; discutit: contra iocinerum
vitia, serpentium morsus, & hausta venena, cum
vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum senu-
nis pāstinacæ drachma vna: appensa illitāve, tu-
bercula discutere proditur. Pota cum hydromelite
radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

Aloë.

CAP. XXII.

ALoes folium scillæ similitudinem habet,
crassum, pingue, modicè latum, rotundum,
retrorsus pandum: folia vtrinq; ex obliquo lon-
gioribus interuallis striantur, & in spinulas de-
sinunt retusas truncasq;. Caulis emittitur non
dissimilis * antherico: flos albus: fructus hastulæ
regiæ cognatus: graui tota est odore, & gustū
amarissima: radice vna, ceu palo, in terram depa-

ta.

* Per an-
thericum
caulē As-
phodeli,
cui aptis-
simè com-
paratur
Aloë, hic
intelligi-
mus: quā-
uis Dio-
scorides in
Asphode-
li siue Has-
tulæ re-
gice histo-
ria, ei⁹ flo-
rē hoc ap-
pellari no-
mine tra-
dat,

Etia. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nasitur etiã in Asia & Arabia, in locis quibusdã maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahẽdo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanẽ quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimẽ esse videtur, alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet,

*Plin. pin *sycera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorũ exiguis qui nõ pers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta, καθαρά, facile liquecens, eximiæ amaritudinis: improbatur vt nostri nigra & fractu contumax. Gummi eam adultecodices habent: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & bent, sed valido odore: eoq; argumẽto, quòd digitis friata nõ λιπαρά ad minima vsq; frusta resoluitur. Nec desunt qui videtur le- acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exic gisse.

care, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binũ cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat vt minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medet

medetur, & disrumpita puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam et sanguinis eruptiones sistit. pterygia ad cicatricem ducit, luores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginēsq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: consillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorū medicamentis torretur, in munda & candenti testā. pennaq; subinde versatur, vt possit equaliter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absinthium.

CAP. XXIII.

Absinthium, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstātius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & vètri inhaesit: urinā cit, & crapulam præsumptū arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cū seseli & nardo gallico potū: fastidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutū, aut decoctū ius, quotidie tribus cyathis haustū: menses cit potū, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, et draconi marino.

P

Angina eo cū melle & nitro perunguntur, & epinyclides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caliginēs ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitu compeſcit. Decoctū in paſſo dolentibus oculis oblinitur: item prae cordiſ & iocineri, tritum cū cera to cyprino: ſtomacho quoq; longa valetudine laboranti, cum roſaceo: cum ſicis autē, aceto & loliacea farina, aquae inter cutem lienofiſq; ſubuenit. Vinū ex eo fit, quod abſinthiten vocant, praefertim in Propontide & Thracia, quo ad antē dicta vtuntur, cū febrī carent: alioquin in aſtate propinant. & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In parſum arſis abſinthium, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtimatur liquamentum eoſdem praeftare effectus. At tamen potionibus improbatur, quoniam ſtomachū malè habet, & capitiſ ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum abſinthium. C A P. XXIII.

ABſinthium marinum, quod aliqui ſeriphum vocant, copioſiſſimum in Tauro monte: iuxta Cappadociam & in Taphoriſi Aegypti gigni-
 * Abroto- tur: quo Iſiaſi pro oliuae ramo vtuntur. Herba eſt
 nū marem tenui, * abrotoni parui ſimilitudine, referta mi-
 intellige. nutulis ſeminibus, ſubamara ſtomacho inimica,
 Ea

Ea graviter olet, & cum quadam calfactione adstringit: per se aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem præstare potest. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non admodum semini fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum. CAP. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quædam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incis: floribus referta est: comatibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodit, suauiter olet, cum gravitate quadam & amaro gustu: id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmenosum, gracilibus ramulis uti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruentum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinae angustiis, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroribus ex oleo illinitur: serpentes et substratu & nidore fugat: contra ichus eorum cum vino potum prodest, pri-

natim efficax contra scorpionum & phalangiorum
venena: oculorum inflammationibus commode il-
linitur, cum cotoneo cocto, aut pane: tritum cum fa-
rina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: iri-
ni compositionibus admiscetur.

Hyssopum.

CAP. XXVI.

HYSSOPUM, herba nulli non cognita, duum gene-
rum est, montanum & hortense. Optimum est
Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi: de-
coctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; pe-
ripneumoniacis, diuturnae tussi, suspiriosis, destilla-
tionibus, & orthopnoicis auxiliatur: lineas enecat.
Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum hu-
morem per alium extrahit, decoctum ex aceto mulso
epotum & ad subducendam aluum cum ficis viridibus
detritis manditur, vehementiusq; addita iri, carda-
momo, aut irione, deycit: colorem in corpore fouet:
lieni, & aquae inter cutem, cum fico nitroq; infla-
mationibus quoq; ex vino illinitur: cum feruente
aqua impositum. sugillata discutit: cum decocto fico-
rum, optime anginis gargariatur. Decoctum cum
aceto, dentium dolorem in collutione sedat: inflatio-
tiones auricularum vaporis suffitu discutit.

Officinis

Stæchas.

CAP. XXVII.

Stichas A-
rabica.

STACHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem no-
minis è regione Massiliae gignitur, unde co-
gnomen accepit. Herba tenuibus surculis, coma
thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquan-
tum.

LIBER TERTIVS. 238

tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pe-
toris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera
omnia & vniuersum animantis habitum exte-
nuat, ab obstructionibus & saretu liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod et cunila vo-
cant, folium habet hyssopo nō dissimile: im-
bellam autē non in rotæ speciem orbiculatam, sed
veluti multifidam. semine in summis virgis hand-
quaquā denso. Excalfacit: vnde decoctum cum vi-
no potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam
aut meconion hauserunt, ex passō: si gysium aut
pheimeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, con-
uulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Aridum ace-
abuli mensura potiū in aqua mulsa, atros humores
per aluum extrahit: menses ciet, & iusti cum melle
mētum medetur: ad pruriginem, psoriasis, regiumq;
norbū, decocti us in balneis prodest. Succus viren-
is tonsillas, ruam, & oris vlcera sanat, & per na-
res, ex oleo irino infusum, trahit: aurium dolores
um lacte mulcet. Cōficitur ex eo, & cepis, et rhois
rutice quo ad olsonia vtuntur, vomitorium men-
dicamentis, his omnibus in cupreo vase per dies his
vicenos insolatis, dū caniculæ sydus flagrat. Her-
acle autem substratu serpētes fugantur. Quæ onitis
pellatur, candidiore est folio, et hyssopo similior.
emen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei
rigani Heraclei, sed multo inefficacior. Syluestre

origanum, aliqui panaces Heracion, alij cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliantur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

TRagoriganum tenuis frutex est, syluestri serpillio aut origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis latius virentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prassium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia excalfaciunt, urinam cient, aluo accommodantur, decocto potu bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venena in vino bibuntur, menses trahunt: peripneumonicis tuſſientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ruſtanti, imbecilloq; traditur. Item si à maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur: tumores verò cum polenta illita discutiunt.

Pulegium. CAP. XXX.

Pulegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: mēstrua, secundas ac partus eicit: pulmonis vitia ex melle & aloë po-

tura

tum extrahit, & cōuulsis auxiliatur: nauſeas ſto-
machiq; intercisiones, ex poſca permulcet: atran-
bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtiliſſimē
contra ſerpentiū morſus. Deſectos animo recreat,
cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti ci-
nere corroborat, illitū cum polenta inflammatio-
nes omneis ſedat, podagris per ſe ſubuenit, impoſitiſ
uſque dum rubeſcat locus: cum c. crato varos ex-
tinguit, lienosis cum ſale vtiliter illinitur: decoctū
eius ablutas prurignes mitigat, conuerſas vuluas
corrigit, contra inflationes duriciasq; vulua, in de-
ſeſiones conuenienter adiicitur. Vocant aliqui ble-
chona, quoniam dum floret, guſtatum à pecoribus,
balatum concitat.

Dictamnū. CAP. XXXI.

Dictamnū, aliquibus ſylueſtre pulegiū vo- Græcus,
catur. Cretenſis herba eſt, acris, lauis, pulegio Dictamnū:
ſimilis, ſed maioribus folijs, quæ tomēto quodā ſpiſ- ac ſi euam
ſaq; lanugine pubeſcunt. Florem nullū aut ſemē pro Plinius.
fert. Præſtat omnia quæ ſatiuum pulegium, ſed effi-
caciū multo: nam nō potum modō, ſed appoſitum
quoq; aut ſuffitum, d. functos partus eicit. Produūt
in creta capras ſagittis percuffas, huius herbe pa-
ſtu, eas excutere. Purgandi vim habet ſuccus illi-
tus, aut cum polenta tritus. Herba in paſtos pe-
dibus reliquōve corpori aculeos, illitu reſigit. Ad liē-
nis dolorē efficax habet: ſiquidē ipſum immittit.
Metūt æſtate & autumno. Radix eius guſtu cal-

facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta herbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu sauiant, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis morsibus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, ante dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. Defertur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrium, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus quae aduersus serpentium iniurias consinguntur, theriaca vocant.

Saluia.

CAP. XXXII.

Salvia siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, et canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium scabritie referant, hirsuta, suballida, perquam iucundo odore, sed graui: semine summis in caulibus sylvestri homino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit et urinas, decoctum foliorum ramorumque potus, & partus extrahit, et pestinacia marinae ictibus auxiliatur. Capillos demigrat, vulnerum sanguinem cohibet, tetra
vks

ulcera purgat: testium pruritus sedant rami fo-
liaq; si * decocto eorum foveantur.

Mentha.

CAP. XXXIII.

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, ad- * οὐρ ἰνϛ
stringendi, atq; exiccandi vim habet. Sistit
anguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre tere
es enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones,
holerasq; sedant terni ramuli cū acidi granati suc-
co poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illina-
tur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. mam-
mas, si tendantur, aut lacte turgeant, cōpescit: cum
ale canum morsibus illinitur: aurium doloribus cū
aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota,
conceptioni resistit: lingua scabritiem conficta læ-
uigat: coire lac, densariq; in caseum non patitur, si
folia potionibus lactis immergantur. In summa,
tomacho utilis est, & in condimentis peculiarem
gratiam habet. Siluest'ris mentha, Latini mentha Mentha-
trum vocant, hirsutior est folio, & prorsus ma-
iorem, quàm sisymbri, odore magis viroso: quare mi-
nus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha.

CAP. XXXIII.

Ex calaminthe generibus quedam montibus Calamen-
familiaris, folia ocimi habens, incana, sur- tum offici-
culos, & caules angulosos, purpureum florem. narum.
Altera pulegio similis est, sed maior: quam syl-
vestre pulegiū ideo appellantur, quod odore ipsum
emulatur: ne petam Latini vocitant. Tertia men- Nepeta.

P 5

thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impensè feruētia, et acria: radix superuacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpēte opitulatur. Decoctum potu menses, & vrinas expellit: ruptis, conuulsis: orthopnoeā, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: praesumpta in vino venenis resistit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale et melle pota, enecat: nec secus cocta crudāve, si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum.

CAP. XXXV.

Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpurascente refertis. Gracili solo, & petroso provenit. Vim habent hanc, vt cum sale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti us prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit:

vrij

inas ciet: cū melle in eclegmate, faules facit ex-
 eationes: recentes tumores discutit, cū aceto illitū:
 cretū sanguinem dissolvit: verrucas thymi colorē
 addentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, &
 olenta impostum subuenit: hebetibus oculis in ci-
 prodest. Perquā vtile pro condimento, dunta-
 at ad vsus eorum, qui rectē valent.

A N N O T A T I O.

Herba, quā Medici pro Satureia hodie
 surpāt, byssopi folio, thymū magnitu-
 dine lōgē exuperat, vt nō esse genuinā,
 c hic descriptā, satis eius historia cōuin-
 at.

Satureia. CAP. XXXVI.

Satureia trivialis notitia est: gignitur in aspe-
 ris locis, & tenui solo, thymo similis, minor ta-
 nē, et tenerior: defert spicā florū plenā, coloris her-
 acei. Eadē potest quæ thymū, si modo cōsimili sum-
 titetur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam
 utina, sylvestri prorsus minor, quæ propter mitio-
 rem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Serpillum. CAP. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortense odo-
 resampsuchum imitatur, atque in coronas ad-
 li solet, cui à serpendo nomen inditum est: quo-
 uam si quæ eius particula terram attingat, inibi
 radices demittet. Folia & ramulos origani habet,
 sed candidiores: in maceris multo procerius as-
 urgit. Sylvestre, xygis appellatum, non serpit,
 sed

32a Thymbr

sed in alitudinem increfcit, ramulos ædens tenuet, furculosos, folijs refertos longioribus quàm ruta, & durioribus, anguftis: flores iucundè olent, guftanti acres: radicis nullus vſus. Nafcitur in petris, fatiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi vſum aptius. Menſes trahit, vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulſis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur: & aduerſus ſerpentes potu illituve: capitis dolores mulcet coctum, adiecto roſaceo, & madefactū in aceto: maximè verò phreniticis, & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus ſedat ſuccus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. CAP. XXXVIII.

Sampsuchum in Cypro, & CyZiceno laudatiſſimum: ſecundū ſibi locū vëdicauit Aegyptium. Amara cū gens Sicula, & CyZicena appellat. Herba eſt ramoſa, per terrā repens, folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio conſtat, hirsutis, & rotundis: ſuauiſſimum odorem ſpirat, ideo coronis inferitur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, ſugillata tollunt: menſes ſubdita in peſſo trahunt: contra ſcorpionis icſtum ex aceto & ſale illinuntur: luxatis tumoribusq; , cerato excepta imponuntur: aduerſus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodeſt. Acopis malagmatisq; , calfaciendi gratia commiſcetur.

Mel

Melilotos, siue fertula Campana.

CAP. XXXIX.

Fertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, et Chalcedone nata: cuius color vicinus croco, boni odoris. Nas citur & in Capana circa Nola, colore in luteū languescēte, odore infirmo. Vim habet adstrictoria: inflammationē omnē tollit, praesertim, quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passō cocta illinatur: interdū etiam addito oui luteo assato, aut fixnigraci farinā, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, tybōve. Recentes meliceridas per se cum aqua, et cetera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, cocta cum aliquo ex antiē dictis lenat, doloribus riu mitigandis cruda ex passō instillatur: in auro aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum.

CAP. XL.

Marum herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, folijs multo candidioribus, floribus odoraticis. Vim habet sisymbrio consimilem. Constringit enim, & modicè calfacit: quae de cautellitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illi res additur. Iuxta Magnesium, & Tralleis consissima gignitur.

Acinos.

CAP. XLI.

Acinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata,

rata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur à nullo
nullis olitoribus colitur. Menses et aluum pota
stilit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis.

CAP. XLII.

ῥυῶδης,
i. odorata.

Baccharis herba* fruticosa, quæ in coronas ad
ditur: cuius folia aspera sunt, media violæ &
verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti al
titudinem petens, aliquantulum asper, non sine appen
dicibus adnatis: flore purpureo, suballicante, odor
to: radicibus veratro nigro similibus, quibus odo
r inest cinnamomo proximus. Asperum squalidum
solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsi
ex alto precipitatis, spirandi difficultati, salutari.
Item diuturnæ tussi, & urinae difficili: menses pe
llit: contra serpentium morsus utilissimè datur i
vino. Recens radix apposita partu extrahit: puer
peris eius decoctum in defensionibus prodest: in dia
pasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia.
Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus i
litu prosunt: oculorum inflammationibus, mam
tumentibus à partu, egilopis incipientibus, igni
busq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

CAP. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa, & hortu
si acrior est, & in cibis damnata: sativa
rò quæ sub sicu arbore enascitur, magis in cibi
admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat: ur
nam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibo

talium medicamentorum antidotum est, si semen
 x vino, acetabuli mensura, ebihatur. Folia per se
 rasumpta, aut cum nuce iuglāde, aridisq; ficis, in-
 ficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes
 mili modo sumere convenit: geniturā cibo potūve
 extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat.
 acit ad pectoris laterumq; dolores, difficultatem
 urandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendi-
 um articulorumq; cruciatus, & horrores febriū
 recutu repetentes, pota ut antè dictum est. Item
 d inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini, cū oleo
 decocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatu li-
 erat, si à genitali, sedētenuis cum melle subiciatur.
 eruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit:
 rticularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem
 m ficiis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, de-
 cta in vino ad dimidias parteis, & oblita. Cru-
 i conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores ocu-
 rum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cū
 saceo, & aceto illita auxiliatur, profluentem na-
 bus sanguinem sistit trita & indita, testium in-
 mationibus cum laureis folijs imposita, & eru-
 ionibus papularum cum myrto, & cerato pro-
 ft. Cum pipere autem vino, & nitro affricta, al-
 e vitiligini medetur. Cum eisdem illita fornuca-
 mes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræ-
 ntant: contra impetigines cum alumine, & melle
 ulissimè imponitur. Succus in mali punici caly-
 ce

ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinē oculi qui sensere, ruta cū fœniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite manāt, cum aceto, rosa-
teo, & cerusa persanat: mansa, alliorū ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, inter-
terficit. Dura florem promit, & ad murias colligi-
tur: cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum
pruritu ac vehementi inflāmatione. Oportet itaq;
eam vinctis antea manibus, & facie colligere. Tra-
dunt succum gallinaceis pullis insparsum feles ar-
cere. Adiciūt eam quæ in Macedonia circa Haliac-
mon amnem prodeat, comedentes interimere. Mon-
tosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius po-
tum contra intestina vitia efficax est: in antidota
commode additur: contra incontinentiam vrina-
tosum, semen septenis diebus potui datur. Radix
huius montanum moly vocatur. Syluestris ruta so-
tius similis est. Prodest comitialibus, & coxendicis
doloribus: mēstrua mouet, partus enecat. Acris
est viribus, quā hortēsis, & validior. Syluestris,
vt pote noxia, cilis abdicatur.

Syluestris ruta.

CAP. XLIIII.

Vocant etiamnum syluestrem rutam, quæ
in Cappadocia, & Galatia Asia finitima
moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice mul-
tos emittit cauliculos: folijs multò, quā alterius
ruta longioribus, tenerioribusq; odore graui: flo-

e candido: capitulis in cacumine paulo maioribus
uam sativæ rutæ, quæ tribus maximè partibus
istat: in quibus triangulū semen, subrufum, gustu
marū recluditur, cuius est vsus. Semen autumnō
naturefcit: quod cū melle, vino, croco, & fœniculi
acco, ac gallinaceo felle, teritur cōtra retusam ocu-
rum aciē. Sunt qui eam harmalā vocent, Syri be-
san. Qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam
uandā cum moly seruet similitudinem: radice ni-
ra, flore cādido. In collibus, & lato solo provenit.

Moly.

CAP. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, lumi-
sparsa: florem albæ violæ similem, sed mi-
orem, ac magnitudine violæ purpureæ responderi-
m, lactei coloris: caulem candidum, quaternūm
hitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod
lū speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ
irum in modū valet ad aperiendas vulvas si tri-
cum irino vnguento, in pessa subiiciatur.

Panaces.

CAP. XLVI.

Panaces nonnullis heracleum dicitur: ex quo
opopanax colligi solet. Plurimum in Bœotia,
in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compen-
, & quæstus, qui ex eo liquore factitatur, gra-
studiose colitur. Folys est asperis, in terra ia-
ntibus, herbaceis coloris, multum ad ficulnea ac-
lentibus, in ambitu quinq; partitō diuisis: cau-
ut ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam in-

Q

canescit, folijs etiam minutionibus obsitus, musta-
 rjs, cen anethi, in cacumine: flore luteo, & semine
 odorato: feruenteq;: radices habet multas ab origine
 una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & sub-
 amari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Ma-
 cedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti cas-
 lium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui
 siccatus, in summa cute croceum colorem cōtrahit.
 Effluentem autem succum excipiunt, folijs excaua-
 to solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo
 caule mssibus inciso, profluentem succum exi-
 munt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, disten-
 tæq;: sicca, quæ cariem non sentiant, aromatica,
 feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo ido-
 neus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario
 alhorrit. Maxime in hoc succi genere probatur,
 quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus,
 foris ad croci colorem inclinans, levis, pinguis,
 friabilis, tener, statim in aqua eliquesceus, graui
 odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur
 ammoniaco aut cera: sed sinceri experimentum
 est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lacte-
 scat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus fe-
 brum circuitibusq;: vulsis, ruptis, laterum dolori,
 torminibus, stillicidio vrinae conuenit. Contra ve-
 sicæ scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur: men-
 ses trahit, fixum enecat, inflationes quæ vulnam
 malè habent, duritiasq;: ex melle dilutus, discu-
 tit.

it: i schiadicis illinitur, ac opis & capitis medicami-
 bus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis
 um vna passa illitus subuenit: dolore dentium li-
 erat, canis inditus: oculorum aciem illius excitat.
 ex eo & pice optimum si emplastrum contra be-
 liarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix
 in ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extra-
 it: ad vetera vlcera efficax est, nudata ossa corpo-
 re operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum
 bsinthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia,
 rodest aduersus animalia quæ venenum ei acclan-
 u, & cōtra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepij. CAP. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuem,
 cubitalem, geniculatum, circa quem folia fœni-
 uli funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq; o-
 rata: in cacumine umbella, vbi flores emicant
 urei, odorati & acris gustus: radix parua est &
 inuis. Auxiliarem vim habent flores & semina,
 intra vlcera, phagedænis, & tubercula, si trita
 cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vino
 abuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces
 luestre origanum vocant, alij cumilam, de qua in
 origani mentione diximus.

Panaces chironium. CAP. XLVIII.

Panaces Chironium in Pelio monte maxi-
 me prouenit: folium eius amaraco simile:
 os aureus: radix parua, quæ non aliè demitti-

tur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

Ligusticum. CAP. XLIX.

Galeno Lib.
bysticum.

Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces vocant, plurimū in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino: unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant: quoniam & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdē præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè verò iuxta fluentia. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenue, & in circuitu folia sertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semē dependet nigrum, solidum & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisq; vis excelsa & floria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tumores, cōcoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & contra serpentium ictus: vrinas & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur: ori perquàm vtile: quare pro pipere vtuntur eo indigenæ, ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod faciliè gustu discernitur: amarum enim est. Alij semē fœniculi aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pastin

Pastinaca.

CAP. L.

Pastinaca sylvestris folia gingidi habet, latiora, subamara: caulem rectū, scabrum: umbellā imilem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceum accedente: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua movet. Ijs conuenit in potione, quos vrinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua curam subit: serpentium moribus ictibusq; prodest: praesumentes id nulla affici iniuria à serpentibus raduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pelit, venerem stimulat, partus apposita eicit. Folia rita, & cum melle imposita: phagedenas vlcera murgant. Satiuā ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli.

CAP. LI.

Seseli Massiliense folia faxniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum: degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix ex calsfaciendi vim habent: potu stranguriae & orthopnoe medentur, suffocationibus mulierum conitualibusq; prosunt, menses & partus trahūt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanāt. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina di-
cutit: epialis febris utile, & contra perfrictiones

Recentioribus Siler montanū.

in itineribus, cum pipere & vino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos factus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponnesense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus præditum est: nascitur in asperis, riguis & collibus, inuenitur & in in sulis.

* ἐν Ἰδῆ, id est, in Ida mōte.

Creticum Seseli.

CAP. LII.

Tordylium, quod aliqui Creticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amanio monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinæ difficultatem bibitur, potu cit mensēs. Succo seminis caulisq; virentis, ternis obolis ex passō decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciēdas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Sison.

CAP. LIII.

Hic omīsa est ab iuterp̄te descriptio.

Sison exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Cōtra lienis vitia bibitur, vrinæ difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Quo in condimentis, cum

CHCUT

incurbita, & aceto, indigena vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LIIII.

ANisum in summa excalfacit, exiccat: oris halitum iucundiores facit, doloris leuamentum præstat, urinam ciet, aquam quæ subit cutem dissipat, potum sitim cohibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba feminarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non surfurosum, odore præstans. Inter prima laudatissimum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. CAP. LV.

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, urinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinaca modo manditur.

Anethum. CAP. LVI.

Anethi coma seminisq; decoctum, potum lac euocat, inflationes & tormina sedat, aluum vomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorum aciem hebetat & genituram restringit. σπέρμα σπέρμα
σπίδης potum. Facinoris vuluæ malo opportunis, καίη καίη
ad defecationes vtile. * condylomata illitus eius ci- καταπλα-
us tollit. σπέρμα.

Cuminum satium. CAP. LVII.

Cuminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excal facit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum rua passa, aut lolij farina caratove. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profuua sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

Sylvestre cuminum. CAP. LVIII.

Sylvestre cuminū, plurimum efficaciusq; in Lycia & Galatia Asia, atq; Carthagine Hispania gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti serotius Mar ratis, & gingulij diuisura. In cacumine capitula cellus, Ga quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus latia Asia. est semen acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq;: item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat: stomacho vtile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle & rua passa illinatur: testium inflammationibus.

LIBER TERTIVS.

255

nibus, adiectis eiſdem illitū medetur. Eſt & aliud ſylueſtris cumini genus, ſatiuo non diſſimile, quod a ſingulis floribus promit cornicula in ſublime exerta, in quibus ſemen eſt melanthio ſimile: quod potum omnium ſerpentiū morſibus præſidio eſt. Calculoſis & ijs qui vrinæ ſtillicidio vexantur, aut concretum ſanguinem cum lotio reddunt, auxiliaur: ſed apud ſemen feruefactū poſtea bibendum eſt.

Ammi.

CAP. LIX.

Ammi & Aethiopicum cuminiū appellant. & plerique hoc natura diuerſum eſſe ab illo exiſtimant. Vulgò notum eſt: ſemen exile, multò minus cumino, origanum & reſiciens. Eligendum eſt purum, minimè ſurfuſum. Vis ei excaſfactoria, feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrinæ difficultatem, ſerpentium iectus, cum vino potū: menſtrua uiet. Miſcetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria vocant: vt inde exortis vrinæ difficultatibus reſiſtat. Sugillata cum melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitio cum vna paſſa aut reſina, vuluas purgat.

Coriandrum

CAP. LX

Coriandrum aut corianum vulgaris eſt notitia, vim refrigeratoriā habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus ſacris, & vlceribus quæ ſerpunt, medetur: epinyctidas cum melle vel vna paſſa, teſtium inflammationes, carbunculosq; ſanat: cum ſaba freſa, ſtrumas & tubercula

Q 5

ὀλίγοι. discutit: tineas interaneorum expellit & semen cum passo potum, & geniturā adauget. largius autem sumptū, mentem nō sine periculo mouet: quare continuo, & copioso usu abstinēdū. Succus cū cerussa, spumave argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardētes summæ cutis inflammationes emēdat.

Hieracium.

CAP. LXI.

Hieracium magnum, caulem emittit asperū, subrubrū, spinosum, cauum: folia ex internodiis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitū: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitū, stomacho æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpiōe ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex internodiis diuisa per ambitum cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicāt. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ.] Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in me iudicū, sensu, κεφάλια μικρωνίων παρεμφερῆ id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autem locus ex Theophrasto ac Plinio, qui Oreoselinon cicutæ folio describant, hoc modo posse restitui: φύλλα καυρίω παρεμφερῆ, id est, folia cicutæ non absi

abſimilia : quod cum alijs ſatis aptè co-
hæret. Velim tamen in hac, re vt & alijs
omnibus, ſuo quenque vti iudicio.

Apium.

CAP. LXII.

Hortenſis apis herba ad eadem ad quæ coria Noſtrū Pe-
num conuenit inflammationibus oculorum, troſelinū,
cum pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtoma- vt colligi-
chum mulcet: mammarum duritiā ex lacte con- tur ex no-
creto contractam reprimi: vrinā ciet, ſiue crudū, tis Plinij.
ſiue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potū,
venenorum noxa reſiſtit, quum vomitiones exci-
tet: aluum colibet. Semen vehementius vrinam pel-
lit: contra ſerpentium venena, aut epot. in argenti
ſpumam auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſce-
tur medicamentis quæ dolorum leuamenta præ-
ſtant: theriacis quæque, ac tuſſis remedijs. * Eleoſe- * Apiū offe-
linum in humidis naſcitur, ſatino grandius, & ad cinarum.
eadem efficax. Oreofelinum, caule eſt dodrantem
alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum
ramuli, * & capitula cicutæ, multo tamen tenuio-
ra: ſemine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui:
naſcitur in petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſe-
mine ac radice in vino potis: menſes trahit. Anti-
dotis, necnon medicamentis vrinam cientibus, &
excalfactorijs, inferitur. Nec hallucinari nos oportet,
exiſtimantes oreofelinum eſſe, quod in ſaxis
prouenit: aliud enim eſt petroſelinum. Petroſeli-
um

num in Macedonia provenit, in præruptis locis, semine ammū, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renū, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis vrinam cientibus. Hippofelinum, * Latini Smyrneū. olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quamvis a de quo se- liud sit, quod propriè smyrnion dicitur, ut paulò quēti cap. post referemus. Est autē maius & satiuo apio can Romanis didius: caule alto, cauo, molli, habente veluti lineas: sic dictum folijs latioribus, in puniceum vergentibus: coma ro fuisse, li. 2. ris marini, florum plena, dependentibus in cacumi- de Alim. fa ne corymbis, antè quàm deflorescat: ea semine tur- cul. tradit. get nigro, oblongo, acri, solido, aromatico, radix di- mittitur odorata, candida nec crassa, quæ os com- mendat. In umbrosis & palustribus enascitur. ole- rum generis, ut apium. Radix cruda coctave estur. Folia cū caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiun- tur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso vino mēses creat: argentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdē pr. stat effectus.

Smyrnium. CAP. LXIII.

Smyrnion, quod in Cilicia petroselinum vo- cant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones multos: folia la- tiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda,
color

colore in luteum languescente: capitibus caulium
 orbiculatis, ut anethi: semine brassica, rotundo, ni-
 gro, sapore aspero, sicut myrrha, ita ut alterum
 ulterius loco cadat: radix quoque odorata, gustu
 acris, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris
 ruger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in sa-
 cosis, & collibus, atq; squalidis, & limitibus terre-
 nis. Vis radices, herbae, & seminis excalfacere. Fo-
 lys muria maceratis ad obsonia utuntur, aluum
 laxant, radicem contra serpentium ictus habere con-
 venit, tussis & orthopnoeas mitigat, urinae difficul-
 tati medetur: recentes tumores, collectiones, duri-
 tiesq; discutit, illita, & vulnera ad cicatricem per-
 lucit: partus abortu vitiat, si feruefacta subijcia-
 tur. Semen, lienis, renum & vesicae vitijs prodest:
 nenses & secundas pellit: commodè datur ischiadi-
 cis in vino, inflationes stomachi lenit, sudores ciet,
 & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu,
 & contra febrium circuitus.

Elaphoboscum. CAP. LXIII.

Elaphobosco foeniculaceus caulis est, aut rori-
 marino similis, geniculatus: folijs duum digi-
 torum latitudine, ut terebinthi, praelongis, aliquan-
 tum asperis, circumfractis: adnata multa habet,
 similitudine umbellae antehi similes, & semina eius-
 dem: florem subluteum: radice ternum digitorum
 longitudinis, & crassitudinis unius, candida, dul-
 cis, sui apta. Caulis tener pro olere manditur. Con-

*Intellige
 non coror-
 naria ros.
 marinum:
 sed eam, quae
 simplici-
 ter hoc no-
 mine ap-
 pellatur. de
 qua cap.
 lxx. huius
 libri,

tra

tra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama
autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus
resistere.

Fœniculum.

CAP. LXV.

FOeniculum si herba edatur, aut semen cū ptisa
na bibatur, mammas lacte replet. Comæ deco
ctum in renum doloribus subditum proficit, quippe
quod urina excitet: cōtra serpentium ictus in vino
conueniēter bibitur: menses ciet, in febribus nauseā
& stomachi feruorem, ex aqua frigida potum se
dat. Contrite radices & cū melle illitæ, moribus
canum medentur. Succus caule & folijs exprimi
tur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur,
quæ ad excitandā oculorum aciem cōmodè tempe
rantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam
semine viridi, ramulisq; & radicibus prima ger
minatione incisus. In Iberia quæ ad occidentem spe
ctat, succum reddit gummi similē. Caulem mediū,
dum herba floret rustici demetūt, igniq; admouēt,
quò facilius vi coloris exuclans, gummi remittat:
quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippoma
rathrum. CAP. LXVI.

Est & syluestre fœniculum, magnum: fere
autem semen cachry. simile, cuius radix in
cundē olet, potaq; stranguriæ medetur: menses im
posita ciet: ventrem sistit, radice aut semine poto,
& contra serpentium morsus auxiliatur, calcu
losq;

losq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
tis abundantiam facit decoctum foliorum trau-
tum, & foeminas a partu purgat. Traditur aliud
hippomarathri genus, longo, exili, & angusto fo-
lio: semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum.

CAP. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum
folijs fœniculo simile, minoribus & tenuio-
ribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore al-
bo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris
in mandendo: radix digitali crassitudine & do-
drantis longitudine adolefcit: in saxosis nascitur, &
locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri apio
simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gu-
tus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur
genus folijs coriandri, floribus albis, capite & se-
mine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo,
vel cumini, acri. Omnium semen excalfacit: potum
urinam, menses, & partus extrahit, torminibus
liberat, veterem tussim mitigat: phalagiorum mor-
bis potum in vino auxiliatur: tumores illitu di-
cutit. Seminis duntaxat in alijs generibus inualuit
usus: in Cretico, etiam radice, quæ maximè cōtra
venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Delphinium. CAP. LXVIII.

DELPHINIUM, furculos emittit à radice vna
sesq;

sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant: vnde tractum nomen est. Flos violæ albæ non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alium est delphinium, quod Romani hucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum.

CAP. LXIX.

Pyrethrum Romani saluaream vocant, folia caulemque; emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellamque; anethi, circinata rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit: idè in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horribilis efficax est & contra perfrictiones membrorum, resolutionesque; eximie conducit.

Rosmarinus.

CAP. LXX.

Canchrys.

anacardis

Dvo rosmarini genera: vnum fecundum frugiferumque; , cuius semen canchrys vocatur: folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, incundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concaviis alis:

in

in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, cæ-
 ludum, sphondylo simile, rotundū, angulosum, acre,
 resinaceum, quod in mandendo linguā exurit: ra-
 dix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alte-
 rum omninò cōsimile, semen ferens latum, nigrum
 uti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radi-
 ce foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id
 quod sterile dicitur, illorū planè similitudinem re-
 fert: sed neq; caulem, neq; florem, neque semen pro-
 mit. Nasctur in saxosis & asperis. Trita omnium
 herba cōmuniter hæmorrhoidū profluvia sistit,
 sedis inflammationes & condylomata mitigat,
 concoquit strumas & abscessus, qui ad maturatio-
 nem agrè perducuntur. Sicca radices cum melle vl-
 cera purgant: torminibus medentur cum vino po-
 ta, & contra serpentium morsus conueniunt: men-
 ses et vrinas cient, veteres tumores illitu discutiunt.
 Tam radicis quàm herba succus, adiecto melle illi-
 tus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadē
 pollet: si comitiale malum sentiatur, aut vetus pe-
 ctoris vitium, auxilio est: regio morbo laboranti-
 bus cum vino & pipere datur: sudores mouet, cum
 oleo perunctum: ruptis & conuulsis prodest: po-
 dagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illini-
 tur: purgat vitilignes, addito aceto quàm acerr-
 mo. Semine in potionibus vtendū, eius quidā quod
 Canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia
 arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-

R

sci, folijs lactuce syluestris amara asperioribus, candidioribusq; radice breui, Thxophrastus auctor est: potuq; idipsum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi: quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

Rosmarinum quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, * Commo * graui odore. Excalfactoria vt præditum est: redius Mar gium sanat morbum, si decoctū in aqua, ante excellus, cum citationes bibatur: & vbi laborans exercitationi grauitate se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. odorata. Acopis, gleucinoq; vnguento admisceri solet.

Sphondylium. CAP. LXXII.

Sphondylium folia quadātenus platani & spanacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius asurgētes, in quorū cacumine semen duplex: seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceū, grauis odoris: flores eius albi, aut pallētes: radice raphani, cādida. nascitur in palustribus et aquosis. Potū semen pituitā per aluū extrahit: medetur iocineris vitis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarū stragulationi. Veteranos suffitu renocat: cū oleo cōmodè infunditur caput

atibus phreniticorum, & lethargicorum, item catitis doloribus: cum ruta illitum, serpentina vlcera colibet. Datur radix contra regium morbum, & ocineris vitia: circumrassa eadem & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

CAP. LXXIII.

E Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationesq; , celiacosq; , & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur: sudores ciet,uncto ex oleo corpore. Caulex, si edantur, capitis dolores faciunt: mu-
 ria condiuntur. * Ferula itaq; caulem profert ter-
 minum saepe cubitorum: folia feniculi, longè aspe-
 riora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata saga co, ac anti-
 penum efficitur.

* Desunt

in codice

nostro gra-

co, ac anti-

quissimis

Peucedanum.

CAP. LXXIIII. quibusq; ,

P Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, feniculo similem: comam ha-
 bet statim ab terra copiosam, spissamq; : flore
 luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gi-
 gnitur in montibus opacis. Tenera radix cultel-
 lo conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ
 mandatur: in sole siquidem confestim euanescit.

Colligitur capite prius & naribus rosaceo per-
 fusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-

R 2

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicut è mādri gora: verum inefficacior succo lacryma habetur, et velocius expirat. Interdum etiā concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitijs neruorum, ex oleo et aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi reuocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium induratum, mitigat dolore: contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspirijsq;, & torminibus, et inflammationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas osium extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

* Herba doctis omnibus pro Melanthio recepta, folijs fœniculū poti⁹ quàm senecionem videtur imitari, vt certè eorum hunc esse aut depravatū, aut verum ignorari melanthion, sic suspicandum.

Gith, seu Melanthium. CAP. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dorantes excedens: folijs * vt senecionis minus, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, inter cursantibus utus membranis: quibus semen includitur nigrū, cre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex trino, & infusum varibus: tollit lepras, lēigines, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & teda, prodest: tetes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in mteco, & olfactum: vrinā & mēstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatē pirandi cum vino potum leuat: phalangiorū moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, et Libya nascitur, caule ferulaceo, quæ massetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix excoctis, in cibis agrè concoquitur, vesicæ noxiæ: singillatim illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cæcerato, modetur: ischiadicis convenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decoctis. Ha: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut salu permittit. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhe æmulum, non porraceum, odore valens, suavi gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, autè ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam sicefeat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod malefactum præbenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Cautem aliqui sulphuron, radicem magularin, & foli massetum vocare. Efficacissimum laser, max folia, postremò caulis. Acrem vinum habet, inflationem facit: perunctis cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorū aciem exacuit, & incipientes suffusiones, alium cum melle, dissipat: cancris de-

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabie effrata momorderit, vliueribus immissum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quae virus ei aculantur, potum aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur: gangraenis praecoerctis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos colosq; prius circumrasos vellit: cerato aut aridorum ficium carne praemollitum, recentes lichenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut aerugine illinatur: extubertantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoq; irruentem vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vuam illitum cum melle reprimis: anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur: vescentes latiore colore mangoniatur: tussi commodè in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere denorandum: haerentes gulae hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha potum: caeliacos adiuuat, in acino vna sumptum.

cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsi-
ruptisq; prodest: ad potiones resoluitur, nucibus
amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo
ad eadem proficitur, sed multò inefficacius: cum ac-
eto mulso manditur, ad expediendam arteriam, ma-
ximè cum vox retunditur: eo cum lactucis vtun-
tur, exitq; in vicem erucæ. Fertur & altera magu-
daris in Libya nasci, radix laserpitio similis, se-
minus crassa, acris & fungosa, ex qua nō profluit
succus. eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in
Media nascitur. Optimum est translucēs, fuluo
forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter
laser, & galbanū redolēs, gustu acri. Prodest late-
rū, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, cōuulsis,
& ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat.
Datur comitialibus, opisthionici, lienosis: item cō-
tra neruorū resolutionē, perfrictiones, & febrium
circuitus in potu: in vnguentis probè admittitur: mē-
ses pellit, sed fortum exanimat, cū hydromelite po-
tum. prodest ex vino haustū, serpentium ictibus: ol-
factum ex aceto vuluarū strangulatus exsiccat, ocu-
lorum cicatrices, offusam caliginē, hebetudines, suf-
fusionesq; detergit. Resoluitur vt laser, ruta, aqua,
& amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

Euphorbium. CAP. LXXVIII.

Euphorbium Libyca arbor est, ferula spe-
ciem

ciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget: cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos in Tmolo ventres elutos, arbori circumligant, & eminuis caulem contis incidunt, cōfestimq; è plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus elaculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ventriculis concrevit, atq; vitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mīstione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustū, os accensum diu detineat, adeò vt quicquid ori obijciatur, planè euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffrisiones discutit, potus tota die exurit: quare melli collyrijsque pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potiōe haustus: squamas ossium eadem die eximit: verum eo videntes, necesse est linamētis aut ceratis communire corporibus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa ossē tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum. CAP. LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metoptum vocant. Ma-

R 5

ximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè liguosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferula, graui odore, neq; valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositum vel suffitum: lentigines aceto & nitro perunctas tollit: deuoratur adtussim veterem, difficultatem spirandi. suspiria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis, potum cum vino et myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit: imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & vulua strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur: si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat, vrina difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæve, aliàs meconio, ære vsto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum voles, in feructem aquam demittito: nanque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut area pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertoq; vase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, veluti per colum eliquescet, & liguosum in linteo remanebit.

Aq

Ammoniacum. CAP. LXXX.

Ammoniaceum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticē cum radice agasyllim vocant. Probatur bene coloratū, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phyrama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculū, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisane succo sorbeatur: cruentam vrinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus cōcalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxēdicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. CAP. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

hibet : emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium.

CAP. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati pauperis, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari : tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clianis calfaciunt indigenae, usque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

Glutinum.

CAP. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cutis delet: am bustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. vulneribus prodest: melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium.

CAP. LXXXIII.

Ichthyocolla, glutè pisciū, vèter est piscis cetacei. Praestat candidas, natione Ponticū, subasperū, minimè scabrum, et quod celerrimè liquefcit. Utile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quae cutē faciei erugāt, & extēdūt.

Viscum.

CAP. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceū,
extra

extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfurosi con-
 sperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæo fru-
 icis folio: contusum acinum lauant, & postea in
 qua decoquunt: sunt qui commanducando ipsum
 ficiant. Gignitur quoq; in malo, pyro, & plerisq;
 ljs arboribus: quinetiam inuenitur in quorūdā
 uticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit: pa-
 otidas, tubercula, cæterasq; collectiones ad matu-
 rationem perducit: cum resina autem, & cera pa-
 i, epimyctidas in splenio sanat: vetera vlcera ab-
 essusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit: lie-
 em cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, &
 npositum absumit: cum sandaracha, aut auri pig-
 mento illitum, vngues extrahit: mistum cum cal-
 e, & vini face, suam vim intendit.

Aparine. CAP. LXXXVI. Vulgò a-

Aparine ramis multis, & paruis frutificat, spargula.
 asperis, quadrangulis, per intervalla orbi-
 ulato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: se-
 nen durum, rotundum, concauum, album, vmbi-
 ci figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores
 oli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Semi-
 is, caulium, ac foliorum succus, potu contra vipe-
 arum phalangiorumq; morsus auxiliatur: infu-
 aurium dolori medetur. Herba cum axungia
 rita strumas discutit.

Alyssum. CAP. LXXXVII.
Alysson exiguus frutex est, unicaulis, sub-
 asper.

asper, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latum. in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. confusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

plin. lib. 27. cap. 8.
Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: flos ris virus graue: semē securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliatur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ mamarumq; vlcera, quæ caccæthe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq; quæ fœminæ profusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, et vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescente.

Pol

LIBER TERTIVS. 273

Polycnemum.

CAP. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origami: caule, ut pulegi, geniculis multis intercepto, ut umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis rebus, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quanto die solui debet. Ad urinae stillicidia ruptaq;, in vino bibitur.

Clinopodium.

CAP. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpilli similis, surculosus, duum dodrantū altitudine. nascitur petrosus. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti specie lecti pedū præbent. Bibitur herba & cœci eius decoctū, ad cōuulsa, rupta, Strangurias, & pentiū ictus: menses et partus pellit: et pēsiles vercas, quas acrochordonas vocāt, eicit, aliquot diebus potū. alium sistit decoctū ad tertias, potumq;, febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum.

CAP. XCII.

Leontopetalon, caulē emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punicei coloris: folia brassicæ. sed papaveris diuisura: radicles nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis et petribus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex quo pota. nec alia res celerius dolorem finit. Mithur ischiadicorum clysteribus.

Ten

Teucrium. CAP. XCIII.

*Chama-
dryos.

Teucrium, sive ut alijs placet teucriis, herba est virgæ referens effigiem, *trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiatem Cissademq; ubertim provenit. Recens cum posca, aut arida feruefactus, potu lienem potenter absument: lienosis cum aceto & ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. CAP. XCIII.

*Plin. co-
lore: quod
& ipsum
herba pul-
chrè con-
gruit.

Chamadris Græcis, alijs chamædrops: Latini Trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellant & ipsum lauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis: fruticosa, dodrantalis, folia habens exigua, amara, *effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine pragnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienis, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: citi menses partus extrahit, lienem ex aceto pota cōsumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supraddicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cū oleo illita caliginē oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. CAP. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato efficacior tamen quàm sativa habetur. Vtraq; ex
vin

vino contra animalium venena, præcipue mariorum opitulatur.

Lychnis.

CAP. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ similis, sed purpureo quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bile per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio: ictus à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositum, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium.

CAP. XCVII.

Lilia coronamenti se dedunt, Lilia à quibusdā vocata. E quibus unguentum temperatur quod aliqui lirinum, alii susinum appellant, nervos & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruescunt, ambusta proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulatur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento velustati ulcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam mollit, menses ciet, vlcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcisis, luxatisq; medetur: vitilines, furfures, & lepras emendat: vlceraq; in cute manantia expurgat: alio tergit faciem & eruat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina ritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen totum moribus serpentium aduersatur: ignibus sa-

S

Kpivov.

cris semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt
 * πορφυρὰ & * rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia
 Pamphylia, efficacissima vnguentis nascuntur.
 Ballote. CAP. XCVIII.

B Alloten, nomine alio nigrum marrubium vo-
 cant: caules edit quadrangulos, nigros, sub-
 sum feti- hirsutos, complures ex vna radice: folijs maioribus
 dum. quàm marrubij, hispidis, cingentibus per interval-
 * σπογγυλά la caulem, * subrotundis, graueolentibus, apiastrum
 τριὰ proximis: unde aliqui apiastrum eam vocauerunt:
 i. rotundio- candidi flores vniuersi vericillato ambitu caulem
 ribus. coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus,
 Plinius ni folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia,
 grioribus: ut condylomata reprimant: purgāt & sordida vl-
 quod ma- cera cum melle.

gis arridet
 Melissa of-
 ficinis.

Apiastrum. CAP. XCIX.

M Elissophyllum siue melitrena, id est, apia-
 strum, id sibi nomen usurpauit, quoniam
 apes ipsa herba delectantur, cauliculi & folia ha-
 lota, de qua paulò antè diximus, similia essent, ni-
 si maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur.
 citreum malum olent. Folia cum vino pota aut il-
 lita prosunt contra ictus phalangiorum, scorpio-
 numq;: item aduersus canis morsum. Decocto eo-
 rundem gratia, foueri prodest: de sessionibus femi-
 narum ad ciendos menses conuenit, dentes eodem in
 dolore colluuntur, dysentericis infunditur. Fungo-
 rum strangulationibus folia, addito nitro, potu au-

xi

LIBER TERTIVS. 277

xiliatur: torminibus & orthopnoicis, delinctū. Illita cum, sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marrubium. CAP. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semē in caulibus, & ex interuallis: flores verticillato ambitu, asperi. Na scitur propter adificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridū succus datur cum melle suspensiosis, tussientibus, & ad tabitudinem reductis. Crassam ē perfore pituitam, cum sicca iri eijcit. Mulieribus à partu nō purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt: vesicam renesque lēdit. Folia cum melle illinuntur sordidis vlceribus purgandis: pterygia nomasq; sistunt, lateris dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet, cū vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat: naribus regius morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys. CAP. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed lōgior: folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris incuncti, & complures virgas ab radice

exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet extalsa floriâ & acré: foliorû decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Phyllitis.

CAP. CII.

Lingua
serpentina.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quae parte anteriore laevia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo: neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia in vino pota serpentii morsibus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta alius exercet, potui datur.

Phalangium.

CAP. CIII.

* οἱ ὅ κρι
ταύτην
αὐκὰ καὶ
θαμ καλῶ
σι.
* Ita Plin-
ius. Grae-
cus παχὺ,
id est, cras-
so.

Phalangium à quibusdā phalangites vocatur. Ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in diversa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, & lato, ad lenticulae dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parva, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: provenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum vino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorûq; ictus: tormina quoq; discutiunt.

Trifolium.

CAP. CIIII.

Trifolium, Graeci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocant.
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas
habens tenues, iunceas & nigras, unde ramulares
enase

enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis
germinationibus exeunt folia, loto arbori similia:
ijs recenter enatis rursus odor inest: ubi autem adole-
uerunt, bitumen olent. Florem addit purpureum, se-
men quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera
extremitate exertum, antenna modo corniculum ge-
rens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia
in aqua pota pleuriticis, urina difficultati, comitia-
libus, & ijs qui aquæ inter cutē principia sentiunt,
famini quoque vulua vitio opportuni, auxilian-
tur: menses ciunt: terna drachmæ è semine dari de-
bent, è folijs verò quaterna. Contra serpentium ictus
trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt.
Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque
decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes
percusserint: qua autem aqua sanatus quis fuerit, si
ea quispiam alius foveatur, qui vlcus habuerit, per-
inde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam ter-
na folia aut semina in tertianis, cum vino potui de-
dere: & in quartanis, quaterna, ut quæ febrim cir-
cuitus discuterent. Radix antidotis inferitur.

Polium.

CAP. CV.

Dvo genera polij: montanum, cui teuthrio
nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex
est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capi-
tulo in cacumine quandam corymborum speciem
præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
grauiter olente, non sine quadam suauitate. Alte-

rum fruticosius, nō vsq; ad eō valens odore, & vtri-
bus infirmius. Potum feruesacti ius auxiliatur ser-
pentiū ictibus, hydropicis, morbo regio: & lienosis
ex aceto: stomachū male habet: caput doloribus affi-
cit, aluum & menses ciet: substratum suffitū ve-
serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

A N N O T A T I O.

Scordij hoc loco depicti vberimus
vbiq; est prouētus, vt non iniuria eorum
sit explosus error, qui alliū syluestre, aut
obuiā quamcunq; herbam allium sub-
olentē, hoc esse opinabantur. Est autem
præter id, Plin. lib. 25 cap. 6. authore, a-
liud quoddam genus latioribus folijs ac
mētastrī effigie, cuius nup in mōte quo-
dam ad Viennā ingēs se copia nobis ob-
tulit: nec alia sanē nota, quā foliorū cū
mentastro similitudine, à scordio huic
authori descripto, differre obseruauim⁹.

Scordium.

CAP. CVI.

Scordium, in montibus & palustribus nasci-
tur, folijs trisaginis, maioribus, non sic in am-
bita diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu
amaris & adstringentibus: quadrangulis cauli-
bus: subrubro flore. Herba vim excalfactoriam ha-
bet: urinam cit. Cocta recens aridāve cum vino,
aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad
stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & vrine dif-
ficul

scultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassa
 men purulentum pectore expellit. Facit arida fa-
 ina ad veterem tussim, rupta, convulsa, si cum na-
 turtio melle & resina misceatur in eclegmate: in-
 flāmata modicè præcordia, cerato excepta, recreat,
 um aceto acri aut aqua, podagris convenienter il-
 linitur: menses imposita mouet: vulnera congluti-
 nat: vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatri-
 em perducit. Sicca excreſcentias in carne cohibet.
 Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax
 Ponticum natione, Creticumq;.

Tussilago. CAP. CVII.

Tussilagini, folia sunt maiuscula quàm hede Vulgo vn-
 ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter- gula cabal-
 a, supernè virentia, in plures angulos exeuntia: lina.
 aulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo
 nà cum caule cōfestim exuitur: inde nonnulli his
 acare existimauerunt. Radix tenuis est & super-
 acua: nascitur in amœnis & riguis. Folia ex mel-
 e trita igni sacro & omnibus inflammationibus
 litu medētur. Aridæ fumus per infundibulū hian-
 tore raptus, hos sanat qui sicca tussi atq; ortho-
 noxa infestantur: pectoris vomucas rumpit. Eun-
 dem effectum præbet suffita radix. Decocta in hy-
 dromelite, & pota emortuos partus eicit.

Artemisia. CAP. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis na-
 scitur, absinthij modo fruticosa, maioribus

& pinguioribus folijs, ramisq; : huius quidem genera duo. Vnum latius habitusq; , folijs , virgisq; laticribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente : æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuē herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatēte tenuibus, flauo colore, hac incūdiore quā precedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres desessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; : item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos cōminuūt: remoratam vrinam cient: menses pellūt pubi illita. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ in fesso trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia.

CAP. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudinis trium palmorum: folijs ruta, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illius adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys.

CAP. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramos provenit: folia cichorio similia: tota suauem odorem

odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnoeas mulcet. Hanc Cappadoceas ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. CAP. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs malis, in summis alis sursum spectantia graminis capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Gnaphalium. CAP. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino aut stercore, ad dysenteriam.

Typha. CAP. CXIII.

Typha folium ædit & cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbe flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

Circæa. CAP. CXIIII.

Circæa, quam & dircæam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine mili, nascente in quibusdā veluti corniculis: dodrantali radice, tri-

plici ferme aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nasceitur in apricis, saxis, & vento
perflatis. Radicis tusa pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vuluas expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mammas nutrici explet.

Oenanthe. C A P. C X V.

Videtur no-
stra Fili-
pendula.

O Enanthe folia habet pastinacæ: florem can-
didum: caulem crassum, palmi altitudine: se-
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotun-
da capitula extuberantem: nasceitur in petris. Cau-
lis eius & folia, cum mulso vino pota secundas eij-
ciunt. Radix è vino, vrine stillicidio conuenit.

Conyza. C A P. C X V I.

Vulgò pu-
licaria.

C Onyza duo genera: quæ parua vocatur, odo-
re præstantior est: maior verò frutice altior
& folijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ
similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum
cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem
æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subamarus qui in
pappum abit: radices supernacua. Suffitu substra-
tuq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, &
pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpen-
tiū plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores &
folia cum vino ad menses partusq; eijciendos bibun-
tur: item contra vrine stillicidia, arquatum mor-
bū, & tormina: comitiales pota ex aceto adiunāt.
Decoctum in defensionibus medetur vuluæ malis.

Impo

Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter
 horribus & obliuitur. Capitis dolores tenuis illi- * ἡ ῥόα
 a sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule cras-
 iore, ac molliore: folijs media inter maiorem ac mi-
 iorem amplitudinis, minime autē pinguibus: mul-
 ò grauioris hæc est odoris & inincundiore, sed in-
 fficacior. Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium syluestre.

CAP. CXVII.

Hemerocallis foliū & caulem habet lilij, por-
 raceo colore: flores in caule per singulos exor-
 tus, terni aut quaterni erūpent, lilij diuisura, quo-
 ies dehiscere cœperunt, colore perquā pallido: ra-
 lix magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum mel-
 e & lana in pessa apposita, aquā educit & sangui-
 nem. Folia trita mammarum inflammationes à
 artu contractas, oculorūq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustus utilissimè illinūtur.

ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes,
 albam significat violam: solet tamen &
 pro lutea, cœrulea ac purpurea vsurpari.
 Nunc officinis, Arabum ferè sequacibus,
 Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

CAP. CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus
 differentia quedam: nanq; aut cœrulei, aut
 albi,

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in defensionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen diuim drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. CAP. CXIX.

Videtur genus Persi- **C**ratæogonum, siue ut alijs placet cratæonon, folijs melampyro simile est, multis calamis caria, non ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorum: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosus, summopere acre. Traditum est a quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante cõceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. CAP. CXX.

Phyllum, quod & elæophyron vocatur, diuim generum est. quod autem thelygonum appellant, in saxosis musci modo gignitur, folijs cleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: semen papaueris maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorenti-

bmo

us olei non dissimile. Arrhenogonon potu, mascululi sexus facere partus, ut thelygonon foeminet, roditur. Horum Crateus author est: sed huiusmodi historiam mihi produxisse visum est.

Testiculus. CAP. CXXI.

Testiculus, quem Graeci cynosorchin vocant, Officinis folijs circa imam caulis partem in terra strata falso satyris, oleae molli similibus, longioribus, angustioribus, rivo, de quo euibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radi- seq. cap. bullosa, oblonga, olivae modo angusta, duplici ordine: superiore, quae plenior est: inferiore, quae minor ac rugosior. Eduntur radices coctae, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem foeminae, alterum sexum. Adhibentur, in Thessalia mollem mulieres in lacte capri bibere, ad stimulandos coitus: aridam vero, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea anthore vocatur, quoniam radix ad multa utilis sit. folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule almeo: floribus pene purpureis, radice testiculis simili: quae illita tumores discutit, ulcera purgat, & rperere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illita inflammationes lenit. Aridae radices nomas inhibent: sanantque putredines, & oris ulcera cacoethe: luum sistunt è vino potae. De hac, eadem quae de sticulo canis, produntur.

Sat.

Satyrium.

CAP. CXXII.

Satyrium aliqui trofolium vocant, quoniam trifert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florem lilij effigie, candidum, radicem bulbosam, māli magnitudine, fuluam, intus vt ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam quam in vino nigro austero bibere conuenit, cōtropiſthotonum. Utendum ea cum concumbendi incēssit cupiditas, siquidem ex prouiores ad venerem fieri affirmant. Est & alterum satyrium erythroniū siue erythraicon, id est rubrū, semine lini, maiore, duro, læui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinē excitare. Cortice radiceis graui, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, vt produnt, si omninō manu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. CAP. CXXIII.

Vulgò Gal
litricum.

Horminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circum quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ a radice spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestris rotundum, fuscum inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulantem, cum vino bibunt. Purgat cum melle argemās albuginesq; & illud ex aqua tumores discutit. Eo etiam

trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illi-
ta herba. Sylvestre magis viribus pollet: quare un-
guentis, praesertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CX XIII.

HEdysaron, quod unguentarii pelecinum, id
est securidacam vocant, frutex est, folijs ci-
teris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum
modo aduncis, quod anticipem securim amlatur,
unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho uti-
le in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coi-
tus subditum, concipiendi spem adimit. Nasitur in
segetibus & hordeis.

Onosma. CAP. CX XV.

Onosma, & oblonga folia habet: ad similitudi-
nem anchusae, longitudine quatuor digito-
rum, & vnius latitudine, mollia, in terra iaceta,
sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur lon-
ga, tenui, infirma, rubescens: gignitur in asperis. Fo-
lia in vino pota partus extrahunt. Praegnas si eam
supergradiatur, abortum facere dicitur.

οι ὄσμη
δα. οἱ δὲ
φλονίτιρ.
οἱ ὄνονιρ
καλῶσι.

Nymphaea. CAP. CX XVI.

Nymphaea nascitur in paludibus & sta- Nunc Ne-
gnantibus aquis folijs fabae Aegyptiae, mino nuphar,
ribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs
demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus:
flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente:
cum defloruerit, ut rotundum malum, aut pa-
paueris caput, extuberat: nigro semine, denso &

Polopendra animali similibus, ab radice una pro-
 euntibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis,
 & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen ha-
 bet. folia * filiculæ modo diuiditur, subter flauescē. *Polipody
 a hirsutaq; supernè viridia. Vim hanc habent fo-
 lia in aceto feruesacta, vt per dies quadraginta po-
 tui, lienem absumant: quibus etiam contritis lie-
 nem ex vino illini oportet. Stranguria, & regio
 morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica
 comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese
 ut cum muli liene appensa. Tradiunt noctu, silente
 una huius rei gratia effodiendam.

A N N O T A T I O.

Ruellio et Fuchsio lingua ceruina nūc
 appellata: quam alij, minus rectè for-
 asis, Phyllitida suspicantur, de qua su-
 pra Capite cii.

Hemionitis.

CAP. CXXIX.

Hemionitis, quā aliqui splenion vocāt, folijs
 Hemitti dracunculi, lunæ modo incuruum: ra-
 dicibus coheret multis, tenuibus: nunquā flores, ne-
 que semen, neq; caulem gignit: in petrosis nascēs, au-
 tero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Antyllis.

CAP. CXXX.

Antyllis duplex est: quadam enim lenti si-
 millima, folijs mollibus, rectis ramulis, pal-
 mi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in
 calsis terris, & à sole illustratis, non insulso gu-

T

flu. Altera est folijs ramulisq; & auge similis, hirsu
 & Chamaetioribus tamē, breuioribus, & asperioribus, flore
 pit. 1. purpureo, odoris admodū grauis radice cichorij. Po
 ta drachmis quatuor vrinae difficultati, renibusq;
 plurimum prodest Trita, vuluae pituitas emolliūt,
 cum rosaceo, & lacte imposita, vulneribus meden
 tur. Quae autem auge similitudinē refert, prater
 alia, pota cum aceto muljo comitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Officinis **A** Nthemidis genera tria, tantum flore distā
 camomilla tia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis
 Cuius no- concavi: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: ro
 minumva tundis capitulis: floribus in medio aurcis, forin
 rietas ab secus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut pur
 interprete pureis, magnitudine foliorum ruta: nascitur in
 ommissa est. asperis, & iuxta semitas: colligitur vere. Vim ha
 bent radices, flores & herba excalfaciendi, exte
 nuandi; potu, & infusione, pellunt menstrua, par
 tus, vrinam, calculosq;: aduersus inflationes, &
 ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgāt:
 iocinerum vitia sanant: decocto earum vesicae fo
 uentur. Ex omnibus his generibus ad calculos effi
 cacissima est, quae florem purpureum habet, cuius
 amplitudo maiuscula est: hanc propriē heranthem
 mon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, itē
 quae chrysanthemon dicitur, vehementius vrinam
 ciunt. Aegilopyis illitae medentur: commanducatae
 vlcerum eruptiones in ore, sanant. Nonnulli in
 clyst

clysteribus ex oleo vtiuntur, terunturq; in farinam, ad abigendos febrium circuitus Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbae dari, modo floris aut radice pars vna, modo contra floris partes duæ & herbae vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium. CAP. CXXXII.

Parthenium, aliqui amara conuocant, folijs est Vulgò *ma coriandri*, tenuibus: flore per ambitum albo, *tricaria*. intus melino, odore subutroso, sapore amaro. Siccatur, cum aceto mulso aut sale potum, non secus atque epithymum, & bilem & pituitam detrahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anxietatibus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Nō sunt sequēdi, qui Cotulā fœtidā vulgò dictā pro hoc obtrudūt. Nā præter q̃ quòd folia illius nullā aut saltem parua cum fœniculo habeant similitudinem, flos eius nō totus luteus (quod in illo tamen requirit̃) sed per ambitū albus ac intus tantū luteus cōspicit̃: quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa ve-

rum esset Bupthalmum, minime, ut
nec in Parthenio, Narcisso & Anthemi-
dos prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. CAP. CXXXIII.

Bupthalmum (quidam cactham vocant) te-
nues emittit cauliculos, mollesq; : folia fœnicu-
li: luteum florem, anthemide maiorem, oculi simili-
tudine, unde nomen traxit: circa oppida nasci-
tur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tu-
mores duritiasq; discutit. Aiunt epotam post exi-
tum à balneis, regio morbo correptis, colorem tra-
ctu temporis reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus pen-
thoron dicitur sunt qui idæos dactylos radicem
pæoniæ vocant. Caulis altitudine sesquipedis adole-
scit, comitibus multis stolonibus. Huius duo gene-
ra: mas, folia inglâdis habet: in fœmina verò synyr-
ni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit,

*Amygda veluti *græcas nucs: in quibus, quum dehiscunt,
las intelli- multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inue-
ge. niuntur, et in medio nigra, quinq; aut sex, purpu-
rea. Radix maris [tenuis] digitali crassitudine, et
palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœmina
radicibus ceu glâdes circiter septem aut octo inha-
ret, ut in hastula regia. Fœminis à partu non pur-
gatis sicca radix datur: ciet menses nucs græca
magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

ant

auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum, oc vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. CAP. CXXXV.

Lithospermum à seminis duritia nomen accepit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, *Vulgò mī lium folijs.* mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acutiusculi, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & aduvis locis. Vim hanc habet, vt semine cum vino albo potocalculos frangat, pellatq; urinam.

Phalaris. CAP. CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit & culmi similes, à minutis ac nullius vsus radicibus, multos, dum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamē ac dulces: semen candidum, oblongū, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis

mensura potum, ad eadem efficax est.

Rubia.

CAP. CXXXVII.

Hodie Ru-
bia tincto-
rum.

*ἡ ῥευθό-
λανον. ἔ-
νιοι δὲ τὴν
ῥοιον κα-
λεῖσι.
*ὡς ἐν θα-
λάσσῃ δὲ γα-
λακίῳ.

ERythrodanum * radix rubra est, qua tingū-
tur lana. Vna sponte provenit, altera seritur,
*ut in Thebana Gallia, et Rauenna Italia: in Ca-
ria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc non
sine quaestu serunt: namq; maximum ex ea sentiunt
prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi,
apartina non dissimiles, robustiores, & multo pro-
fus maiores: folijs per interualla certa circū arti-
culos, stellatim decussatis. Semen eius rotundū, in-
ter initia viride, mox rubrum, postea cum ematu-
ruit, nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Vrinā ciet:
qua de causa regio morbo opitulatur, pota cū aqua
mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassam copio-
samq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem:
bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excre-
mentorum qua redduntur differentiā spectare. Ad-
uersus serpentium morsus, ramulos cum folijs vino
bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absu-
mit. Imposita radix trahit partus, menses, secun-
dasq;. Albæ vitiligini, illita ex aceto medetur.

Lonchitis.

CAP. CXXXVIII.

LOnchitis folia habet porri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in
terram procumbentia, pauca in caule, in quo flo-
res, ceu galericuli, hiantibus comicis personis si-
miles, nigri, & è rictu albam exerentes velut lin-
guam.

quam, quæ ad labrū inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulū: unde sibi cognomentū arrogauit: radix clauci. Nasctur in scientibus, & asperis. Radix ex vno pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt: folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirū in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem alsumit.

Althæa.

CAP. CXXXIX.

Althæa, quam alij thiscum vocant, in sylue. Vulgò Bifstrum maluarum genere est, cui folia vt malua, & cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. scus.

* Althæa appellatur, quod inter primas sit vtilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur quod medetusa, efficacis est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto suillo adipe, aut, anserino, terebinthinæve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præclusionesque, in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasq; à partu extrahit. decoctæ succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cruditati.

ἰσχυρ.

bus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentium
mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde
ore. Viride semen siccumq; tritum, vitiliginis in
* οὐκ ὄξει. sale * perunctas emendat: eodem cum oleo &
aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet cō-
tra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq;
profluvium. In posca aut vino decoctum bibitur,
contra omnes vesparum, apum, similiumq; aculea-
tos ictus. Folio cum olei momento, morsibus, &
igni sambustis illinuntur. Constat aquam, trita ra-
dice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

Herba Si-
meois vul-
gò.

Alcea sylvestrium malvarum generi assi-
gnatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxi-
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabino ve-
stitos: florē rose, parvū: radices albas, latas, quin-
q; aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cū vino aut
aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis.

CAP. CXLI.

Cannabis sativa planta magni in vita vsus
ad robustissimos funes faciliandos: folijs fra-
xini, gravi odore: caulibus proceris, inanibus:
semine rotundo, quod largiore cibo genituram
extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter au-
rium doloribus instillatur. * Sylvestris cannabis

* Fortè eu- virgas fert althææ similes, minores, nigriores, &
patorium asperiores, cubiti altitudinem equantes: folio sa-
vulgatū. tiua, nigriore & asperiore: flore lychnidis, subru-
bro:

ro : semine & radice alihææ. Decocta radix, illi-
u inflammationes muliet, tumores discutit, tofos
articulorum dissipat. Huius cortex torquenilis fu-
ubus accommodatus.

Anagyris.

CAP. CXLII.

A Nagyris * frutex est arboris instar, per-
quàm grauis odore. folijs * agni, virgisq; flo-
re brassicæ: semē in siliquis nō brenibus gignit, sub-
rotundis, firmum, versicolori facie, simile renibus,
quod durefcit vna maturefcēte. Tenera folia trita
tumores illitu reprimūt si partus hæreat, et secūde
mensēs q; morentur, drachmæ pondere bibuntur in
safo: sic & suspiriosis dantur, & cōtra capitis do-
lores in vino. Difficulter parientibus adalligantur,
ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex
concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semen com-
manducatum vomitiones vehementer ciet.

οι ὅ ἀνὰ
γυρορ. οἱ
ὅ ἀκορ
καλῶσι.
* viticis.

Cepæa.

CAP. CXLIII.

C Epæa portulacæ similis est, sed nigriora ha-
bet folia, & radicem tenuem. Folia in vino
pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laboran-
tibus, opitulantur: maximè id præstat, si cum de-
cocto radicū asparagi eius, quem myacanthon, Vulgò plā-
hoc est, corruclam vocant, bibatur.

tago aqua

Alisma.

CAP. CXLIIII. tica.

A Lisma, * aliȝ damasonion appellant. folia ei * Vox ex
plantaginis, nisi angustiora essent, * laci- Plinio ad-
uiosa, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, iecta.

cubito altiore: capitibus thyrſi: flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acris, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachmæ una aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut a rubetis ranis demorſi ſunt, aut opium hauſerunt: torminibus atque dysenteria, per ſe, aut cum pari modo ſeminiſ clauici, potui datur. Conuulſis, & contra vitia vuluæ prodeſt. Herba ſiſtit aluum, menſtrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis.

CAP. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulo: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem parua: naſcitur in vliginoſis & incultis. Herba ſuapte vi, ſi trita illinatur, tubercula diſſipat: cum vino pota, ſtrangurias ſanat: illita ex oleo, ſudores mouet.

Hypericum.

CAP. CXLVI.

Noſtra
Perforata.

Hypericum alij androſemon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniã ſemen odore reſinæ imitatur: ſurculaceo frutice, dodrantali, ſubrubro, folio rutæ. flore luteo, qui digitis tritus ſanguineum ſuccum remittit, quæ ex cauſa androſemon cognominatur: ſubhirsuta ſiliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: ſemine intus nigro, reſinoſi odoris. gignitur locis cultis & aſperis. Vrinam ciet, menſtrua pellit appoſitum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen

quad

quadraginta diebus haustum, ischiadicis mede-
r. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. CAP. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores ha-
ens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia:
ores luteos, & fructum resinofum, hyperico nõ
bsimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur,
na de causa androsæmum vocauere. Vfus seminis
ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario nã
iliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue
lare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur
& ambustis efficaciter.

*plin. Lib. 27
cap. 5.*

ANNOTATIO.

*Vinoso succo.] Marcellus sanguineo
vertit, qui non vt Ruellius οὐνῶδης, sed
potius αἱματῶδης, vt capite de hyperico,
legisse videtur: quæ fortè lectio magis
genuina. Nã & Plinius lib. 27. cap. 4. An-
drosæmi comam tritam sanguineo suc-
co manare, tradidit.

Androsæmum. CAP. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt,
quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenui-
bus: rubentibus virgis: & folijs ruta, triplo aut
quadruplo maioribus, quæ trita & vinoso succo ma-
nant: complureis alus habet in cacumine, vtrin-
que expansas, pinnatasq;: circa quas, flores pu-
silli,

silli, lutei: & in calyculis semē papaveris nigri, insignē lineis. Huius comæ trita resinofumi odorē reddunt. Semen tritū drachmis duabus potum. biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatiōe aquā exorbere oportet. Herba ambustis illita modetur, vulneribus sanguinē cohibet.

Coris.

CAP. CXLIX.

Coris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & urinas: contra phalangiorum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. & adix vino decocta pota, defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quamoptimè cooperiri licet: si quidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Vulgò Iua
arthriticaἸὺ πόνου
τῆς ἰ. sub
curua.mos
id est, fre-
quentibus.

Aiuga, siue chamæpitys. CAP. CL.


Aiuga herba in terra repens: & incurua foliis semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum racemos & densis, odore pinus: flore tenui, luteo, vel can dido: radice cichory. Folia septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur peculiariter vrinae difficultatibus, iocineris, & renum vitis: torminosi profunt. Ea apud Hera-
cle

am Ponticam, perinde atque antidoto cōtra aco-
tum vtuntur, libentes decoctum. Ad antedicta
initur, cum polenta iure decocti subacta: trita in
rinam & cū sico in pilulis sumpta, aluum emol-
: excepta melle, cū aris squama & resina deij-
t: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit: mam-
arum duritias discutit: vulnera glutinat: vlce-
i quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum
t genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ spe-
em incuruatis, prætenibus, coma supradictæ:
ore candido: semine nigro: hæc etiam pinum redo-
t. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exili-
bus, albis, pilosis: caule aspero, candido: lu-
teis flosculis, semine iuxta alas. Resipit
& hæc pinum. Hæ duæ vim su-
perioris obtinent, sed non
vsque adeò effi-
cacem.

T^E RTII LIBRI
FINIS.

DIOSCORIDI

ANAZARBEI, DE

*Medicinali materia,**Liber IIII.*IOANNE RVELLIO Sueßionensi
interprete.

Ribus autè libris, amantissim
Aree, tradidimus odora menta, olea
arbores, vnguenta, animalia, frum
ta, olera, radices, succos, herbas, semi
naq;. In hoc autem quarto disseremus de radici
bus, & eis quæ restant herbis.

Betonica.

CAP. I.

Cestron psychotrophon vocitatur, quoniam
frigidis locis inuertiatur. Latini betonicam
appellant. Herba est, caulem ferens tenuem, cu
biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia
quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odora
ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,
semen veluti satureie spicatum inest. Decerpta
huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi
cilus nititur, ut veratri, tenuius. Quæ ex hy
dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo
cant. Folia clari debent ruptis, conuulsis, mulieri
bus

vulua malo opportunis, & ad luxandos vteri
 angulatus, denarij pondere cū hydromelite: tres
 vini sextario drachmæ, contra serpentium mor-
 s exhibuntur. Herba magna vtilitate illatis à ser-
 pente vulneribus illinitur: aduersus etiam venena
 achma ex vino pota conuenit: præsumpta ea, si
 nenum hauriatur, nihil nocebit: vrinā ciet: aluū
 bducit: medetur comitialibus & insanis, pota
 aqua: & iocineris lienisq; vitijs, drachmæ po-
 re in aceto mulso, concoctionem adiuuat, si quis
 in fabæ magnitudine secundum cœnam cū melle
 clo deuorarit: modo consimili acida ructantibus
 opinatur. Stomachicis eam manducare & suc-
 m deuorare proderit, si postea dilutum vinum
 rbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus
 solis, cum diluti vini egelidi cyatho: ischiadicis,
 num & vesicæ doloribus, ex aqua: aqua intercu-
 m binis drachmis ex hydromelite, si febricitant:
 aliter, ex mulso: regio morbo laborātes recreat,
 enses pellit, drachmæ pondere cum vino pota:
 uum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydro-
 melitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem
 & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq;
 tili vase reconduntur.

Britanica.

CAP. II.

Britanica aut vetonica, folia habet sylue-
 stris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gu-
 a adstringentia: radicem tenuem & breuem:

cass

caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

*Vis eius tanta
est, ut iuncus
nibus discor
dantibus in
go imposita
aggrauatem
cohibeat.*

Lysimachia, quā aliqui lytron appellāt, caulem emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeutibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, quā adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorū succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantia sistit, in pessa: sanguinis profusio subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnerū cruore cohibet: acerrimū nidore suffusa reddit: quae de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

CAP. II.

Nūc Centimodia.

Polygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folia rutae, sed molliora longioraq; semine sub omnibus folijs iurgescere: unde marem appellari volunt: flos ei candidus: aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excretioni, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam aperte ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus

bus auxiliatur, daturq; in febris per horam ante
significationes: feminarum profluvia impositu
stit: idem succus purulentis auribus & instilla- ἔ. πρὸς ὅ
ταλγίαι.
tur. Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vi-
no, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, san-
guinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, igni-
bus sacris, collectionibus, tumoribus, & recenti-
bus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fœmi-
na fruticat vno caule, arundini tenero, simili, den-
tis geniculis, & in se tubarum modo farctis: arti-
culos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ simi-
les. Radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic
quoq; spissandi reffrigerandiq; natura, ad eadem
valens, sed inefficacior.

Polygonatum.

CAP. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cu Vulgò si-
bito altiore: folijs lauri, latioribus, & leuiori- gillum Sa
us, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadam ad- lomonis.
trictiones flores per singulos foliorum exortus pro-
nit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radi-
e supputatione: radicem habet albam, mollem, len-
tam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, di-
utum crassitudine æquantem: quæ vulneribus effi-
aciter illinuntur. Quinetiā maculas in facie delet.

Clematis.

CAP. VI.

Clematis humi serpit. lato, pinguiq; solo pro- Est quā La
uenit, viticulus spargens crassitudine iunci peruinam tini Vincā
xiguas: folio lauri figura & colore, multo mino- vocant.

ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia
 & dysenterias sedant: subdita in pessa cum lacte
 & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vulvae meden-
 tur. Dolores dentium commanducata finit: imposi-
 ta serpentium moribus, iuuamentum praestat. Fer-
 tur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opi-
 tulari. Gignitur in terrenis. Est & aliera clematis,
 Flāmula quae viticulosum emittit ramulum, rube-
 Vulgò: lentum: folium gustu admodum acre, ac exulce-
 rans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum, pi-
 tuitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite
 potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepi-
 dio conditur ad cibos.

Polemonia.

CAP. VII.

Polemoniam alij philateriam, Cappadoces chi-
 liodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque
 pinnatis: folijs paulo quam ruta maioribus, ac lon-
 gioribus, calamintha aut *sanguinariae proximis,
 *Polygoni quibus in summis velut corymbi dependent, nigro
 *Struthio semine: radice cubitali, albicante, *radicula simili:
 nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino ra-
 dix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua
 aduersus vrinae difficultatem, & coxendicum cru-
 ciatus. Datur ex aceto drachmae pondere lienosis.
 Eadem scorpionis plaga alligatur. Tradunt, eum,
 qui radicem gustauerit, a scorpione non feriri:
 eumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium
 dolorem mansa mitigat.

A F

LIBER QVARTVS.

309

ANNOTATIO.

*Flores lutei.] Ne moueâre sicubi for-
tè, vt nos plerisq; locis, candidis floribus
cōspexeris: solēt em̃ pro loci varietate in
vna eademq; herba flores non rarò com-
mutari: id quod Dioscorides etiam in A-
rætylide, ac multis alijs plantis fatetur.

Symphytum, siue alus.

CAP. VIII.

Symphyton petræon, id est, alus, nascitur in pe-
tris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus:
capitulis thymi: *furculosum totum, odoratum, gu *Ita Plin.
tu dulce, salinam ciens: longa radice, subrufo, digi- Græcus
ali crassitudine. Decoctum in aqua mulsâ & pe- ξυλῶδης,
um pulmonis vitia purgat: sanguinem reücienti- id est, ligno
us, & renum malis, ex aqua datur: ad dysente- sum.
iam, rubraq; fæminarum profluvia, in vino deco-
ctum: ad conuulsa verò & rupta, ex aceto mulso
ibitur. Quin & commanducatū siliū sedat, fau-
ibus asperis subuenit, vulnera recentia enterocelas-
iue conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autē cū
symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterū sym- Nunc Con
hyton, quod aliqui pecton vocāt: id caulem emit- solida ma-
it bicubitale, aut maiorem, crassum, leuem, angulo ior.
um, vt sonchi inanem, circa quē breui internacian-
spatio, folia exeunt angustâ, buglossō proxima,
blonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam
riato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeunti-

bus, in quibus * flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant: radices demittuntur furis nigrae, intus candidae, viscosae: quarum est usus. Tritae & potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illitae conglutinant: carnes quoq; si concoquantur, cogunt additae: inflammationibus, praesertim sedis, cum senecionis folijs, utiliter illinuntur.

Holostrion.

CAP. IX.

Holostrion herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram, folijs viticulisq; coronopo aut gramine proximis, gustu adstringentibus: radice alba, praetenu usq; in capillamenti specie, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad rupta, in vino potae: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Stæbe.

CAP. X.

Stæbe vulgaris est notitia: cuius semen & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

CAP. XI.

Clymenum caulem fert fabae, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhis. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coeliacos, rubraque; feminarum profluvia, refrigerando infranat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum. CAP. XII.

Periclymenon, simplex fruticat, ex interual- *Vulgo Calis* parua folia habens, ipsum amplectentia, prifoliū, et subcandida, hederacea: inter folia furculi exeunt, Matrisyl- in quibus bacca, hedere similes: flos fabæ candidus, uia. aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se ad muculis, propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in vino, quadragenis diebus, lienem absorbit, lassitudinem discit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. Orihopnæa, & singultui prodest: partū accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produitur: perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus. CAP. XIII.

Tribuli genus vnum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, prædixis: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori. adsunt ei & capillamenta quaedam spicacea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasque persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium. CAP. XIII.

Limonium, folia habet beta, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, retum, lilio aequalem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis celiacisque prodest: rubra foeminarum profluvia sistit. Nasctur in pratis & palustribus.

Lagopus. CAP. XV.

Lagopus herba sistit alium in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nasctur in segetibus.

Med

Medium. CAP. XVI.

MEdion in saxis & opacis nascitur: folia habet & iridis: caulem tricubitalem, & in eo & Alij ferunt florem grandem, purpureum, rotundum semine cui dis. ci, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita in farina & ex melle decocta, rubros menses feminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potus, menstrua pellit.

Epimedium. CAP. XVII.

EPimedium, carlis est non magnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neq; florem, neq; fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas crescere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinque drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus. CAP. XVIII.

XYphion, alij phasganon, alij macheronion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, nervosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una pusillorum bulliorum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, su-

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cū thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiorem radice ex vino pota, venerē stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. Superiorem quoq; utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dare præcipiunt.

Sparganium. CAP. XIX.

Sparganion, aliqui xiphidion vocant: folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia: in summo caule veluti pilulae prominent, in quibus semen. Contra serpentis venena, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

XYris, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorū medio caulis erumpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triangulares dependunt: in quibus purpureus flos, in medio puniceus semē in folliculis, simile fabis, rotundū, rubrū, acre. radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera fractaq; efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiā extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radices cetaurij ac mellis quinta: tumoribus et collationibus illita cū aceto medetur. Radix ex passō bibitur, ad cōuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias et alui profluvia. Semē tribus obolis potū, vrinā vehementius impellit: & cū aceto, lienē absumit.

And

ANchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactucæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquouersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ ætate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: leto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polëta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum remouit ijs, lieni, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt aliu folia in vino pota. Radice pigmentarij vtuntur ad vnguentorū spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellant. Hæc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceū vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ menses sanguinem succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarū, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandēs, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabulo mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latus ventris tineas excutit.

*Plinio
no. i. l. xxi.
lib. xxi.
cap. r.*

Lycopsis, quæ & anubsa à nonnullis vocatur, foliis lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in eis paruo purpurascēte: radice rulra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta movet, adiecto ol. o.

Vulgò lingua hircina.

Echion, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, sul rubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minuta q; viroque latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breviora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea hiberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantaes, hirsutos: **Melanthij* siliquas hyoscyamo similes, semine, ut **gith*, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua

na viperarum cæterarumq; serpentium morsibus
nedeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myr-
ra, et pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Erinus.

CAP. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs
Eocymi, sed minoribus, parte superna diuisis,
lodrantalibus surculis quinis senisve, flore candi-
do: semine nigro paruo & acerbo: folia & caules
lacteio succo turgent. Semen drachmis duabus, in * Sic Plin.
quatuor mellis cyathis, oblitum oculorum fluxio- In græco
nes cohibet. Succus cum sulphure & nitro instilla simplici-
us, aurium dolores sedat. ter, Suc-

Gramen.

CAP. XXVI. co.

Gramen geniculatis serpit ramulis, à quibus
radices spargit dulces, articulis præcinctas:
folia acuminata, dura, et, vt arundinis parua, lata,
exilitatē fastigiantur, eaq; iumenta & boues pa-
unt. Trita radix illitu vulnera cōglutinat. Deco-
tum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae
difficultatibus: calculosa etiā v siccæ excremēta com-
minuit. Est & arundinaceū gramen, priore mul-
tius, quo iumenta necare traditur, praesertim
in Babylone id quod iuxta vias nascitur. Quod in
lirnaeo mōte gignitur, densius fruticat: folijs hede-
raceis: flore odorato, cādido: semine paruo, nō inuti-
li: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine,
induratis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si
vino cum melle pari, & myrrha dimidio deco-
quat

quatur, adicianturq; piperis & thuris tertiae portiones, probatissimū erit oculorū medicamentum: id in area pyxide recōditur. Decoētū radicis idem, quod herba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit, aluum vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflamat, si eo virenti sæpe pascantur.

Sideritis.

CAP. XXVII.

Nunc her- **S**ideritim aliqui heracleam vocant: folia habet
ba Indai- Smarrubij, sed longiora, satis ad frondem quer-
ca, & Te- cus aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspe-
trahl, ra: canles ædit quadratos, dodrantem altos, ac quan-
doq; etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquan-
tumq; substringentis: in quibus per interstitia or-
biculata vertebra, vt in marrubio, spectantur, &
semen in eis nigrum: nascitur in petrosis. Illita fo-
lia, suapte vi, vulnera sine inflammationis pericu-
lo iungunt. Altera sideritis binūm cubitorum rama-
lis, exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinq; per oras
diuiso: pediculo longo, prodeuntibus è summo ala-
rum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacu-
mine orbiculato, aspero, in quo semen continetur,
quàm betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius
vis, foliorumq; ad vulnera, præcipua est. Sideritim
aliā esse trahunt, quam Crateuas heracleam vo-
cat, in macerijis, & vineis nascentem, folijs ab vna
radice multis, coriandro similibus, circa coliculos
dodrantales, teneros, laues, subcandidos atque
subr

subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. CAP. XXVIII.

Achillea, quibusdā Achillea sideritis, dodrantales aut maiores gerit scapos, fusorū effigie, minutulis folijs circundatos, ex obliquo crebras habentibus incisuras sectionibus, coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insuauis, reum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurum emulantibus: prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinē inhibet, & cruenta vulua profluua, in vellere. Decocto quoq; insident feminae fluxione vulua laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus. CAP. XXIX.

Rubus, notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & fœminarū profluua: præteris morsui accommodatissimum. Gingiua firmant, & oris vitij folia cōmanducata mententur, cohibentq; illita, vlcera quæ serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; proci detribus remedio sunt, & condylomatis, & hæmorrhoidibus olia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs unduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singul

singulari remedio, contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quamoptimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur alui præmaturi cibo, necnon flore in vino potio.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida provenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus cōplectitur quodcumq; contigerit adminiculum. Nasceitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorū succus potu dicit aluum

Elatine. CAP. XXXII.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora. pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis sentisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nasceitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionibus usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. CAP. XXXIII.

Eup

Evpatorium, fruticosa herba est, vnicum effrenans caulem, lignosum, nigricantem, rectum, inueniunt, hirsutum, cubitalem, interdum amplius: folijs per intervalla quinquefolijs, aut campanulatis similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum serratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum declinans, quod siccatum vestibus inheret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrè cicatricem trahunt, medentur. Herba & semen in vino potum, dysenteria, iocineris itibus, & serpentium ictibus, liberat. Nec qui aberrantes Argemonem hanc appellarint, cum tamen aliā sit, ut exposuimus.

Quinquefolium. CAP. XXXIII.

Quinquefolium ramulos fert festuicarum similitudine, tenues, dedrātales, in quibus semina menthae, quia singulis pediculis, raro plura, ambitu serrata: florē ex candido pallecentē, aurum. Nasceatur in riguis, & aquarijs ductibus. Rubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arriæ scabritias, gargarizatu lenigat: contra alui fluxum, & dysenterias auxiliatur: item articulum coxendicumque cruciatibus potum. Cocta in

Est Officinarum Agri-
monia: earum autem Eupatorium
fortē Canabasis syl-
uestris, de qua præcedenti libro

* Græci Artemisiā
habet: sed esse, ut nunc
vides, argemonē legē-
dum, ex anemome
(de qua libro ij.) non
obscure cognoscas.

acc.

aceto, & illita, serpentia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones, discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, pforasq; sanat. Teneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest: itē aduersum venena. Cum hydromelite autē, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra februm circuitus, in quartana quidem, quaternam ramulorū: in tertiana verò, ternum: in quotidiana, vnius. Ea quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorū succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt: enterocelici auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis proflua & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

A N N O T A T I O.

*Spicam lolio similem.] Non obscure hinc elicitur Loliū spica esse insignitū, ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam vulgò cognominatam, cuius in segetibus vbiq; tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureū florē emittit.

Phænix.

CAP. XXXV.

PHænix folia habet hordei, sed breviora, & angustiora, *spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve

ve spicas. In arvis tectisq; recenter illitis nasci-
 Harum virium compos, vt in vino austero po-
 alui profluuium, & emanantem vulua sangui-
 sistat, vrine impetus infrænet. Sunt qui adal-
 itam in puniteo vellere & suspensam, sangui-
 n suppressere prodant.

Idæa radix. CAP. XXXVI.

Dæa radici folia sunt ea quæ rusco: circum ea
 veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Ra-
 c spissandi naturam habet, his conueniens qui-
 adstructione opus est. Pota, citam aluum, men-
 q; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix. CAP. XXXVII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, cost-
 similis, lenior, inæqualulis: quæ cōtrita rosas
 dolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta
 nti & tēporibus cum rosacei mōmēto imponat.

Equisetum. CAP. XXXVIII.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur: Vulgò Cau-
 cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se da equina.
 rēti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea
 ca eos folia, crebra, exilia. In sublime attolli-
 r, vicinos arborum caudices scandens, obuolu-
 m; dependet, comis multis, nigris, vt equorum
 ula: radix lignosa, dura. Vis herbæ spissare:
 are sanguinem naribus erumpentem succus
 se sistit: prodest dysentericis in vino potus: vri-
 m cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tri-

tis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tuſſim
orthopneam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua po
tis, diſſectiones veſicae & inteſtinorū, enterocela
in vnum coaleſcere, cogiq; feruntur. Alterum equi
ſetum caulis eſt reſtus, equalis, cubito maior, in
anis comis per interualla breuioribus, candidiori
bus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneri
bus remedio eſt, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX

Coccum, quo infectores vtuntur, frutex eſt ſur
culofus, paruus, cui grana leu lentes adherēt
qua electa cōgeruntur. Optimum gignitur in Gala
tia, & Armenia, deinde Aſia, & Cilicia: vltimum
ex omnibus Hispanicum. Vis huic ſpiſſandi: vulne
ribus, neruisq; praeciſis, cōuenienter ex aceto tritum
illinitur. Naſcitur quoque in Cilicia, ē querculus
cochlearum exilium ſimilitudine, quod illius regio
nis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium.

CAP. XL.

Tragium naſcitur in Creta tantum inſula,
*Ita Plin. lentisco ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingu
Gracus co lis tamen minoribus, * ſuccus ei lacteus, gummi
dex ſimpli non diſſimilis. Semen, folia, lacrymaq; illitu ſpi
citer, ſuc- cula ē corpore eijciunt: omnia quoque corpori im
cus. pacta, euocant: pota ſtranguriae medentur, calen
los veſicae frangūt, menſes trahunt. Modus in ſum
ptione eſt, drachma vna. Fama eſt ſylueſtres ca
pras ſagittis confoſſas, eius herbae pabulo ſpicula

excis

excutere. Est & alterum tragium, quod tragor-
ros aliqui vocant, folia scolopendry habet, & ra-
cem sylvestris raphani, tenuem, candidā: quam
udam vel coctā esse dysentericis prodest. Folia Nominis
utumno, hirci virus olent: exinde sibi tragū nomē causa-
loptavit. Provenit in montibus, & præcipitijs.

Tragum.

CAP. XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion
aut traganon vocant: maximè in maritimis
ascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, hu-
ilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos aci-
is, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacu-
mine, gustu multum adstringente. Racemorum
cui decem ex vino poti, celiacis, & feminis flu-
ione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tunduntur
plerisque, & in pastillos digesti asservantur, qui
us vtuntur cum opus est.

Iuncus.

CAP. XLII.

[Vnci duo genera: vnum levis nominati, alte-
rum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cu-
us etiam duo assignantur genera: vnum sterile,
aliquum fert semen nigrum, rotundum, & cras-
siorē constat calamo, carnosiorēq;. Tertius est iun-
us, qui vocatur oloschænos, prioribus carnosior,
superiorq;, is similem supradieto fructum in ca-
amine parit. Semen vtriusque totum, ex diluto
vino potum, sistit aluum, & rubra feminarum
profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit.

Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsu Aethiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

CAP. XLIII.

Officinis
Hepatica.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryophytopis appellatur, aspergionosis petris adhæret, muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regimorbo correptos, cum melle illitus: oris & linguæ fluxiones inhibet.

Paronychia.

CAP. XLIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome.

CAP. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: compositæ specie corymborū, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquantem: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacisq; nascitur. Radix exalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet: contra purgationes vultus, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum.

CAP. XLVI.

Chrysogonum densè fruticat, quernis folijs flore coronarij verbasci: radix ut rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ tri-

cum aceto, atq; imposta, muris aranei morfi-
s auxiliatur.

Elichrysum. CAP. XLVII.

Elichryson quidā chrysanthemon, nonnulli & Alj Helio
did amaranton vocant, quo deorū simulacra chryson.
ronāt: ramulū habet candidū, virentē, rectū, fir- Officinis
um folia intercedētibus spatij angustā, abroto- Sihæchas
similia: comā aurea lucis in orbe, umbella rectū- citrina.
i veluti siccis corymbis dependētibus, radice tenui:
ascitur in asperis, & torrentiū alucis. Contra ser
ntū ictus, coxendicū dolores, urinae stillicidia, ru-
aq; coma ē vino pota opitulatur: ciet menses. San
uinem cōcretū ventris ac vesicæ absūmit, pota cum
ulso: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit de-
illationes, data in vino albo diluto: vestibis inse-
tur, vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum. CAP. XLVIII.

Chrysanthemon aut caltha, nonnullis buph-
thabnos: herba est tenera, fruticosa, laues
roferens caules, & multifida folia: flores supra
nodum splendentes, luteos orbem oculi imitantes,
nde bupththalmi nomen traxit: propter oppida
ascitur. Cuius caules oleris vicē manduntur. Fio-
es cum cerato triti, steatomata discutere produn-
ur: regio morbo correptis, colorē breui reddunt, si
quente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum. CAP. XLIX.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longi-

tudine assurgens, simplex, humilis, origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens: huius vstæ nidor urinam cit, & vulvæ duritias emollit.

Verbenaca.

CAP. I.

Peristeryon, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod colubæ circa hanc perquam libet versari soleant. Dodrantis altitudine, et interdum amplius adolescit: folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; sola, constare sæpius inuenitur. Folia cum suilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vulvarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto repri-munt: putrida ulcera cohibent: vulnera glutinant: veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

CAP. LI.

Sacra herba, quæ & peristeryon nominatur, ramulos emittit culitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex internodiis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus castio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitave, aduersus serpentes pollent, eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum libuntur: veteres tumores & inflam

Inflammationes mitigant: sordida vlcera purgant:
 ta in vino decocta, tonsillarū crustas abrumpit:
 s nomas gargarizatu cohibet. Aiūt, si aqua spar
 tur triclinium, qua maduerit, latiores conuictus
 ri. Datur potandum in tertianis febris, tertius
 terra geniculum, cum folijs circundantibus: quar
 nis, quartum. Sacram vocant herbam, quoniam
 ulum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Astragalus.

CAP. LII.

Astragalus, parvus à terra frutex, folijs &
 ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: ra
 ce rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas
 pendices firmas habet, ingras, præduras, veluti
 rnuia inter se implicatas, gustu adstringentes. na
 tur in ventosis, opacis, & in nivalibus: ea Mem
 bis Arcadiæ scætet. Alium sistit radix in vino po
 t: vrinam mouet: vetustis vlceribus, sicca effi
 ciciter inspargitur: sanguinem suppressit: agrè
 ropter duritiā tunditur.

Hyacinthus.

CAP. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem
 caulem, leuē, minimo digito tenuiorem, her
 acci coloris: comam procumbentem, florem pur
 pureorum plenam, incuruam: radicem quoq; bul
 aceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo
 llita, pubertatem coërcet, & non patitur erum
 nere: sistit alium pota & vrinam impellit, pha
 ngiorumq; moribus auxiliatur. Semē adstrin

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum.

Papauer erraticum. C A P. LIII

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, ver-
quidē in aruis cum hordeo nascitur, flore pro-
tinus deciduo, unde & nomen apud Græcos acce-

* Locum
deprauatū
esse mani-
festō appa-
ret. Sunt
cum her-
bæ, quas
hic cōme-
morat Dio-
scorides,
diuersa pla-
næ facie,
vt vni ei-
demq; re-
ctè compa-
rari nequa-
quam pos-
sint: quo-
modo au-
tem instau-
randus, pe-
ritioribus
cogitandū
relinqui-
mus.

pit. * Folia erucae, aut origano, aut cichorio, an-
thymo similia spectantur: sed longiora, diuisa, sca-
bra: iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sy-
uestris anemones, puniceus, interdū albus: oblongi
caput, sed quā anemones minus: semē rufum: ra-
dix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine,
gustū amara. Huius capita quinque aut sex, in vi-
ni cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis,
quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli
mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emol-
liunt: ad idem praestandum mellitis placentulis, &
dulciarijs libris admiscetur. Folia cum calycibus il-
lita, inflammationes sanant: eorūdem fottu & per-
fusione, somnus allicitur.

Papauer satium. C A P. LV.

E satium papaueris genere, quod hortense est, se-
men in panem densatur, qui sanis inusu sit: eo
etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitū vo-
cant. Capitulum habet longum, & semen candi-
dum. Syluestre verò, caput insidens demissumq;
& nigrum semen, quod pithitis nominatur: non-
nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius
sca

apo lacteus succus emanat. Tertium magis sylue-
 re, & ad medicinas valentius, multo his longius,
 reductiore capitulo. Omnium in commune na-
 tura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia de-
 coquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bi-
 bitur decoctum contra vigilias. Calyces cum po-
 menta triti, et cataplasmatibus admisti, ignibus sacris,
 & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoque
 irides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad
 usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua co-
 quuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum
 humor, coeat in eclegmatis lentore. Id medicamentum
 in tussi, arteriae fluxionibus, & coeliacorum affe-
 ctu, doloris leuamentum praebet. Efficacius tamen
 redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Pa-
 paueris nigri semen tritum cum vino bibitur, con-
 tra citam aluum, & feminarum profluvia: in per-
 nigijs fronti temporibusq; illinitur, ex aqua.
 Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccataq; sum-
 ptum erui magnitudine, dolorem finit, concoquit,
 & somnum allicit: tussi, atque coeliacorum valetu-
 dini auxiliatur: verum si copiosius hauriatur, no-
 cet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores
 capitis cum rosaceo perfusum efficax est: aurium
 dolori, cum amygdalino, myrrha, & croco in-
 stillatur: inflammationibus oculorum cum torrefa-
 ctio oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
 cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

co: somnum accersit, subditū sedi pro balano. *Opium* mum habetur graue, & densum, gustu amarum, quod opi odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, mum. laue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandum non vt cera coeat, & in sole diffundatur: de in admotū lucernis, nō atra luceat flāma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adulterant. Verum glaucio fucatū, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum, sple-descit, & infirmum est. Nec desunt qui eō demētia deuenierint, vt adipem & admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, vt Erasistratus author est, vsum eius damnauit, oculorum lippitudinibus & aurium vitij infundi vetans, quoniam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si nō adulteraretur. Mnedsimus vsum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdicat. Quae commentitia esse, experimento deprehenduntur: siquidem effectus, virium huiusce medicamenti, fidem faciunt. quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonā modo is excipiatur succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentēque in mortario, digerunt

pastillos: id meconium vocatur, multum opio-
gnatius. Porro opij faciundi ratio hæc est: Cum Opij colli-
gendi ratio.
os in eo exaruerit, cultro decussatum in stellas, ne
entus adigatur, ex obliquo in rectum summam
utem incidere oportet, lacrymam exeuntem, digito
in concham abstergere: nec multo post redire, ut
öcreta inueniatur: etenim quæ tñ, aut postero die
tiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pa-
stillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum
est, ne vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

Vulgò pa-
pauer cor-
nutum.
Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia
habet candida, hirsuta, verbasco similia in
ambitu syluestris papaueris more serrata: cau-
le non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigræ-
ci, in corniculorum modum inflexo, vnde nomen
mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: ra-
dice per summa cespitum, nigra, crassa: nascitur
in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, ut in
aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocine-
ris affectus, potu sanet: prodest his qui crassa
quædam, aspera, aut araneosa cum lene reddunt.
Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua
mulsâ poto. Crustas emarginant, illita ex oleo fo-
lia floresq; , & argema ac nubeculas iumentorū
perunctas, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc pa-
paueris genere faciliari existimarunt, falsi qua-
dam foliorum cognatione.

Spir

Spumeum papauer. CAP. LVII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule do-

*Stru- drantali: folijs admodum paruis, * radícula siml

*Sic ex libus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba Theophrastus est, & spumea tota: * radice in summo caespite. flo. Vide- Legitur aestate semen, cum integrè adoleuit, decitur enim ditq; exiccatum. Datum acetabuli mēsurā in aqua locus in mulsa, vomitione expurgat: priuatim huiusmodi græco Dio purgatio, comitialibus prodest.

scoridis co

Hypecoum.

CAP. LVIII.

dice corru-
ptus.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruisq; folijs ruta, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus.

Nunc Ius-
quiamus.

CAP. LIX.

Hyoſcyamus, frutex est caules emittēs crassos: folia lata, oblōga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeūt, tāquā punīcorū cytini, ſcutulis ſepti ſeminū plenis, vt papaueris. Tres eius differeſcunt: Vna ſemine nigro, floribus penē purpureis, ſimiliter ſolis, cytiniis præduris, & ſpinosis. Alterius ſemē ſubflauū, vt irionis: flores lutei: folia, et ſiliquæ ſimpliciores. Ambo in ſaniā gignūt, & ſopore, ideo in cōmuni vſu dānantur. Tertium genus, vt quod miſiſſimum eſſet, medici recepere: pingue, lamuginoſum, molle, cādidi flores ſeminisq; in maritimis rudcribusq; naſcens. Cuius occaſio ſi nō adſit,

ru

fum vsurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-
 probatur. Recenti semine, caulibus folijsq; tussis, suc-
 cis in sole exprimitur, et exiccato humore, vsus ad
 unum vsq; prorogatur: nam facile corruptionem
 patitur. Extrahitur etiã ex sicco semine separatim
 aqua calida tuso, & expresso. Liquamentũ autẽ
 sicco lacteo præstantius est, & magis dolores finit.
 Contusa herba recens, addita trimestre farina, di-
 eritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum
 rimum, & quod à sicco semine exemptũ est, colly-
 ijs, quæ doloris sensum auferunt, cõmodissimẽ in-
 ri solent: cõtra acutas calidasq; fluxiones, dolores
 urium, atq; vuluæ malæ, prosunt: cum farina au-
 em aut polento, oculorum, pedũ, cæterarumq; par-
 ium inflammationes placant. Semen eadem præbet:
 ussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & dolo-
 ribus, efficax: contra mensium abundantiam, &
 rumpentem aliunde sanguinẽ, oboli pondere cũ pa-
 ueris semine, & aqua mulsa, bibitur: podagris
 iuuenit: testibus inflatis, mãmibusq; tumẽtibus à par-
 uis, tritum ex vino illinitur. Alijs quoq; cataplasma
 tis, quæ doloris leuamentũ præstant, admisceri so-
 let. Folia omnibus medicamentis dolorem sedanti-
 bus, per sese, et ex polenta, vtilissimẽ imponũtur: re-
 centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinũ-
 tur: cum vino terna, quaternave pota, sanant al-
 gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum
 modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-
 dia

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluvantur.

Psyllium.

CAP LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fieni modo, in totum herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve cōvolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicū simili: unde & nomen: & in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandū, inspissandū, & molliendū conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis: cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantiū, & prominenti vmbilico, illitū ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, vbi cōcreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Cōtra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ cacœthe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

CAP LXI.

Hodie solanum
trum corrupte.

Hortense solanum, frutex cibus idoneus, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi,

Li, qui post maturitatē nigricat, aut fuluescit: her-
 ba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: qua-
 re folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris,
 conuenienter cum polline polentæ illinuntur: agilo-
 pia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sa-
 nant: æstuantī stomacho auxiliantur: parotidas,
 cum sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus
 eius aduersus ignem sacrum atque vlcera quæ ser-
 punt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad
 ægilopas cum pane: infantium adustioni, quam sy-
 riasin vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in
 collyriis, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acu-
 tas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus pro-
 dest. Mensium abundantiam sistit, in vellere sub-
 ditus. Succus fuluo gallinarum cortaliū fimo sub-
 actus, & luteo appositus, ægilopis præsentaneo
 est remedio. Est & aliud solanum, quod peculiari
 nomine halicacabon aut physalida, id est vesica-
 riam vocant, folijs antedicto similibus, verum la-
 tioribus: cuius caules, posteaquam adoluerunt, pro
 na terram spectant: folliculis orbiculatis vesiculis
 similibus: semine intus fuluo, rotundo, læui acino-
 rum vuae effigie: quo coronarij vtuntur, corollis
 intorquentes. Vim vsumq; hortensis solani habet:
 verum cibus nequaquam expetitur. Regium mor-
 bum purgat, semine potō, & vrinā pellit. Ex vtra-
 que herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra,
 reconditur, ad eadem valens.

Oicinis
 Alchechem
 gi Arabi
 exemplo.

Sol

Solanū somniferū. CAP. LXII.

Solanum somniferū, aliqui etiā haliacacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu cōtumacibus, pinguiū foliorū, cotoneæq; mali similiū plenīs flore grādi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, nō procul à mari. Radicis cortex, in vino drachma pōdere potus, somnificam vim habet, opio mitiorē. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adūciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pa stillis inseritur, & medicamentis quæ doloris leuamentū præbent: decoctus in vina, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. CAP. LXIII.

Solanum manicon, aliqui persion, alij thryon appellauere. Huic folium erucæ simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verūm maius, latiusq;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vix mollibus: radice firmatur candida, crassa, cana, cubitali: gignitur in

mont

LIBER QVARTVS. 639

montibus, vëto perflatis, & platanetis. Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad treis vsq; dies mentis alienatione affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsæ copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium. CAP. LXIIII.

DOrycnion Crateuas halicacabon, aut caulea vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmitioribus, præter modum scabris: flore candido: siliquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui crui magnitudine, leuibus, firmis, versicoloribus: radix ad digitum crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere, qui dicerent, semen in amatoria expeti.

Mandragoras. CAP. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij circaeam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ femina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quam lactuæ, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhaeret bene ma-

Y

gnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris,
 intus albis, crasso cortice vestitis, caule vicius est.
 *Alij mo- Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & no-
 rion. rion vocitatus: huius folia magna, alba, lata, læ-
 uia vt betæ: mala quàm alterius duplo maiora, co-
 lore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate
 quadam olentia: quorum pomorū cibo, aliquantum
 opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior
 & cādidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cor-
 tice recentis radicis tuso, & prælis subiecto: qui in-
 solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quo-
 que succus depromitur, sed aliquanto ignauior. De-
 libratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum
 suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias co-
 quunt, & defacatum ius seruant: cyathosq; vno v-
 tuntur, in peruiigijs, & doloribus, & ante sectio-
 nes vstionesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
 ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem
 atram pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
 vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his
 quæ dolores finiunt, pestis quoq; emollientibus, ad-
 miscetur: semioboli pondere inclitus, per se menses
 & partus expellit: subditus seti pro balano, somni-
 ficus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis ho-
 ris cū eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effin-
 gere optaueris, formam, ipsum facile præstat. Fo-
 lia recentia convenienter oculorum inflammationi-
 bus, & collectionibus, quas vlcera citant, cum po-
 len

lenta illinuntur: duritias omneis, suppuraciones, stru-
mas & tubercula discutiunt: stigmata sine exulce-
ratione delent, si quinis senisve diebus, sensim per-
fricentur. Folia seruantur in muris, eisdem ad va-
sus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpen-
tium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas at-
que tubercula, cum aqua dissipat: articulorum cru-
ciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vi-
num e coriice radice, ad hunc modum: Ternæ mi-
na in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur
ex eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent,
vt antè dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur
dolore, sed veterno quodam pressi, torpescunt. Ma-
la soporem afferunt olfactu, & etiam si mandan-
tur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odo-
re percussus, obmutescunt Semen malorum potum
vulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem
non experto, rubra foeminarum profluvia sistit.
Scarificata punctisq; multifariam aperta radice,
erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamen-
tum autem succo lacteo præstantius est: sed non v-
bique, vt experientia docet, radices lacteum suc-
cum delacrymant. Alium tradunt esse mandrago-
ram, nomine morion, in opacis iuxta specus ena-
tum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, do-
drantalibus, radicē ambientibus: quæ mollis est &
candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitu-
dine equat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniove,

drachmæ pondere deuorata, vsum rationis interciperet. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cū scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum.

CAP. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cammaron, alij telyphonon, alij myoclonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & *sulhirsuta:

*Ita Plin. caulem palmo altum: radix scorpj caudam æmulatur, & alabaſtri modo ſplendet. Torpeſcunt, vt Græcus fama eſt. ſcorpiones admoti radice, ſtupentq; : qui iωσργα- ruruſum hellebori contactu, excitantur. Oculorum Xia, medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. E. i. ſubſpectu ſubſpectu pantheras, ſues, lupos & feras omnes in car autē lectio nibus obiectū. Eſt & alterum aconitum, quod alipotior, her qui cynoclonon, alij lycoclonon appellant. Huius bæ, ſi quan genera ſunt tria: vnū, quod vtūtur venatores: alia do ſeſe ob- duo in vsum ſuū vertere medici. è quibus tertium, tulerit, a- quod Ponticū nominatur, plurimū in Italia, monſpectus in- tibus Iuſtinis exilit, à priore diſtans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuiſura, lōgiōra, & multō nigriora: caulem ſilicis pediculo ſimilem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliorem: ſemen in ſiliquis oblongis recondit: radices in modum ſquilla marinæ cirrōrum nigreſcunt. Quibus ad
venat

venationem luporum vtūtur: insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enccant.

Cicuta.

CAP. LXVII.

Cicuta caulem ædit geniculatum, vt fœniculi, grandem, * folia ferulæ, angustiora, graui odoratu: rami, mox vmbellæ in summo prodeunt: flores quoq; albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutæ letale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cuminumibus, priusquam semina & coma siccescant: qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem vsus est aridi: commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpūt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno, compescit: sed genitale resoluit. lac puerperarū māmīs appositū extinguit: in virginitate mammas coërcet, & increcere non patitur: pueris præstat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascentis.

Taxum.

CAP. LXVIII.

Smilax à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonēsi Gallia Hispania contermina nascens. Auicula quæ Italicæ ta-

*Plinius lib. 25. ca. 13. Coriandro assimi lauit, cui pprius facit ne quam ferulæ quæ fœniculi constat folijs, Cicuta omnib; hodie cōperta, videtur accedere.

xi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripuntur. Narbona tam presentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, laedantur, & sepe numero moriantur: quare de taxo hac traduntur, ut ab ea caueamus.

Apocynum.

CAP. LXIX.

A Pocynon, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis viticulis constans, male olentibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosus, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamē, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turgēt. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, ligiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cilio data, & protinus eorum coxendices resolunt.

Nerium, seu rhododendum.

CAP. LXX.

N Erion aliqui rhododaphnem, alij rhododendron vocant, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusq;: flore in resam conformato: fructu & nucis græcæ simili, corniculato, qui patet factus quandā lanosam naturam ostendit, spinarū pappos representantē, radice longa, acuta, lignosa, gustatū salsa: nascitur in æmænis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis

Amygdala.

ven

venena sunt: hominibus verò cōtra serpentii mor-
sus præsidia, è vino pota: eo magis ruta addita: im-
becilla etiā animantes, vt pecus & capra, si aquā
bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Fungi. CAP. LXXI.

Fungorū differētia duplex: aut enim mandun-
tur, aut perniciosi sunt. Multis de causis vene-
nosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo
sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta
serpētis cauernā, arborēs ve, quæ priuatim pariunt
noxios fructus, erūpant. Cōtinent qui tales sunt, ne
scio quod strigmentum cōcretamq; pituitā, terraq;
eruti, quā celerrimē computrescunt, atq; marcore
vitiātur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem
in iuribus gratiā habent: largius tamen sumpti no-
cent, & agrius concocti stragulant, aut choleram
morbum citāt. Remedio est nitri potus, aut lixiuiū
cum acida muria, aut feruesfacta satureia, aut ori-
gani insculū: debellantur etiam gallinacci simi po-
tu ex aceto, aut eiusdē delinctu cū melle multo. Cor-
pus alunt. sed agrē dissoluntur, cū magna ex par-
te integri ipsi, cum recrementis alui reiciantur.

Colchicum. CAP. LXXII.

Colchicon, aliqui ephemerum, sunt qui agre- Censetur
stem bulbum vocant, autumnū exitu florem Hermoda
adit croci, candicantem, ab eo tempore, folia bul- Etylus offē
bi, sed pinguiora: caulem palmo alium: ferentem cinarum.
rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem,

quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis invenitur: bulbus eius mediam habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. CAP. LXXIII.

Fortè no-
strum Li-
lium cōual-
lium.

Ephemerum, aliqui sylvestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam: nascitur in sylvis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est, muralis herba.

CAP. LXXIIII.

Officinis
Parieta-
ria.

Helxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis insunt hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos velut semina aspera, adhærentia vestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturā habent, qua ex causa sanant illius sacros ignes, adusta, condylomata, pano-
inci

incipiētes, tumores, inflāmationesq; Succus eius cū cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt, cōmodē illinitur, imponiturq; podagris cum hircino adipe aut cerato cyprina: veterē tussim emendat mīstar cyathi haustus: tonsillis inflāmationē sentientibus vtiliter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

Alfine. CAP. LXXV.

Alsinem, aliqui anthyllion, nōnulli myos ota Vulgō mor vocant, quoniam musculorū aures folia imi sus gallinae tantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alfine dicta est. Hæc erat eadē quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs minoribus, *nec hirsuta. cum teritur odorem *Ex Plin. cucumis reddit.] Vim refrigerandi astringendiq; adiecta. obtinet: oculorū inflāmationibus cū polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur: quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

Lens palustris. CAP. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluente. Officinæ muscus lenticula similis, refrigeratoriæ natu- lenticula ræ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni aqua. sacro, & podagris, illinitur per se, & cum polenta: glutinat, & procidentia puerorum interanea.

Semperuium, seu sedum.

CAP. LXXVII.

Semperuium magnum idē nominatur, quoniam perpetuō folia vircant: cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pro-

gues, crassitudine pollicari, virentes, characiae
 thymali modo infecti: folia pinguis, & carnosae,
 *Vox adeli magnitudine pollicari, in cacumine lingua simi-
 ta ex Plin. lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia
 inuicem, ita ut ambitu effigie imitentur oculi: na-
 scitur in montibus, & testaceis: supra domicilia
 etiam feritur. Eius vis refrigerare, & adstringere:
 medentur igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt,
 oculorum inflammationibus, ambustis igni, poda-
 gris per se, & cum polenta illita folia. Succus capi-
 ti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfundi-
 tur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dy-
 senteriam, aluiq; profluvia, teretes tinea potus in
 vino excutit: subditus in vellere, mulierum abun-
 dantiam sistit: succus oculorum lippitudinibus, san-
 guinis vitio conceptis, inungitur. Semperuium par-
 ticularis. uum in petris, parietinis, & maceris, nec non scro-
 bibus opacis nascitur, caulibus ab una radice mul-
 tis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis,
 pinguibus, mucronatis: caule a medio emicante, pal-
 mum alto, umbellam herbidosq; flores, & tenues
 gerente. Folia eiusdem cum priore viribus praedita
 sunt. Tertium videtur semperuii genus, quam ali-
 qui andrachnen agriam, aut telephion vocauerunt,
 Romani illecebram, pusillis, crassioribusq; folijs,
 hirsutis, portulacae proximis: nascitur in saxis. Vis
 ei excalfactoria, aeris, exulcerans: illita cum axun-
 gia strumas discutit.

Vmb

Vmbilicus veneris. CAP. LXXVIII.

Otyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in
 Jacetabuli formã tornato, ineuidenter concauo,
 cui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice
 uic modo rotunda. Succus cũ vino circũlitus, in-
 llatusve, contecta genitalia nudat: inflammatio-
 bus, sacris ignibus, strumis, perionibus, illitis au-
 liatur: stomachi ardorẽ refrigerat. Folia cũ radi-
 comeſa, calculos frangũt, urina cient, hydropicis
 melle dantur. Herba vtũtur ad amatoria. Est &
 terũ genus eiusdem, cymbalion aliqui vocãt, pin-
 nibus folijs, latioribus, ligularum modo densis cir-
 radicem, medium oculi ambitum describentibus,
 in maiore semperuino, adstringẽtis gustus: cau-
 ulo tenui, in quo flores & semina hyperici: radi-
 mainſcula. Facit eadem, quæ semperuium.

Vrtica.

CAP. LXXIX.

Vo vrticæ genera: sylueſtris, asperior, la-
 tioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini,
 minore. Altera non æquẽ aspera, minuto se-
 mine. Folia & trinsque illita, canis morſibus, addi-
 sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sor-
 da vlcera, & quæ cacoelhe vocantur, item lu-
 ta, panos, tubercula, parotidas, suppuration-
 esq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: fa-
 ciunt ad profluuium narium, cum succo trita, &
 eribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum
 yrrha, & impoſita: procidentes vuluas, recen-
 tia

tia contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passio-
 venerem stimulat, vulvæ ora patefacit: cum meli-
 delinctum, orthopnœa, lateris & pulmonum in-
 flammationibus prodest: thoracem expurgat: ero-
 dentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum con-
 chis folia, aluum emolliunt, urinas mouent, infla-
 tiones discutunt: decocta cum ptisana, vitia pecto-
 ris extrahunt: mulierum menses euocant, cum my-
 rha modico pota. Inflammatione turgentem vnam
 gargarizatus succus exprimit.

Galiopsis. CAP. LXXX.

Galiopsis, frutex in totum caulem, & folia li-
 bet vrtica, læuora, & quæ grauē odorē trit-
 reddant: flore purpurascente, tenui: nascitur cir-
 sepes, ædificiorū areas, ac semitas ubique. Folia, ca-
 les, semen, succusq; duritias & carcinomata disci-
 pant, strumas, panos, & parotidas discutunt.
 Oportet his die tepidū ex aceto cataplasma impo-
 nere, & eius decocto fovere: ad putrescentia, gan-
 grenas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion. CAP. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in com-
 trahendo lacte, coaguli vicem impleat: ra-
 mulum foliumq; habet aparinae simillimum, re-
 ctum: florem in calumine luteum, teruem, den-
 sum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustis illi-
 nitur, sanguinis profluvia sistit. Ceraio rosaceo
 galion admiscetur, insolatum vsquedum albesca-
 la.

LIBER QVARTVS. 35

Bitudines reficit. Radix venerem concitat. Natur in palustribus.

Senecio. CAP. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, eruca modo per extremitates diuisis, minoribus multò: luteis floribus, qui celeriter secti vaneſcunt in pappos. Nomen verò ſibi veniit, quoniam flores capillorum ritu, vere canent. radice ſupernacua: naſcitur maximè in maris, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per ſe ſe, tium & ſedis inflammationes ſanant: quin & ex una thuris medentur, cū reliquis vulneribus, tū quæ nerui acceperunt. Illiti per ſe cum aceto pappi dem munus præſtant: verum: recētes epoti, ſtruant. Totus caulis, ſi coctus in paſſo potui detur, iachi dolores à bili contractos, perſanat.

Thaliætrum. CAP. LXXXIII.

Thaliætron folia coriandri habet, pinguiora paulò: coliculus rutæ craſſitudine, in quo fo. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem lucunt. Naſcitur maximè in campeſtribus.

Arinus muſcus. CAP. LXXXIII.

Arinus muſcus naſcitur in ſcopulis, teſtaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillacaulis expers. Præcipua ei ſpiſſandi vis, & colones cohibendi, & podagras, quas refrigerare ſit.

Phyc

Phycus marinus. CAP. LXXXV

Phyci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagrimodum, sed etiā inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem: verūm ijs vti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fūco quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit ridicula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXV

Potamogeton, folium beta simile, hirsutum paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra iterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est quod palustribus, & aquosis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatans & sine radice uiuit: unde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora habet folia: quae refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera quae inflammatione minantur, intumescere non sinunt: igitur sacris & tumoribus ex aceto illinuntur.

Vulgatum millefoliū. **S**tratiotes millefoliū. CAP. LXXXVII
millefoliū. Stratiotes millefoliū exiguus frutex, palmi

adine, aut amplius assurgit: folijs auicularum
 mas imitantibus, breui admodum dissectoq; fo-
 rum exortu. Folia syluestre cuminum simulant,
 fertim breuitate atq; scabritia, hreniora paulò,
 siore umbella, & pleniore. Surculos in cacumi-
 gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flo-
 paruos, cādulos. Nascitur in asperis agris, præ-
 uè circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera,
 entiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

Verbascum.

C A P. LXXXIX.

✓ Erbascum differentias summas habet duas, Tapsus h
 hoc nigrū, illud album: in quo mas & fœmē batus vul-
 intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, gò.
 osiora multò, & latiora, candida: caulis albus,
 litalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut
 pallidi: semen nigrum: radix longa, gustu acer-
 crassitudine digiti: nascitur in cāpestribus. Ver-
 scum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs,
 angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrū pror-
 albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret. * Sic Plin.
 io. Syluestre folia fert saluæ, a'tas virgas, & qui ξυλῶ-
 ignosus, & circa eas ramulos quales marrubij: A'is vide-
 res luteos, auri æmulos. Sunt & phlomides duæ, tur legisse.
 sutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis ap Græcos co-
 latur: ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut dex A'ev-
 aternis, vel paulò pluribus, hirsutus, crassis, pin- A'p'ō A'is,
 ibusq;: apta ad lucernarum lumina. Radix prio id est, arbo-
 m duarum adstringit: quare quod magnitudine rescentes.
 ludis

ludicrum talum aequet, in alui profluuiio, conueni-
 ter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fr-
 ctis, antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolore co-
 lutione mitigat. Verbasum cui flos aureus, capi-
 los tingit, & quocunq; abijciatur, blattas in se ce-
 rrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, &
 inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vi-
 & melle illinuntur: cum aceto quoq; vulneribus
 medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxili-
 Syluestris folia ambustis igni, sunt cataplasmati-
 Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, ar-
 dos ficus omnino non putrescere.

Aethiopis.

CAP.

XC.

Aethiopis folia habet verbasco similia, perqu-
 lirsuta, densaq; in orbem circa radicem imar-
 redacta: caulem quadrangulum, crassum ac sca-
 brum, similem apiastro, aut arctio, multis conca-
 uum alis: semine erui magnitudine, geminum, in vn-
 conceptaculo: radices ab eodem caespite numero sa-
 longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescunt
 duranturq; ut cornua possint videri: plurima na-
 scitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aux-
 liatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuri-
 ticis, arteria scabritijs, decocta radix, et pota: quin-
 & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

Arction.

CAP.

XCI.

Arction, aliqui potius arcturon vocant, si-
 milis est verbasco folijs, nisi quod lirsutior
 ra,

ta, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine
 humini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Deco-
 fla cum semine radix in vino, dentium dolorem
 mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta per-
 uionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxen-
 ticum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & Vulgò lap-
 hirsutiora, nigriora & crassiora: caule albi- pa maior,
 antem, quanquã & interdum vidua caule reperia- & Barda
 ur: radice grandi, intus cãdida, foris nigra. Hac na-
 trachma vnius pòdere pota, cū pineis nucibus, pu-
 ulenta & cruenta extusientibus auxiliatur: trita
 dolores à contorsionibus artuum cōtractos, illitu se-
 lat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Petasites. CAP. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudi-
 ne pollicis, à quo prægrande foliū, galeri mo-
 lo amplum, cui fungus dependet. Contra phage-
 lenas, & vlcera, quæ cacoëthe vocant, efficaciter
 llinitur.

Epipactis. CAP. XCIII.

Epipactis ab alijs helleborine, parua herba, exi-
 gnis folijs. Iocineris vitijs vtilis, & contra
 enena pota.

Capnos, seu fumararia. CAP. XCV. Officinis

Fumararia fruticosa herbula est, prætenera, co- fumus ter
 riandri similis: folijs candidioribus, vndiq; r.e,

numerosis, cineracei coloris : flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemque unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas pedibras renasci prohibet. Commanducata herba biosam urinam trahit.

Lotus urbana.

CAP. XCV

Lotum urbanā alij trifoliū vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nuleculas, ceterasque caligines discutit.

Sylvestris lotus.

CAP. XCVI

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs trifolipratenfis: semine fœnigræci, multò minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum mel peruncta expurgat: trita per sese aut cum malui semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus.

CAP. XCVIII

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, saepe maiore: in quibus folia fœnigræci, aut loti trifolia minora, dorso medio prominente. Ea dignis trita erucam olent, gustataque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

Lo

LIBER QVARTVS. 397

Lotus Aegyptia. CAP. XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumini inuadatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, * lilio simili, quæ tradunt occidete sole com * *κρίνον*
rimini occludi q; ad ortu autem aperiri: addunt q; nō *κρίνον*
caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortu so-
lis emergere. Caput quale papaueris, maximum: et
multus grana ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, &
in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali co-
ronei similitudine, quæ cruda cocta q; manditur:
lecocta q; lutei oui qualitatem exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro millefolio, quod
Paulo antè stratiotem millefolium esse
nonnuimus.

Millefolium CAP. C.

MYRIOPHYLLUM, siue millefolium, caulis est
tener, singularis, unica nixus radice: pluri-
us folijs, lauibus, fœniculo similibus: vnde no-
men accepit. Caulis flauescit varius, ac veluti ex
industria deliniatus: nascitur in palustribus. Vul-
tera recentia ab inflammatione vindicat, si vel vi-
de, vel siccum ex aceto, oblinatur: præcipitatis in-
otu cum aqua & sale datur.

Myrrhis. CAP. CI.

MYRRHIS, simillima est cicuta, caule fo-
lijs q; radix ei oblonga, mollis, rotunda, odo-
rata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, pha-

longiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatq; à purperio femina subuenit et phibificis cocta in sorbitione. Aiunt quæ eandem bis die terve potam ex vino in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obistere.

Myagrū.

CAP. CII.

*ΤΗΛΙΔΙ,
non τρα
Χήλω.
MYagrū, aliqui melampyron vocant, heri
est surculacea, folijs rubie pallidis, tripec
nea: semen oleosum. * fenogreco simile. Quod
iusum igni torrent, perunctisq; virgis ad lucern
rum lumina vtuntur hoc pingui, scabritias corpo
ris lauari, atque expoliri constat.

Onagra.

CAP. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex
arboris instar, prae grandis, amygdalino fi
lio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, ni
gno: radice candida, longa: cum siccata est, vinu
olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua rad
maduerit, in potu data feras mitigat, & cicui
facit: illitu quoq; tetra vlcera mulcet.

Cirsium.

CAP. CIIII.

Censetur **C**irsium, caulis est tener, duorum cubitorum
buglossa of triangulo similis: ab imo foliola, rosæ spe
ficinorū. referentia: anguli spinosi, per interualla molles:
Plin. mino lia buglossō similia, & maiora, subcandida, modi
ra. hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen ca
lis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in su

LIBER QVARTVS. 350.

io purpurea, quæ solvuntur in lanugines. Red-
m huius loco laboranti adalligatam, dolores va-
cum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis. CAP. CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in
cacumine habens purpureum, luteo in ve, per
ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, fo-
lic stella modo radiatis: quæ autem caulem cir-
cundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti sto-
macho, oculorum inflammationibus, procidua se-
ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpu-
um florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-
comitiale malum sentientibus, opitulari. Ingui-
in inflammationi recentem illinire convenit. Si
ridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, &
guinibus adligetur, dolore liberat.

plin. l. b. 27.
cap. v.

Isopyrum. CAP. CVI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinem vo-
cant, quoniam folium quod est aniso simile in
impinos torquetur, capitula sunt in summo cau-
tenuia, plena seminis, melanthij gustum imi-
tis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia,
nec ex aqua mulsæ bibitur: hepaticis, & san-
inem excreantibus vtile.

Viola purpurea. CAP. CVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus,
tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cau-
culus à radice medius prodit, in qua flosculus,

10v ari 6

suauissime olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se et ex polenta illinuntur aptissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti.

Cacalia.

CAP. CVIII

Cacalia, quae leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, flores ferens robori aut oleae simile: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus scabritibus arteriae, ineditur. Grana quae post excusum florem innascuntur, trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium.

CAP. CIX.

Bunion caulem adit quadrangulum, procerrimum, digiti crassitudine, in quo ramuli minimis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proximè: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, excofacit, secundas euocat: lienis, vesicae, renibus utile. Tam humidi quam sicci, expressique succi caulibus, folijs, radicibusque usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunion palmarum alitudine fruticat in Creta, folia ramulosque nappi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriae laterumque dolores, sanant quaterni rami eius potati in aqua: illiti quoque cum sale & vino, repente strumas discutiunt.

Cl

Chamæcissus.

CAP. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longiore. ramulus à radice quinque senisve, dorantibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt inuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in qua cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, reum morbum purgant.

Clamæleuce,

CAP. CXI.

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, herba virēs, incuruis folijs, surculisq; flore roiceo. Buglossum, seu lingua bubula.

CAP. CXII.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aciunt eam quæreis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, otamq; contra tertianos horrores prodesse: quæuatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. heram abscessibus utilem esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, iugrius, asperum, ubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum, nimi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & purpureos flosculos ædēs, non esse verum ac legitimum, historia ei⁹ apertissimè indicat.

Z 4

Cynoglossum. CAP. CXIII.

Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet
 archiora, minora, lanuginosa: caule vacat,
 humi sternit: prouenit in sabuletis. Folia cum suille
 adipe veteri, medetur morsibus canum, alopecys, &
 ambustis. Emollit alium, decoctum herba ex vino po-
 tum.

Phyteuma. CAP. CXIII.

*Struthij.

Phyteuma folia habet* radiculæ, minora: co-
 piosum semen, perforatum: radicem paruam,
 tenuem, per summa terræ nitentem: quæ ad ama-
 toria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. CAP. CXV.

Leontopodium diuim digitorum herbula est,
 folia ferens angusta, longitudine ternum qua-
 tenumve digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem la-
 nosiore flocco canescunt: capitula in summo caule
 quasi perforata: flores nigri: semine usque ad eum spiss-
 sa lanugine inuolutum est, ut sepe fallat: radice par-
 ua coheret: quam tradunt appensam ad amatoria
 prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. CAP. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habens rusci te-
 nuis figura, & spinosam comam, & in sum-
 mo seu linguas ex folijs exeuntes. Capitis dolorem
 corona ex comis imposita minuit: Malagmatis ra-
 dix succusq; admiscetur.

Antirrhinum. CAP. CXVII.

Antirrhinon, alij anarrhinon vocant, herbam

caus

caule & folijs anagallidis similem: flore albo vio-
 leo, purpureo, minore tamen, ideoq; sylueſtris ly-
 mus nominata eſt: ſemine vituli narium ſimili.
 radit perunclos ea, cum oleo lilino, veniſtiores
 eri: nec vlllo medicamento ladi poſſe, ſi quis ap-
 pum geſtet.

Catanance. CAP. CXVIII.

EX eo genere vna, folia coronopi habet, longa,
 radicem unci modo pratenuē: capitula ſena,
 ptenave, in quibus erui ſemen ineſt. Areſcens in
 rram fleſcitur, & ſe cōtrahit ad ſpeciem vnguiſ
 ilui examinati. Altera mali parui magnitudinē
 eplet, radice exigua oliuæ magnitudine folijs quo
 ue oliuæ colore, & figura, mollibus, diuiſis, humi
 clinatis: ſemen, vt cicer, minutum, in virgulis de-
 ndet, puniceo coloris, multis foraminibus pertu-
 m. Vtranq; narrant in amatoria expeti. Theſſa
 æ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. CAP. CXIX.

TRipolion in marinis naſcitur locis, quæ alli-
 dit vnda, recedensq; dimittit, neque in ma-
 neque in ſicco: folio glaſti craſtore: palmeo cau-
 in mucrone diuiſo. Eius, vt tradunt, flores colo-
 m ter die mutant, mane candidi, meridie pur-
 rei, ſero punicei conſpiciuntur. Radice alba, odo-
 ra, calidi guſtus. Quæ drachmis duabus in vi-
 poſta, aquam, vrinamq; per alium extrahit. In
 edicamenta digeritur, quæ venena arcent.

Officinarū Capillus veneris. Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxi. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, comparatum, album potius, quam nigrum appareat.

Adiantum.

CAP. CXX

A Diaton, polytrichon, pusilla gerit folia similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitet, pratenuis palmū alti: radice superuacua neq; caule, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum herbae potum prodest spirandi difficultati, suspensio, lieni, & felice suffusis, & vrinae difficili. Calculos frangit, album sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & manantia capitis vlcera, ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq; decoctū eius cum lixiuio & vino infusum, idem praestat: coturnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additū. Seritur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosis, &

pa

salustribus, circa parietum aspergines, & fontium
pecus enascitur.

Trichomanes.

CAP. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis quibus
Adianton: filici simile, sed exilius: folijs laticu
a, tenuibus, in ordinē utrinque digestis, aduersis in
e, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splenden
ibus. Eadē quae & Adianton praeſtare poſſe cōſtat. Officinis
polytrichō
quod idem
tamē cum
Adianto.

Xanthium ſiue Lappa. CAP. CXXII.

Xanthium nascitur lato & pingui solo, & Vulgò lap
pa minor.
lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloſo,
pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atri
colicis habet, infecta, naſturtium odore imitantia:
fructum grandis oliuae modo, rotundum, & ut pla
tani pilula, ſpinoſum, qui contactu veſtibus ad
haereſcit. Is antē collectus quā perfectē ſicceſcat,
tunditur, & fictili vaſe reconditur. Flauos autem
facit capillos, ſi acetabuli inſtar tepida aqua ma
deſcat, mox caput, nitro antē perfrictū, illinatur.
Alij in vino tundunt, & ita aſſeruāt. Semen aptiſ
ſimē tumoribus imponitur.

Aegilops, ſiue feſtuca. CAP. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, ſed
molliora, in ſummo capite ſemina bina ter
nāve rubra, quibus ariſtē quaſi capillacea exeūt.
Illita cum farina herba aegilopjs medetur, duritias Marcello
diſcutit. Succus farinae admixtus, ſiccatur, & ſuppoſito
torundem gratia reponitur. * Bromus herba aegi
lops

lopi similis, exciccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colat par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, & liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humor imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloin ad dunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocti in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux.

CAP. CXXIIII

Glaux cytiso aut lenticulae folijs similis, qui superne virent, auersaque candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues à radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamen: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Polygala.

CAP. CXXV

Polygala palmi altitudinem petit folijs lenticulae gustu adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris.

CAP. CXXVI

Osyris, frutex est niger, ramulos ferens tenues lentos, fractuque contumaces: & in his folia quaterna, quina, senaue, ceu linu, nigra in initio vulgo appellata, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Aspera similax.

CAP. CXXVII

Smilax aspera, folia habet periclymeni: samenta tenuia, multa, rubi modo aut paliur.

acu

aculeata: arbores scandit ab imo ad summa perre-
tans, se cōoluens eis. Fert racemos exiles, qui ma-
uri rubescūt, gustumq; leniter mordet. Nasitur in
salustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia
& acini, & ante & pōst poti, venenorum antido-
ta sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucē aditis,
quid ex his tritum propinetur, nulla pōstmōdū ve-
rena nocitura. Inciditur etiā ad alexipharmaca,
id est, ad ea medicamēta quibus venena arcentur.

Lævis smilax. CAP. CXXVIII.

Lævis smilacis folia hederæ similitudinem ha-
bent, molliora, leniora, tenuiora: huius sar-
mēta nullis horrent spinis: conuoluntur arboribus,
ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exi-
guum: flores circumquaque exiliunt candidi, copio-
si, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum
arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur:
folia per autumnum decidua. Semine cū dorycnio
oto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuo-
sa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. CAP. CXXIX.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut *Officinis*
myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: fo- *Bruscus.*
lium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucro-
natum: bacce per maturitatem rubescunt, rotun-
dæ, à medio folio dependentes, ossæ intus nucleo:
cubitales ramuli ab radice exeunt, viridium modo
lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis
sim.

simili, acerbâ, & subamara. Folia & bacca in
no pota vrinam cient, menses pellunt, versu ca
los frangunt, stillicidio vrinae medentur, dolores
pitui sanant, & regium morbum. In asperis et
cipitibus locis enascitur. Decoctum radicis in
potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recen
asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari aut
sunt, sed vrinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXX

Laurus Alexandrina, folio est rusci maio
molliore, & candidiore: semine inter folia
bro, eicis magnitudine: ramos spargit in ter
Rusco dodrantes, interdum longiores: radice & sylues
myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenit
in montosis. Difficiles partus accelerat, radice po
sex drachmarum pondere in vino dulci: & stil
licidio vrinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXXX

Vulgò
Laureola. **D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ran
flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum
versus foliosis: cortex supra modum viscosus ram
vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fraci
cōtumacia, quorū gustatu os & fauces incerdun
tur: flores candidi: bacca, cū ematuruit, nigra: radi
inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit fo
lium recens vel cridum in potu, menses ciet & vo
mitus: caput inani commanducatum, sternutamentū
mouet. Bacca quindcimi pota aluum resoluit.

Cha

LIBER QVARTVS. 383

Chamædaphne. CAP. CXXXII.

Chamædaphne virgas omittit cubitales, singu-
lari ramulo constantes, rectas, tenues, leues:
folia lauri similitudine, leuiora multo, ac viridio-
re: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illi-
untur capitis doloribus trita folia, & stomachi
ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bi-
buntur. Potus cum vino succus, menses & urinã
et: idem facit pefso appositus.

Veratrum album. CAP. CXXXIII.

Elleborũ album, Latini veratrũ album vo-
cant, fert folia plantaginis aut betæ sylue. *Plin. ca-
ris similia, sed breuiora, et nigriora, *rubescentia, naliũ dor-
tulẽ cauum, quadrantalẽ, tunicis conuolutũ, quas so rubescẽ-
bdicat cum arefcere incipit: radicibus nititur mul-
tia.
s, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite ceparum
modo exeuntibus: nascitur in montibus et asperis. Ra-
dices messibus colligendæ. Optimũ habetur candidũ,
iabile, carnosum, modicẽ extentũ, nec tamen iun-
modo mucronatum, quod frangẽdo puluerẽ emit-
t. & tenuem habet medullã, gustu nõ admodũ fer-
ens, neq; salinã, subinde ciens, (huiusmodi autẽ
strangulat.) Primatũ Cyrenaicum tenet. Galaticũ
item & Cappadocicum, candidiora, & puluere
quodam obsita, celerius strangulatus mouent.
omitione autem varios extrahit humores. Colly-
ris admiscetur, quæ caliginem oculorum discu-
vit. Partus impositum necat, menses pellit, ster-

383

nutrimenta excitat, mures interficit cū melle & lenta subactū, absūmit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunis, & cū sesania, aut ptisana succo aut halica, aut lentis cremore, cū aqua mulsa, a pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victu ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medicina eius potione scriptitarunt, tum maximè à Plinide Siculo Ennēsi, cui nunc assentimur: quippe legum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari precipientes, statim veratrū offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nil periculi minatur, quòd cibo minutis nō intempestuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitus concitant subdite ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. CAP. CXXXIII

Helleborum nigrum, appellatur melampyridion, quoniam caprarum pastor, nomen Melampus furens in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur, Folia ei viridia, platana similia, minora, folijs sphondylii proxima, subassera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper flores purpurei, candidi, racematim coherentes semen cruci, quod in Anticyra sesamoides vocant.

ant: quo deiectiones molliuntur: radicibus cohaere
nigris, tenuibus, à capitulo, cepae simili confibratis:
quarum est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus
locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi pe-
ritur terris, vt ex Anticyra. Nigrū inibi probatis-
simum gignitur. Eligi debet corpulentum & ple-
num, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, frivusq;
huiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia na-
tum: attamen Heliconium praecellit. Veratrum ni-
rum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasq;
datum per se, aut cum scammonia, & tribus obo-
is, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente &
usculis, quae purgationis causa sumptitantur. Pro-
dest morbis comitialibus, melancholicis, insanienti-
bus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses in-
litum trahit, partus necat, purgat fistulas imposi-
tum, & tertia die detractum. Item contra graui-
tatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alte-
um aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem
inat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & ce-
rino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex-
sceto medetur: detium dolorem collutione mitigat:
rodentibus medicamentis commiscetur: hydropi-
corum ventri vtilissimè imponitur factum ex eo,
farina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum
roximè radices vitium, vinum purgandi faculta-
te donat Huius resparso domos expiari arbitran-
tur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem,

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquila volatus, aduolare enim non sine periculo tradunt: namq; si avis effossione hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, auguriū est. Celeriter effodiatur oportet, quoniā halitus caput aggrauat: quapropter, ad id arcēdum, fossuri, allium praesumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxae opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnū. CAP. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut ruta: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cetera sesamæ simile. Vētre detrahit: datur tritū ad bilis pituitaq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sequiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi parua cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahibilem pituitasq; semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Sylvestris cucumer. CAP. CXXXVI.

Vulgò Cucumer asinus.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à sativuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmex

menta satini refert: radice candida, magna: nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totū amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto, & illita eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget, nigri cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, lulem pituitamque deiciunt, praesertim in hydropicis: (deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet) radicis selibra, in vini praesertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex o terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi ernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, Elaterii. seruantur nocte vna: postridie imposito supra craterem rariore cribro, vtrisque manibus prehen- si, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in obiectum vas exprimitur: simulq; carnosum quod praesit cribro, quò facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere sinuntur, atque in vicinam eluim demittitur. Coaceruata autem in cribro gmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pres-

sa abijciuntur. Humor in pelui agitur, & linteo
 opertus, soli exponitur: dumq; steterit, tota superna
 tans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc
 verò identidem fieri solet, donec existens aqua lique
 scat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario
 suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt
 qui ad hauriendam protinus succi abundantiam,
 cribratos cineres humi inspargant, & medium ca
 viates, triplicatum linteum obtendant, per quod ela
 terium cum sua humiditate diffundit, siccatumq;
 in pila, vt dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci
 aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in no
 uissima lotionem, mulsam aquam respergunt. Elate
 rium optimum esse constat, laue, non ponderosum,
 cum candore leniter humectum, gustu amarissi
 mum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, faci
 le flagret. Porraceum tamē scabrumq; si turbidum
 spectetur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue &
 vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo a
 mylum immisceant, vt candorem ipsum & leuita
 tem imitentur. A bimatu ad decemium deiectioni
 bus vtile est. Integer modus, obolus est: minimus, se
 miobolus: pueris, chalci duo. siquidem copiosius, peri
 culum adfert. Bilem ac pituitam vtriusque parte ex
 trahit. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in
 animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, &
 stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitu
 dine catapotia dato, postea cyathus unus aqua re
 pide

pida sorbeatur: ad citius tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subiectas lingua partes penitus me penna obliuio: quod si quisquam difficiliter euomat, oleo aut unguento irino resoluito, somnum inhibeto. Porro his qui eximie vacuantur, continue vinum, & oleum dari conuenit: etenim vomendo restituntur. Quod si vomitiones non finiatur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Cui elaterium menses, & partus enecat, in pectore subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissime anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscae, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosque: fert florem glastri: & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluorem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua malsa dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent, prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuo potui dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheu-

matissimum gingiuarū sistit: vlcera oris manantia,
cum melle sanat. Vrētibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

Thapsia nomen ideo accepit, quòd in Thapso
eiusdem nominis Insula, primum inuēta sit.
Tota verò natura ferula similis est: graciliore cau-
le: folijs fœniculi: umbella anethi in cacumine, à sin-
gulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale fe-
rula, latiusculum, sed aliquanto minus: radix foris
nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro ve-
stita. Lactis extrahendi ratio hæc est: Facto in am-
bitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in forni-
cis speciem in se excavata, cooperitur, quòd merus
succus confluat: oportet illuc sequenti die se cōferre,
& congestum succum extrahere. Tunditur etiam
radix in pila, & succus organo per quallum ex-
pressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium vñā
terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc au-
tem interest, quoniam qui ab radice manavit, gra-
uius olet, & humidus permanet: è folijs autem ex-
tractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam sen-
tit. Qui succum colligit, stare debet non obuer-
sus vento: aut potius, cum dies apricus est, & à fla-
tu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies ve-
hementer intumescit, nudaq; corpora innadunt pu-
stula: ob id prius liquido cerato, & adstringente,
nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam
cortex radices, quàm succus, purgandi vim habet,



& lacteus succus in aqua mulsa potus: nam utrim-
 que bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni obo-
 li, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni
 oboli: lactis, obolus unus: quod eo amplius assumi-
 tur, periculosum est. Huiusmodi purgatio convenit
 suspiriosis, et diuturnis laterum doloribus, reiectioni-
 busq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit
 vomere. Tam radix, quam succus omnium maxime,
 quæ pares cum eis vires adeptæ sunt, vim habent ex-
 tractoriam ex alto, ubi ex imo aliquid evocandum
 est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde
 de succo illitione, aut radix recens affricu, alope-
 tias explent. Radix succusq; cum æquis cera thu-
 risq; portionibus, sugillata luoresq; tollunt: sed non
 plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua ma-
 ris calida foveatur. Vitia cutis in facie emendat, cum
 melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit,
 perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum,
 laterum, pedum, articulorumq; valetudinibus uti-
 liter illinitur. Valet ad integendam colic glandem,
 quæ qui natura, non circumcissione, curti sunt: tumo-
 rem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus, præ-
 putij iacturam refarcit.

A N N O T A T I O.

*Sine folijs.] Spartium, ut in agro Mō-
 pessulano eius feracissimo sæpe observa-
 ri (à G. Rondelletio eius loci clarissimo
 Medico primum admonitus) cum primum

erūpit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad cōsistentiam perueni (quo solo fortassis tempore vīsum Dioscoridi) exuitur, adeo vt ramuli eius iunctei deinde appareāt. Est tamē hoc diuersum planē ab eo, cui⁹ Plin. lib. xix. cap. 11. meminit. Cæterū an spartū hoc loco depīctū, sit idem cū Genista Latinorum malo equidē dubitare cū Plinio, quā eorū iudicio subscribere, qui diuersi generis plātas esse cōtendunt: & pro Genista fruticē quendā rebus alligādīs (quo in illa tamen requirit Plinius, & Marcus in Georgicis cum lentam appellet, satī innuit) parum idoneum ostendant.

Spartium. CAP. CXXXIX.

Spartium frutex est, longas ferens virgas, & sine folijs firmas, fractu contumaces, quibus vires vincuntur: semen lenticula, in folliculis phascolorum modo nascens: florem, vt albæ viola, luteum. Purgant per superna vehementer, hellebori vice, contra periculum flores, & semina, quinīs obolis in aqua mulsā pota. Semen deiectionem mouet. Ramus in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, cyathi modū ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clysteri. Strigmenta autem elicit cruenta.

S.

Silybum.

CAP. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Hac recens cum sale oleoq. cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, vomitiones et.

Glans vnguentaria.

CAP. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myrica similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graccarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, recens, cadi- da quae facile delibretur. Ea drachma potere po- ta, lienem absuit: cum lolij farina, & aqua mulsa, po- dagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitiligines & nigrae cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varot & papulas in facie: & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite: resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciat. Cor- tex eius magis adstringit: verum iussa & expressae succus abstergentibus medicamentis adycitur, quae aduersus pruriginis & scabritias idonea sunt.

Narcissus.

CAP. CXLI.

Narcissum sunt qui ut lilium, liriū appel- larint, folia porro similia, tenuia, multo mi- nora, & angustiora: caulis vacuus, & sine fo- lijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

croceus, in quibusdā purpureus: radix intus alb. rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrū, longum: probatissimus nascitur in montibus, suau. dore: ceteri porrum imitantur, atq; herbaceum v. rus olent. Radix cocta, siue estur siue bibitur, vomitoria est: ambustis igni prodest, cum exiguo mel trita: praecisos nervos illitu glutinat: luxatis malleis, diuturnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposta, subuenit: vitia cutis in facie, vitiliginēsq; cum semine vrticæ, & aceto emaculat: ceruo & melle, vlcerum sordes expurgat: abscessū rumpit concoctioni repugnātes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. CAP. CXLI. III.

Hippophaës, quo fullones vestes interpolant in sabulosis maritimisq; nascitur, surculace frutice, vndiq; denso & largo, folijs oleæ, longioribus, mollioribusq;: inter quæ cædlicantes spinæ emicant, siccae, angulose, interstiti quodam distantes flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, molli, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad vsum recoditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasq; detrahit, oboli pondere: eru. verò farina subactus, quatuor obolis, cū aqua mulsa. Frutex cum radicibus siccatus iudicatur, & cum aqua

que mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice
herba liquamētum depromitur, vti in thapsia:
ius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIIII.

Hippophæstum, id quod aliqui hippophaës ap-
pellant, nascitur eisdem locis quibus hippo-
phæës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, si-
cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis:
lijs parvis, spinosis: radículas habens molles, cras-
sæ. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur,
& exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in a-
qua mulsæ, aquam pituitasq; detrahit: priuatim co-
stitalibus morbis, nervorū vitijs, & orthopnææ
provenit huiusmodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

Rici, aut croton, nomen accepit à ricini ani- Vulgò Cæ
malis similitudine: arbor provenit parvæ fi- taputia
s altitudine, folio platani, maiore, laeviore, & ni maior.
iore: ramis, candicibusq; cauis, in arundinis mo-
m: semine in vuis asperis, quod corticibus exu-
m, ricinum animal repræsentat: ex quo oleum,
mine citinum, exprimitur, cibis fædum, lucer-
emplastrisq; utile. Grana triginta numero
rgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamq; per
um extrahunt: vomitionesq; movent, sed in-
cunda admodum est, & molesta purgatio: siqui-
m stomachum vehementer subvertit. Tusa &
posita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat.

Fol

Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum
tumoresq; leniunt: rigentes mammæ cohibent: e-
dem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali.

CAP. CXLV

Tithymali genera septem, quorum mascul-
characias appellatur, ab aliquibus amygo-
loides: alter, myrtites, qui fœmina existimat
eūq; myrsiniten aut caryiten vocant: tertius, pa-
lius, quē tithymalida appellarunt: alius, helio-
pius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: sep-
mus, platyphyllos dicitur. Characiæ caules sup-
cubiti altitudinē attolluntur, rubri, lacteo succo a-
acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustis
ribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pen-
in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua
neolæ solioli balnearū similes, in quibus semen
tinetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus
uum purgat: trahit pituitam bilemq; , binis ob-
in posca sumptis: & cum aqua mulsa, vomitio
mouet. Appetente vindemiarum tempore, suc-
congestis ramulis, mox dissectis, & vase conc-
sis, excipitur. Aliqui adiciunt farinam erui,
in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem im-
pleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternas ve-
tas instillant, ut cum his inarescant: quas ad re-
recondunt. Per se etiam iusus in pila, & in pas-
los coactus reponitur. Porro cum extrahitur,
neque quò ventus aspiet, stare quaxquam, ne-

m

mus oculis admouere conuenit: sed antequam
 ligas, corpus, præsertim faciem, collum, scro-
 nq; genitalis, adipe aut oleo cum vino perun-
 e. Fauces autem exasperat: quapropter cata-
 ia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc
 do lari: binas tamen ternasve ficos, purgatio-
 gratia sumpsisse, satis est. Recēs lac ex oleo, per-
 tos in sole capillos euellit, renascentesq; flauos,
 exiles efficit: deniq; omnes perimit. Dentiū ca-
 nis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes obli-
 di, ne suo delapsu, fauces & linguā vitiet. Tol-
 litu impetigines, formicantes verrucas, pēsiles,
 quæ thymi florē representant. Valet aduersus
 rygia, carbunculos, phagedenas vlcerum, gan-
 euas, fistulasq;. Legitur semen autumnō, & sic-
 um sole leuiter tunditur, fructuq; loco mun-
 reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia
 lei succi effectum præbent, dimidio acetabulo
 a. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepi-
 , & caseo confuso. Radix drachmæ pondere in
 thromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum
 to, dentium dolcri auxiliatur, colluto ore.

Fœmina, quam myrsinitem, aut caryiten voca-
 nt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myr-
 , sed maioribus, firr. is, in cacumine acutis, &
 ngentibus: ramulos ab radice mittit dochranta-
 fructum fert alternis annis, nuci similem, mor-
 ci gustu. nascitur & hæc in asperis. Succus, ra-
 dix,

dix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur
cultatem: sed ad citandas vomitiones invalidior
est. Aliud tithymali genus dicitur paralios, quod
tithymalida, aut mecona aliqui appellauere: nascitur
in maritimis, ramis subrubentibus, palmum
tri, quinis senisve à radice exeuntibus: folijs lini,
gustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digesti
capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut
uum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totum
cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus
conditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ,
nuioribus, rotundioribusq;: ramulis prodeuntibus
à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodr.
tali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: cap.
anetbi: semine velut in capitulis incluso: Heliosco
nomen accepit, quoniam comas cum sole circun
agat: circa oppida nascitur, potissimum in ruder
bus. Colligitur succus semenq;, ut aliorum. Eade
que superioribus vires, non tamē vsq; adeo valde

Ciparistas in caulem exit dodrantalem, vel m
iorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine
exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & i
totum nascentem piceam emulatur, vnde nome
traxit. Candido succo madet, cui eadem vis que
superioribus. In petris nascens, dendroides cognom
natur. ampliter opacat, in cacumine frondosam
spargens comam, succo lacteo prægnans, caulicul
rubentibus folijs myrti tenuioris: fructu characia

Ei

usdem effectus, cuius superiores, similiq; modo
conditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Ra-
ce, succus, & folia, per inferna trahunt aquas Pi-
nccat, tusus, & aqua insparsus. Reliqua tithy-
alorū genera quæ suprà scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. CAP. CXLVII.

Itysam specie à cyparissia differre constat,
etsi tithymalorum generi assignetur. caulis
cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: fo-
piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut pur-
reo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassa,
alida, succo referta, quibusdam in locis frutex
prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum ra-
ce, drachmis duabus data in aqua mulsæ: item se-
minis drachma: succi cum farina subacti cochlea-
um, in catapotio datur: modus foliorum drach-
mæ tres.

Lathyris. CAP. CXLVIII.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, Officinis
eamque tithymalorum numero adscribunt, Cataputia
idem emittit cubiti altitudine, & digitali cras- minor.
situdine, inanem: gignuntur in cacumine alæ, &
ia in caule oblonga, amygdalinis proxima, la-
ra, & leuiora: quæ autem in summis ramulis
erunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut
longæ hederæ figura. In cacumine fructum sum-
s surculis gerit, triplici loculamento insignem,
undum, ceu capparin, in quo grana inter-

cursantibus membranis inter se distincta contine-
tur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus ex-
untur, candida sunt, & gustu dulcia: Nullus rai-
cis vsus. totus frutex lacteo succo turget, uti tithy-
malus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum
ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua
frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pitui-
tam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus
eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut olei
bus folia decoquuntur adeo sdem effectus.

Peplus.

CAP. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs par-
uis, ut ruta, paulo latioribus: rotunda coma
ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs ro-
tundo, minore quàm cædidi papaueris: pluribus se-
tet auxilijs. vineam radicem habet, superuacua
ex qua fruticat: nascitur inter vites, & in hortis
Colligitur mæsis: siccatur in umbra, & conti-
nuè versatur. Fructus tussis & feruescentis recon-
ditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in
hydromelitis cyatho poto. obsonijs inspersa contur-
bat aluum: muria conditur.

Peplis.

CAP. CL.

Pepelis, quam aliqui syluestrem portulacæ
vocant, Hippocrates peplion, in maritimi
maximè nascitur, latè opaco frutice: candidi suc-
ci pleno: folijs satina portulacæ, rotundis, infer-
niè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in
peplo

peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua,
tenui. Colligi, & repont ac dari, vti peplos, & sale
condiri solet. Easdem habet vires.

Chamæsyca.

CAP. C^LI.

Chamæsyce aliqui sycen nominant. ramos e-
mittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in
errum deiectos: folia lentis, parua, peplo, plane refe-
rentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub
olis rotundo, vt in peplo: neq; caulem, neq; florẽ pro-
nit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex
ino triti vuluæ dolores sedant, in pessa appositi: tol-
unt tumores ac verrucas omnium generum illiti: de-
doctorum cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectu
rodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur:
duersus caligines oculorum utilis, & hebetudines,
incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle
unctus. In squallidis petrosisq; nascitur.

Scammonia.

CAP. C^LII.

Scammonia, ramos abvna radice emittit trium
scabitorum, multos, pingues, & qui nonnihil
crassitudinis præ se ferant: folijs helxine, aut he-
raceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangu-
latis: flore candido, rotundo, in calathi modum ca-
pitato, graneolente: radice prælonga, crassitudine cu-
culi, candida, graui odore, succo grauida. Legi-
tur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix
testitudinis speciem cultro excanatur, quo fit vt
cauum confluat succus, qui conchis demum ex-

Bb

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis iugladiū folijs: profundum
 succū, siccatumq; extrahunt. Laudatur autē scam-
 monium leue, nitidum, rarum, & colore quā si-
 millimum taurino glutini, fungosum, tenuius si-
 stulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Ne
 attendere solū par est, si linguæ tactu albescat (ho-
 enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymal
 lacte) sed longe magis antea narratis. item si non
 vehementer linguā exurat, id quod misti tithymal
 argumentum est. Natione autem Syriacū & Iu-
 daicum deterrima habentur, grana, densa, erui fa-
 rina & tithymalo vitiata. Succus drachmæ vniu-
 aut quaternū obolorum pōdere haustus, ex aqua
 pura vel mulsa, per inferna bilem & pituitā ex-
 trahit. Ad resoluendā aluum binos obolos cum sesa-
 ma, aliōve semine, sumpsisse satis est. Dantur effica-
 cioris purgationis causa, succi tres oboli, cū duobus
 veratri nigri & aloës drachma vna. Fiunt purga-
 torij sales, drachmis viginti succi scāmōniæ, in se-
 nos salis cyathos adiectis. Horum modus proportio-
 ne viriū: integer quidem, tria cochlearia: mediū
 duo: minimus, vnu. Radicis drachma vna aut al-
 tera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli deco-
 ctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cū ho-
 deacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis vti-
 li. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus: tu-
 bereula discutit cum melle aut oleo illitus: decoctio

in

In aceto peruncta lepræ abeguntur: diuturni capi-
tis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Chamelæa.

CAP. CLIII. Officinis

CHamelæa surculosa fruticat, ramis dodran- Mezerion,
talibus: folia oleæ similitudinem habent, te- Arabum
nuora & amara, quæ gustata linguam mordet, more.
& arteriam deradunt. Detrahit pituitā bilemque;
folijs præsertim in catapotio deuoratis: nanque
luc absinthij partes, adiecta, chamelæa vna, hy-
lromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur:
a autem in ventre non liquescunt: siquidem quot-
quot fuerit deuorata, regeruntur. Folijs cum melle
ritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa.

CAP. CLIIII.

THymelæa est, qua granum gnidium, quod Granum
est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo- Gnidium.
inum vocant, quoniam satiui lini frutex suapte
natura similitudinem referat. Virgas ædit per-
ulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitu-
line: folijs chamelæa, angustioribus, & pingui-
oribus, viscosis, gummosisque; si mordeantur: flore
andido: fructu myrti in modum rotundo, qui in-
ter initia viret, & tandem rubescit: involucri fru-
tus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per
nferna bilem, pituitam, aquasque; detrahit, si vi-
nti granorum pars interna bibatur: verum fau-
es adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in vna
icino dari debet, aut melle cocto obductum deuo-

rari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorū appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recodi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo cum diluta vini portione, aquam extrahit: medicarius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelæa farina vnae acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasitur in montibus et asperis. Hallucinatur, qui coccon gnidium fructū esse chameleæ existimant, decepti qualdam foliorum similitudine.

Sambucus.

CAP. CLV.

Sambuci duo genera: vñ in arborem assurgit, surculos spargens arūdinaceos, teretes, canos, cādicantes, proceros: folia iuglādis, terna quaternave, ex intervallis circa ramos exeūt, graua odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorū cacuminibus cauliculisq; circinate umbellæ, quæ florē candidum pariunt, mox acinū terebintho similem, in nigredine suppurpureū, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterū genus, Chamæactē vocatur, Romanis ebulū, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandū, caule quadrāgulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex intervallo lōgioribus, geniculatum expāsis, pinnatisq;, graneolentibus, in ambitu seruatis: muscario sambuci: flore & acino eiusdem
rad

radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem
 viriusque vis, & vsus exiccans, aluo detrahens
 aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more co-
 quuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Cau-
 les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix
 in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiu-
 uat: prodest viperarum morsibus, eodem pota mo-
 do: vulvas emollit insidentium decocto. patefacit
 earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino
 poti eodem funguntur munere: denigraunt capil-
 los illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex polenta
 illinātur, inflammationem mitigant: ambustis
 & canis morsibus illitu prosunt: vlcera quæ dehi-
 scunt in fistulam, agglutinant: ijs qui podagra
 tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt
 illita folia.

PICNOCOMUM. CAP. CLVI.

Picnocomon constat eruce folijs, acrioribus,
 scabris & crassis: caule quadrangulo: flore
 cymy: semine marrubij: radice nigra, aut palli-
 da, rotunda, exigui mali figura, terram redolente:
 nuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia
 & tumultuosa facit, drachma instar potum: tu-
 mores discutit, illitum cum polenta, & spicula, ad-
 uelosque corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tu-
 ercula, panosque discutunt. Radix eius in aqua
 nulsæ duum drachmarum pondere, aluum soluit
 & bilem extrahit.

Apios.

CAP. CLVII.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs ruta, oblongioribus tamen & angustioribus, herbaceis semine paruo, radice * hastulae regiae, in formã pyri turbinata, rotundiore tamẽ, semini fecunda, intus habet corpus candidũ, extra cortices nigros. Superior pars eius vomitione bile pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota vtrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tunc radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quousque supernatat penna selectum, exiccatur. Purgat vtriusque parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis.

CAP. CLVIII.

Coloqui-
tida offici-
um.

Colocynthis sarmẽta foliaq; satini cucumeri. Emittit per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratũ, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriã vim habet, si quatuor oboli cũ aqua mulsa melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & coquantur in catapotiu. Arfacta pile teruntur, & infusa clysteribus pro sunt neruorũ resolutioni, coxarũ doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmẽta, interdũ etiã cruorem eliciant, factus admotus enecant: dentium dolorem tollit, vna repurget, et luto oblita cũ aceto & nitro infusa uescat, hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua

m

mulsa aut passum in eadem incoquatur, & sub di-
uo refrigerat, potu crassum humore & strigmēta
alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur:
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymum.

CAP. CLIX.

E Pithymon, flos est è thymo duriore, saturē. Aliud à no-
simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in stro Epi-
eis candiculas, quasi capillamenta. Potum cum thymo-
melle detrahit pituitam bilemq; atram, per infer-
na. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis,
acetabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum
melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappado-
dia & Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

A Lypon surculosa herba est, subrubra: graci-
libus ramiulis: tenuibus folijs, flore molli, le-
ui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acris suc-
co: semine epithymi: gignitur in maritimis, maxi-
mè Libyæ, quam largissima: quanquā alibi quoque
plurima prouenit. Semen atrā bilem deijcit, si men-
sura epithymo pari cum sale & aceto sumatur: vò-
rū interanea leuiter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP. CLXI.

E Mpetron aliqui & phacoides vocant, nasci- & Galentes
tur in montibus, & maritimis, salso gustu: prasoides.
sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur.

Bb 4

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris.

CAP. CLXI

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo praelongamittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, foliis hortenſis ſolam, longioribus ac latioribus: muſco flore, & capillaceo: fructu exiguis uuis ſimili, per maturitatem rubente: rotunda eſt acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis dulcis vini aqua marina diluti, pota, humorem allicit: ideo hydropicis datur. Vuae eius, vitia cutis in facie, & maculas omneis expurgant. Enaſcentes tuniculae, cibi gratia, ſale condiuntur.

Officinis

Vitis alba.

CAP. CLXIII.

Bryonia.

Vitis alba aliqui bryoniam vocant. Folijs, vitiſculis, papinisq; ſatiram vite imitatur, ſed hirsutiora ſunt omnia: ea quos prope ſe naſta ſit frutices, ſuis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis ſpoliatur. Ex ea aſperagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrimiam fortiuntur: itaq; ulcerum phagedenis, gangraenae chironis putrentium tibiarum tædio, efficaciter ex ſalutem illinuntur. Radix corpus abſtergit, & cutem erugat. vitia cutis in facie, varosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & fenogrecæ. Eodem effectu prodeſt decocta in oleo, uſque dum liqueſcat: ſugillata tollit, & reducias com

mittit: inflammationes discutit illita ex vino: sup-
 urationes rumpit: medicamentis aptè immiscetur,
 quod carnē exest: infracta ossa extrahit, trita et im-
 posita. Datur comitialibus in potu drachma ponde-
 re, quotidie, anno toto. Prodest attonitis, & vertigi-
 bus laborantibus, cōsimiliter assumpta. Cōtra vipera-
 rum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: par-
 us necat: mentē interdum subvertit: foeminarū lo-
 nis apposita partus secundasq; morātes trahit: cit-
 rinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile
 irantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, vulsis,
 aptis, & laterū doloribus. Lienem ternis obolis po-
 ta ex aceto, triginta diebus, consumit: illinitur ad ea-
 dem cum fico. Ad mulieres in secessu decoquitur: si-
 uidē vulvas purgat, sed abortū facit. Succus è ra-
 dice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum
 qua mulsa potus. Ad psoras & lepras, semen effi-
 ciciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus
 us, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra. CAP. CLXIII.

Vitis nigra, quam aliqui nigram bryoniam
 vocant, folia fert hedera, simlaccis proxi-
 ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
 is arbores, quasi adminicula, comprehendit:
 uctus racematim coherent, qui inter principia
 irent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-
 is nigra, intus buxco colore. Viticulae quae pri-
 o germinum partu erumpunt, in olera recipiunt

tur: menses pellunt vrinas cient, lienem absumunt
vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutio
tentatur, prosunt. Radix eadem, quæ vitis alba p
stat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis
meniorum cervicibus commodissime illinuntur: l
xat is itidem imponitur.

Filix.

CAP. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flor
ex vno pediculo, cubitali longitudine exen
multifida, et lateribus pennata, subgravi odore: r
dice per summa cæspitū nigra, oblonga, silices m
tas fundente, subastringēte gustu: nascitur in m
tibus, & saxosis. Radix latus tinea excutit, sur
pta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si
scammonia aut veratri nigri totidem obolis detu
sed qui sumunt, allia prægustare debent. Laboranti
lienem incremento recreat. Radix & potu & illi
cū axungia vulneribus sagitta arūdinea factis, &
auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribit fili
quā per ambitum sata copiosior arundo coronet:
contrā, euanesceat abibit arundo, quam obsepier
multa filix in orbem cinxerit. Filix fœmina foli
est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non sin
gulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus lon
gis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flai
scunt: aliquæ etiamnum rubræ inveniuntur. Pe
lunt lata interaneorum animalia, cum melle, ech
gmate sumpto: pota cum vino, drachmis tribus

retes tineas eijciunt: data feminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si superegrediantur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repuantibus inspargitur: iumentorum cernicibus metetur. Folia recentia, in oleribus cocta mäduntur, & ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercu, almi altitudine, filici similis, subhirsuta, non enui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut nalua, ad aluum soluendum. Arida farina aquæ nulsæ insparfa, detrahit bilem & pituitam: trita uxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos fiunt.

Dryopteris. CAP. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothræ est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

Cui

Cnicus.

CAP. CLXVII

Officinis
Cartamus

CNicus folijs constat oblongis, per ambitū di-
sis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capi-
lo magnitudine gradis oliuæ: flore croci: semine ca-
dido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore
obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi succu-
cum aqua mulsa, vel iure gallinæ aluum pu-
gat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autē fiunt o-
leæ, quas placentulas vocant, adiectis succo amygi-
lis, nitro, aniso, et melle decocto, quæ aluum emo-
liunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nuc-
iuglandis magnitudinem impleant: è quibus an-
cœnam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio ten-
perandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygda-
lorum tostorum et delibratorum cyathi tres, anisi sext-
rius vnus, aphronitri drachma vna, cum carnibus
triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, &
magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

Mercurialis.

CAP. CLXIX.

Lynoçostis, aliqui parthenion, alij hermubo-
tanion appellant: folijs constat ocymi, helxi-
næ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geni-
culorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fru-
ctu femina, copioso, quandam racemorum speciem
præbente: mari, è foliorum sinu dependente, par-
uo, rotundo, cœu binis testiculis vnâ coherentibus.
frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleri-
bus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua,
epo

no lute, bilem aquamq; detrahit. Constat ut
tres gignantur, hunc facere: ut femina, illa, si a
regatione bibatur, & trita folia genitalibus ad-
oueantur.

Cynocrambe. CAP. CLXX.

Cynia aut cynocrambe, cauliculum binum do-
drantum altitudine emittit, mollem, subalbi-
m folia mercuriali aut hederæ similia, certis in-
stitijs subalhida: semen folijs adheret, paruum,
undum. Folia cum caulibus pota, aluum cient:
ribus commendantur. Ius decocti & pituitam
bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium CAP. CLXXI.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis
caudæ, unde scorpiuro ei nomen: & quoniã
ia cū sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia
ymni habet, hirsutiora, cãdidiora, & maiora: ra-
ali à radice terni, quaterni, aut sepe quini exi-
nt, multis alijs cõcaui: flos in cacumine cãdidus,
t sulfuluus incuruatur ut scorpionis cauda: ra-
e tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. De-
tū herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu
uitã bilemq; per aliu extrahit: cõtra scorpionū
tus ex vino potū, et illitū prodest: adalligatur ad
ceptus arcēdos. Aiunt per horã vnã ante accessio
s, seminis grana quatuor cū vino quartanas sin-
: tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes
rrucas pensilesq; et thymos, & epinyctidas exic-
cat.

cat. Folia infantium deſtillationibus, quas ſyria
 ſeis vocant, podagris, luxatisq; vtiliſſimè illinun-
 tur menſes cient: parius trita & impoſita pellunt.
 Heliotropion paruum, naſcitur in paluſtribus
 iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundior
 bus: ſemine, acrochordonum verrucarum modi
 penſili, rotundo. Herba cum ſuo ſemine pota, ac
 recto nitro, hyſſopo, naſturtio, & aqua, latas &
 veas teretesq; excutit. Penſiles verrucas, quæ acro-
 chordones vocantur cum ſale illita tollit.

Scorpioides hercula eſt, folijs paucis,
 ſemine cauda ſcorpionis effigie.

Illita ſcorpionum icibus
 præſentaneo eſt
 auxilio.

QVARTI LIBRI
 FINIS.

PEDANI
DIOSCORIDIS

401

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

Liber V.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.

Superioribus quatuor libris, amicissime
Aree, tradidimus de aromatibus, oleis,
unguentis, & earundem lacrymis ac
fructibus: item animalibus, melle, la-
dipe, cerealibus, oleribus, necnon de omni radi-
n, herbarum, succorum, seminumq; ratione. In
autem totius operis quinto differemus de vi-
& metallicis, à vite nostram commentatio-
m auspicati.

Vitis vinifera.

C A P. I.

Olia vitium & triti capreoli, capitis dolo-
res illitu mitigant, & inflammationem sto-
machi ardoremq; cum polenta: folia etiam per
ut quæ refrigerent & adstringant, imponi so-
t. Potus eorū succus dysentericis, sanguinem ex-
antibus, stomachicis, & gravidarum malaciæ
detur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreo
& poti. Lacryma vitium, quæ veluti gummi
candicibus concrevit, ex vino pota calculos
pellit:

pellit: illita lichenas & psoras leprasq; nitro prius
 perfrictas sanat: eadem cum oleo sæpius pilis illi-
 tis, psilothri effectū habet: maximeq; sanies, quam
 accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua
 & perunctæ verrucarum infornicationes extra-
 huntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, de-
 tractis in sede condylomatis, & thymis, illitus ex
 aceto medetur: prodest luxatis & viperarum mor-
 sibus: contra lienis inflammationem illinitur, cum
 rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorum gene-
 rum est: alterius vua non maturescit, sed flore te-
 nus cnenanthen nominatam perducit. Altera ad fru-
 gem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringēs.
 Folia, caules, & clauicula quibus repunt, vim ha-
 bent cultæ viti similem.

Vua.

CAP. II.

Vua recentes aluum turbant, & stomachum
 inflant: innocentiores, quæ decerptæ diu pe-
 pendere, (ideo quod in eis copia humoris exicca-
 tur) vtilisq; sunt stomacho, ægrisq;, atque cibi
 auditatem excitant. In vinaceis & ollis seruatae,
 ori & stomacho gratæ sunt: aluum sistunt. (sed
 vesicam & caput tentant) & sanguinem excre-
 tantibus conueniunt. Similesq;, quæ in musto fue-
 re. Sapa aut passio condita, stomachum magis in-
 festant. At quæ solem prius passa in aqua cele-
 sti conduntur, minus vinosæ sunt, siuculosis, ar-
 dentibus & longis febribus salubres. Reconditi

vin

LIBER QUINTVS. 403

inacei inflammatis mammis, rigentibus ac præ-
luris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysen-
tericos, cæliacos, & fæminas fluxione vuluæ labo-
rantes iuuat infusa: ad desefiones, ac fœtus assumi-
tur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent,
stomacho vtilis sunt: inspargitur farina testorum,
olentæ modo, dysentericis, & cæliacis, & solutis
stomacho. Vua passa alba adstringentior est: pro-
est esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac
vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: &
decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hor-
dei farina & ouo, valet ad purgandum caput: eius-
demq; gratia cum pipere commanducatur. Testis
inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum,
aut cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos,
ulceras in articulis putredines, & gangrenas, sine
nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ
conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles
ergues illita, celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. III.

Oenanthe vocatur vitis syluestris fructus,
cùm floret. Recondi debet fictili non picato,
colleatq; substrato linteo, in vmbra siccatur. Lau-
atissima in Syria & Cilicia & Phænice. Vis es-
t strictoria: quare pota stomacho ac ciuicæ urinae
utilis: aluum sistit, ac sanguinis excreationes: con-
tra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita
ficax est: capitis doloribus tam viridis, quàm sic-

Cc

ca, ex aceto & rosaceo perfunditur. sanguinolenta
vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, ori
ulcera, & genitalium neumas, trita cum melle, cro
co, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindi
cat: pessis miscetur, ad sistendum sanguinem: contri
oculorum delacrymationem, & stomachi ardores
cum polline polentæ & vino illinitur. Cinis crem
tae in testâ, candentibus prunis, facit ad oculorum
medicamenta: reduvias & pterygia, abscedentes gi
giuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium. CAP. IIII.

Omphacion, succus est acerbæ ruæ, nondum
maturescens, è Thasia vite aut Aminæ
Oportet autem ante Canis ortum, expressam mel
liginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, vj
que dum cogatur, semperq; quod ceruici vasis con
cretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq;
à subdialibus locis in lectum referre: quandoqui
dem nocturni rores ipsum concreescere non sinunt
Eligendum est flauum, friabile, vehementer ad
stringens, & linguam mordens. Sunt qui coquen
do melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, v
uam, ulcera oris, humida gingivarum vitia, puru
lentas aureis, cum melle aut passô: item ad fistulas
vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, &
mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clyster
infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, &
erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad rece

ter

lem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed paucio, & aquatior est utrumque: valde siquidem exurit.

Vini natura.

CAP. V.

Vino vetere nervi laeduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suavius est: quare cauendum ijs qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, agere coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate mediū, utraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum aegrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, arnem alit, & ebrietatem creat. Gilium, utpote modicum est, medias inter utrunq; vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum rimis laudatur album. Quin & vina sapore distat: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, ut mustum, turbat: sed nimis ineriorat. renibus, & vesicae aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tetat, & emulentiā gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & eteras fluxiones cohibet, minusq; urinā expellit. Nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina utrumque, stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner-

uos infestat, aluo aptum, à valetudine se recollig
 tibus inutile. Passum, quodvuis sole siccatis in are
 aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticu
 cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sap
 quæ sit musto igni decocto, Graci sirion aut hep
 ma appellant: nigra quidem, & quæ dicunt
 melampsithia, crassa sunt, & corpora multum
 lunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc m
 dia, medias sortiuntur vires. Omnia tamen a
 stringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus v
 nena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, &
 mitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pi
 ricon, toxica & concretum in grumos lac: ite co
 tra renum, ac vesicæ pruritus, rosiones, exulcer
 tionesq;. Inflant tamen, & stomacho aduersantur
 Priuatim, prodest melampsithium, si venter rber
 matismum sentiat. Album, magis cæteris emoli
 aluum. Gipso conditum nervis officit, caput aggra
 uat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra v
 nena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfa
 ciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimi
 ca. Quæ verò aparachyta vocant, vt quæ adm
 stam sapam recipiunt, caput implent, temulentia
 gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
 malè habent. Inter Italica vina Falernum prin
 cipem locum obtinet, quod inueteratum perquàm
 facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrin
 git, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs qu
 visu

isus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
minimè idoneum. Albana crassioribus constant
artibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emol
unt (sed concoctionem non aquè adiuvant,) &
eriosa minus infestant: vetustate, eadem auste
um saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce,
& Albano crassius: corpus & colorem alit: æ
rè tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum
est: quare intestinorum & stomachi fluxiones co
hibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inue
ratum suavius redditur, & stomacho utilis. A
rianum & Mamertinum in Sicilia aquè crassis
artibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocu
lè mueterantur, minusq; , ob suam tenuitatem,
neruos tentant. Parætypianum, quod ex Adriatico
defertur, odoratum ac tenuius est: quare libe
raliter epotum fallit, diu servat ebrietatem, & so
rem adfert. Istricum Parætypiano simile est, sed
vinam vehementius pellit. Chium tamen antedi
is mollius, & aptum potui est: bene alit, & mi
us inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medica
entis utile. Lesbium facile membra subit, Chio
lius, & alio idoneum. Ephesium eandem vim
habet, quod Phygelites nominatur: verum Asia
m è Tmolo monte, Mesogites appellatum, capitis
lores ciet, & nervos lacerat. Coum verò & Cla
memum, quoniam multam sibi maris aquam
inducant, facile corrumpuntur: flatu movent,

alium turbant, nervis officiunt. Vinum omne (reliqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetitiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget, somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutā, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argēti spiritum, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium morsus, & omnium ictus quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ac longas inflationes, rofionesq; præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionē, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, cōmodè perfunduntur. Quæ marinam non receperūt, austera & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Paretypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Mamertinū appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò & nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem pariunt, con-

pu

us augment. Tenuia tamen & auſtera ſtomacho
roſunt, & minus carnes alunt. Vetera valde te-
nua, & candida vehementius vrinã ciunt, & do-
res capitis mouent, nervosq; largius pota tentât.
In media etate, vt à ſeptimo anno, potui ſaluberri-
ma ſunt. Modus autem pro etate, & tempore an-
ni, & conſuetudine, & qualitate vini definiatur.
Nô ſitire, & modicè cibos prolui, optimum eſt præ-
ceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè aſſidua:
quidẽ obſeſſos nervos quotidie remittit: largiorq;
acutus, acutorum morborum adfert initia. Medio-
ris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè poſt
maior potus, utilis: nanq; modo quodam ex alto euo-
lunt, ſenſilesq; expurgat excretus, & per cæca cor-
ris ducit ſpiracula. Sed aquam poſt vinolentiam
bere oportet ſiquidem valetudinis alicuius gratia.
Iſte tenuientia remedium aſſert frigida. Om-
nino acites nomine, peculiariter ſit in Leſbo, ſiccata
de acri vna, paulò ante maturitatem decerpta, tri-
bus aut quatruiduo, donec racemi in rugas contra-
hantur, expreſſumq; vinum cadis inſolatur. Vim
ſtringendi habet: prodeſt diſſolutis ſtomacho, &
in dolore laborantibus: item prægnantium mala-
rie, & crudis: in peſtilentia quoque ſorptum au-
liari dicitur. Huiusmodi vina non niſi poſt mul-
tos annos bibi poſſunt. Lora, quam deuteriam,
ſi potimon appellant, fieri ſolet, adiectis metre-
tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini

metretæ extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextariis, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annis vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, coacti saepe de siderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pare aqua, & musti mensura coquuntur molli igne, donec absumatur aqua, quod, vbi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinæ & cœlestis aqua, mellis & musti pares miscent portiones decapulant, & quadraginta diebus insolant: quod ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syuestri vna nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & ceteris quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites. CAP. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: namq; aluum leuite emollit, vrinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est & corpus alit. Distat à mulso quod fit è vino vetere, austero & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinq; congios austeri musti, mellis congio & salis cyatho. Cortinis magnis, quò magis ad effectum

LIBER QUINTVS.

411

feruescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsum.

CAP. VII.

Mulsum è vetere vîno, austeroq; et bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus, corpus alit: media ætate, aluo prodest, vrinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi aviditatē reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cū vino coquunt, & ita transfundūt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, vnum mellis adijciunt: & vbi fuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

CAP. VIII.

Aqua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Cruda vtimur, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: vt ijs qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi lixere microsphyclos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiumque, quod aliqui hydromeli propriè vocant, media ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnā mellis partē additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adūciunt, ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua sauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxiū est, quoniā plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

CAP. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælum, & alia pleraq; difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur: ad hæc, quæ & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aliū enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fortius adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitis, & perniciis, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmatis ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepesacta infunditur & ad tormina: calida, psoriasis, pruritus, impetigines, lentes, & mammas rigentes, foveri vtile est: liuores fotu discutit: ad venena

LIBER QUINTVS. 413

venacos ictus, qui tremorem & refrigerationem
adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpio-
num, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in ca-
dam descendat, auxiliatur. Et malo habitu con-
fectis iam diu corporibus, nervisq; balnea ex ea uti-
les: hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates,
cruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis
aque mistione reposita, virus deponit. Sunt qui
tuum præcoquant, & ita recondant. Datur ad pur-
ganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vi-
no, aut melle: verum post deiectionem, dant galli-
nae aut piscium iuscula, ad domandam morsus a-
rimoniam.

Thalassomeli. CAP. X.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer pur-
gare constat. Temperatur autem aquis por-
tionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis,
& picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad bi-
um marinae coctæ singulas mellis adijciunt, & va-
re condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina
& mitius.

Acetum. CAP. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stoma-
cho utile, & appetentiam excitat: erumpen-
em vndeunq; sanguinem, potu in se sive sistit:
rodest alui fluxionibus coctum cum cibus: cruen-
is vulneribus inditur & inflammationes arcet,
& succidis lanis aut spongia impositum: reprimat
proc

procidentia sedis, vuluæq; : item abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cū aliquo cōuenienti efficax est: phagedæ-
nas vlcerum, nomasq; fotu continuo cohibet, poda-
gricis calido fotu, cum sulfure auxiliatur: sugilla-
tiones rapit, cum melle illitū. Contra capitis ardo-
res cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia
imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem au-
rium, & sonitus, sibilosq; feruentis vapor proficit:
institillatum quoq; aurium vermes necat. Pianos coër-
cet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admo-
ueatur, & pruritus permulcet. Contra venenatos
serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum
commodè fouetur: & frigidum, ijs quæ exurens vi-
rus eiaculantur. Calidum potum, atq; vomitioni-
bus redditum, aduersus omnia venena efficax est,
præsertim contra meconium, & haustam cicutā,
conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum,
fungos, ixiā, taxumq;, cum sale. Haustus vora-
tas hirudines, si sorbeatur, eicit: tußim veterem mi-
tigat, & recentem laceßit. In orthopnæa calidum
commodè sorbetur, gutturi fluxiones gargarizatum
inhibet, anginis & vna procidenti conuenit: cōtra
dentium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

Acetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,
salis

LIBER QUINTVS. 45

salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; vbi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comilibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ quam sepe vocant, haustum meconium, ixiâmve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis luxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur, & prociduam sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiât, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione ut gargarizatu necat: furfures & manantia catitis vlcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quatuorve cyathos, aqua calida dilutos, in articulis morbis, & inflationibus. Crassos humores, trahit. Hoc modo facitatur: Thymi tritum retabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exigua portiones in vas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumpositò linteo sub dio madescunt.

Scil

Scillinum acetum. CAP. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectioneque li-
no segmenta modicis intervallis, ne se contingant,
siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eo-
rum in aceti boni sextarios duodecim immergitur,
& vase diligenter operto septenis diebus in sole ma-
descit: post eum numerum dierum scilla eximitur, &
expressa abijcitur: defecatum acetum transfundi-
tur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinq; ace-
ti sextariis miscent. Alij citra exiccationem repur-
gantes, parem mensuram adijciunt, & senis men-
sibus macerari patiuntur. Id multo magis humore
lentitias digerit: gingivas humore pregnantibus col-
lutione stringit firmatque, & motos dentes stabilit
putredines oris, & graues habitus tollit: durat fa-
ces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, &
lympidam canoramque reddit. Datur stomachicis
agere cibum concoquentibus, melancholicis, comiti-
libus, vertiginosis, mente capitis: item vulvarum
strangulationibus, lienis incremento laborantibus
ischiadiciisque. Imbecillos admodum recreat: corpori
sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculo-
rum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium in-
fusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Ca-
uendum tamen intestinis exulcerationibus, in ca-
pitis dolore, aut nervorum vitij. Datur quotidi-
jeiunij sorbendum, inter initia exiguum, paulatin-
ada

ad augendo, ad cyathum vsq; Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vti dictum est, scillam, & sole siccata contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in videnos sextarios musti recentis ac boni demergito: vbi trimētri spatio maduerit, elutriatum vinum, obstructo diligēter vase, recondito. Licet quoq; sic humida scilla vti: In orbiculos, rapē modo, dissectā duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio: Scille dissecte & repurgate tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & oenos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defecatum & excolatum vinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs qui reuomunt cibum, et si pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, difficili vrina, torminosis, inflationibus, resolutio. In neruorum, horroribus longis, vertiginosis, & pulsis. Menses pellit, minimeq; nervos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauēdus in febre vsus, ut si interanea vicus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

Marina variè faciuntur: Aliqui enim statim quum decerpæ sunt vna, aquam
mar

maris admiscant. Alij in area vuas sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamē austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modum meliora non adsint: aluum subducunt: prosunt purulenta extusisientibus, aut si dura aluius exerceant. Quæ ex Aminacis vuis sunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verūm quo plenius habeatur historia, ijs qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quædam ex ijs facilitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in vsus: uti quæ ex cotoneis, malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

Cydonites nomine alio melites appellatur, & Cita fieri consuevit: Mala cotonea exempti seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pōdo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defæcatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet a singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria

ria

LIBER QUINTVS. 419

ia, hepaticis, renum vitijs, & vrinae difficultati. Melomeli, quod et cyclonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quam plurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, coquantur: id post annum mutescit, mulso non dissimile. Praestat eadem quae superior compositio.

Hydromelum. CAP. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquae coctae, & sub Caniculae sydus insolatae, additis ad unam melomelitis facili ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites. CAP. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio haec est: Acerbae vuae adhuc immaturae, & tribus diebus insolatae exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi, despumati singulae partes adijciuntur: & insolatur in vasa transfusum. Vim reprenendi ac refrigerandi habet: stomachicis celiacisque conuenit. vsus post annum est.

Apjtes. CAP. XXI.

Fit & e pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apjtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturefiant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia haec genera acera sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. CAP. XXII.

Fit e feraci vite syluestri, quod vocatur anã-

D d

rhinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatū vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, celiacos, & dysentericos.

Rhætes.

CAP. XXIII.

FIt è punicis malij maturis quod rhæten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiū exorta: stomacho vtile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites.

CAP. XXIII.

Rhodites sic fit: Rosarū siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinū transfundens, recoclito. Vtile ijs qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteriæ scabritijs conuenit.

Myrtites.

CAP. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceſſerint, tussis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

72

LIBER QUINTVS. 422

re adstringit: stomacho utile: fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluvia: demigrat capillos.

Myrsinites.

CAP. XXVI.

MYrsinites, sic temperatur: Rami nigrae myrti cum suis baccis & folijs tusi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certe dimidium: id vinum colatum ad usum recoditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingivas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

Lentiscinum similiter ut myrsinites temperatur, nec secus terebinthinum. Nanque baciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicae, & stomachi, & sanguinis profluvio: ulcera omnia fluxionibus obnoxia: fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vulvae ac sedis, in fessione colibent.

Palmeum vinum.

CAP. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydeas, in vrceolum imo pertusum, & obstruclum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquae congijs infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congijs infudisse satis est, post de-

D d 2

cem dies detracto ab arundine linteo assumito vini crassum & dulce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficax: stomachicis, coliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto uero faciunt, quod tandem acore vitatur.

Cathorchites. CAP. XXIX.

Cathorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adijciunt, in qua recenter pressa vinacea maduerint. Caricae quae chlidoniae aut phoeniceae appellantur, praesertim nigrae macerantur, uti diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aqua in qua vinacea maduerint infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. De maceratarum liquor non secus acorem contrahit, & acuti usum praebet. Id tenue est: flatum gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactis ubertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam xylhon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alii muriae amphoram: quoniam non facile vitatur, & aluo idoneum fore censeant. Alii thymum & feniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt: et ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sycomoris eodem modo vinum, sed in

acet

acetū acre degenerat: quoniā nō ita praualet vis eo-
rum, vt fluētis liquoris dulcedinē retinere possit.

Resinatum vinum. CAP. XXX.

Resinatum vinum populatim facilitari solet:
copiosum in Galatia: quoniā vinū illic coa-
escat, vna nō maturescēte, ob cæli algorem, nisi pi-
nea resina temperetur. Resina autem cum cortice
unditur, et amphoræ dimidiata hemina permisce-
ur. Aliqui vbi efferbuit, excolant. separātes resinā:
illū relinquūt. Hac vina vetustate dulcescūt. Omnia
capitis dolorē, et vertigines faciūt: concoctionē tamē
adiuuant, & vrmā cient: tussientibus, ac destilla-
tione vexatis conueniunt: itē cæliacis, dysentericis, et
hydropicis, & fæminis fluxione vuluæ laboranti-
bus: alitis exulcerationibus infunditur. In hoc autē
genere nigricans magis albo cōstringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pi-
neis, recētibus, fractisq; præbetq; resinati effe-
tus. Si quis madefactas nuces pini musto deco-
uat, potum affatim cōuenit ijs qui tabitudine con-
iciuntur.

Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegunum, simili ratione
iunt. Diuisos recēter ramos, cū fructum adunt,
ut soli, aut balneo, aut igni, admonere oportet,
vt consudent, congioq; vini minam vnā permi-

scere, & post duos menses transfundere, & ante
quàm recondantur, insolare. Factitiorum vino
rum vasa impleri debent: nanque non plenis va
sis, vina in acorem corrumpuntur. Medicata au
tem vina, rectè valentibus insalubria. Omnia ex
calfaciunt, vrinam cient, & substringunt. Lau
rinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoq;
è fructu cedri maioris vinum, congio musti, ad
iecta tusarum baccarum selibra: diebus quadragi
ta insolari debet, & defecatum in vasa trāsferri.

Eit etiam vinum è bacceis iuniperis, non alite
quàm cedrites, & ad eadem valens. Cedrites ho
modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singu
las amphoras singulis cyathis diluunt, & ita mu
sto replent. Hoc genus vini excalfacit: extenuat, tuss
antiqua viile sine febre, pectoris laterumq; dolori
ribus, torminibus, ventris & interaneorum vlce
ribus, purulentis excreationibus, mulieribus vulu
causarijs, hydropicisq;: facit aduersus vètris tinea
& horrores: cōtra venenatos ictus auxiliatur: ser
pentes necat: aurium doloribus instillatū medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

Picatum ex liquida pice & musto tēperatur
Picem autem primum marina aut muria tā
tis per eluere oportet, dum inalbuerit, & synceri
maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda
congijs octo musti, vncia picis vna aut altera ad
ditur: ubi efferbuerit & cōstiterit, in vasa diffun
dit.

ditur. Hoc genus vini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, et luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Absinthites. CAP. XXXIII.

Absinthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequinginta sextarijs Italicarum amphorarum, admistam absinthij. Pontici librâ decoquant ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conquieuerit, defæcant. Alij absinthij minâ in amphoram demittunt, tusamq;, & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt: postea defecatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absinthij libram, & sicca pini resina sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stoma-

cho: vrinam cit: tardā concoctionē accelerat, hepaticis, regio morbo, & renū vitij auxiliatur: fastidia discutit: ijs prodest quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionē, & inflationes, teretesq; vētris tineas, et remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quā plurimum potū, & vomitionibus redditū, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

Hysopites è Cilicio hyssopo maxime laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coniecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, vt degrauiatus pondusculo fasciculus sidat: vinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus, & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP. XXXVI.

Simili modo chamadryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tarda concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs, sex stæchadis minam addere oportet. Crasstitiem, inflationes, laterū, nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè dat.

datur cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetū ē stachade herba, vt paulō ante diximus, acetio macerata, quod eosdē implet effectus. Fit vinū ē betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi misturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorū vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica acetum, ad eadem vitia vtile. Tragoriganites sit quaternis tragorigani drachmis linoleo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus. E naxis sit vinū, nomine lunites, drachmis duabus tusi naxis in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc

vinum pectoris vitijs, & omnibus quibus marribus. Thymi tusi & cribrati vncias centū linteo colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra aegras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & prae cordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo est satyriacum vinum sit, quod eadem quae thymites praestat. Si quoque origanites ex heracleotico origano conficitur similiter cum suprascripto. Facit eadem quae thymites. E calamintha, pulegio, et abrotono vina sunt eodem quo thymites modo, prosunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod urinam moueant. Fit item est conyzia vinum, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

CAP. XXXVII.

Aromatites ita fit: Palmae, aspalati, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis et in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiete scire finito: deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami vncia, phlegma septem, costi drachmae duae, nardi syriaci drachmae sex, cassiae vncia, croci drachmae quatuor, amomi drachmae quinque, asari drachmae quatuor: omnia simul trita et linteo colligata in cadu musti demergunt, et postquam vinum deforbuerit, transfundit.

Fac

Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrinæ, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituitæ crassitiem extenuat: colorem alit, omnium conciliat, dolorem finit, renum & vesicæ vitijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XXXVIII.

FIt & vinum ad destillationes, eruditates, tussim, inflationes, et si humor in stomacho coit: Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vni, Cardidis drachmæ sex, anisi drachmæ tres: omnia plenius tusa et linteolo inueluta in sex vini sextarios coniunguntur: vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnius mensura. Fit quoque nectaria ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: urinam pellit. E Syriaca nardo, et Celtica, malabathroque vinum factitatur, hac ratione: Singulorum selibra in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celicæ nardi quadrantem, in musti ampho-
ram

ram adiiciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinanciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq;, conuenit. Radicis syluestri nardi recentis & iritæ cribratæq; bessem, in congiu musti conijcito, duos menses quiescere sinito. Vtile est hepaticis, difficili urinae, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX.

Radicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ menses pellit, ructus ciet, & urinā: prodest tussi, ruptis, vulsisq;. Saluæ vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterū dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vursa, et suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiu mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthupnææ: lienis crassitiem extenuat: cōtra tormina, coxendicū dolores, efficax est: tardas conceptiones accelerat: menses & partus extrahit: aqua inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vinea ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vri

vinam mouent. Seminis apij recentis, maturi
 & cribrati vncia nouē in linteo colligata in musti
 amphoram demittantur. Appetitum excitat: stoma-
 chicis, & difficili vrinae auxiliatur: faciles spi-
 ritus facit. Ex feniculo, anetho, & petroselino,
 in eodem modo fiunt, & ad eadem efficaciam. Fit
 & è flore salis vinum, multo ad purgandum ef-
 ficacius, quàm vinum aqua marina temperatum.
 auces, vesicam, renes, & stomachum infestat:
 uare neque in secunda, neque aduersa valetudine
 rodest. Fit etiam vinum quod philhorion vo-
 cant, quoniam partus necat, & abortus facit, ve-
 atro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta
 radices vitium sato: siquidem vites sibi illorum
 vires adsciscunt. Id vinum partus enecat: datur
 ei iunioribus, quae antè vomuerunt, cyatho-
 rum octo mensura, dilutum. Ramorum thyme-
 ae cum suis folijs & fructu triginta drachmas
 mittito in congios tres musti, & leni igne coquito,
 donec cōgij duo supersint, defecatumq; recondito.
 squosa purgat excrementa, & lienem absumit.

Chamelæa dum floret, cum folijs trusa & cri-
 brata decē drachmarū pondere, in musti congiū
 additur. Post duos menses vinū in vas transfertur.
 Aquae inter cutem, hepaticis, & lassitudine confra-
 ctis, efficacis est: item mulieribus quae à partu agrè
 purgātur. Chamepitygium simili modo fit, ad ea-
 dem conueniens: vrina quoq; ciet. Librum radices

man

mandragoræ concidito, segmenta lino traiecit
 quod selibrâ æquat in musti cadu demittito, ibi
 esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Me
 dia portio, hemina dimidiū: bibitur, passo in dup
 addito. Aiunt hemina vini congio mustam, potu
 porem adferre: cyathus unus cū sextario vini po
 tus, enecat mediocris usus eius, doloris sensum au
 fert: fluxiones intrassat: olfactu, potuq; & cū iudi
 tur idem præstat. In congium musti aqua ma
 rina dilui, drachmas duodecim nigri veratri tri
 in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in ma
 rine aquæ congios quatuordecim aut quindecim
 ubi pleniusculè fregeris, iniecit: post aliquot dies e
 lato, & vitior. Dato cyathum unū ex aqua balni
 in potu, ad aluum soluendā, iis qui euomuerunt
 cæna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iunc
 odorati uncias duodecim, spicæ Syriacæ uncias tr
 decim, cribratas, et linteo colligatas in septem vin
 Col sextarios diebus quadraginta materandas in
 dito, postmodum colato: dabis in potu sesquibemi
 nam. Alio: decoctæ marine aquæ ex alte pe
 tite sextarios duodecim, veratri candidi libra
 sex, in musti amphora quadagesimo die, quā
 madefeceris, colato, & vitior. Alia ratio: Vera
 tri drachmas duodecim, & aphrontiri quaternas
 in senis musti sextariis diebus quinisdenis mace
 rato, mox colato: & semestri exacto, vitior. Id vi
 ni genus abortus facit, & partus necat. Aut viua

in

sole siccata imponito in musti metreta (implet
 item metreta congios duodecim) & gypsum in
 inu mittito pondo drachmarum viginti, & biduo
 sidere finito, conijcito veratri nigri drachmas tri-
 nta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas
 igitia, baccarum uniperi sextarios duos & trien-
 m, myrrha & croci singulorum drachmam, inuol-
 is linteolo diebus quadraginta appedito, postea co-
 ito. Dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat
 partu, et abortu feminas: fectus extrahit, contra
 regulatus vulue efficax. Scammonites sic fit. Radi-
 scammonia per messes effossa, trita, et linteo colli-
 ata drachmas quinq; in musti congiu mittito, ad-
 ies triginta. Aliu purgat, bile et pituita extrahit.
 Metallica omnia, & primum Cadmia.

CAP. XL.

EX cadmie generibus optima est Cypria, bo-
 tryitis nomine, densa, modice grauis, & in-
 uitatem magis declinans, racemosa facie, colore
 bodu, quae fracta cinerulenta est, & aruginosa.
 proxima habetur foris caerulea, intus candidior,
 internatis venarum discursibus, onychita lapidi
 milis, cuiusmodi sunt, quae e veteribus metallis
 fodiuntur. Quaedam etiam placodes, id est, cru-
 losa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi
 onis cincta, ob quod eam Zonitin appellauere.
 alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna
 x parte nigra. Sed quae testaceam faciem habet,
 ter

terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychiis utiles: reliqua ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delata improbant. Cadmiæ effectus adstringere, cana explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infarcire, excrecentia in carne coëcere, crustas creare, et ulcera, quæ cacoëthe vocantur ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fulgine egesta flatu, & lateribus camerisq; fornacum inherente. Prægrantes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acēstides, per summa fastigia connexæ & cōcamerate, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohereant, & inibi detineantur: quæ cur spissius insident, in corpus cōcreſcunt, & modo genus unum eius, modo duo, modo omnia persciunt. Extrahitur & cadmia in Cyprio è monte, qui solis incumbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen est: in quo etiam monte quædam quasi venæ chalcitis, misyos, soresos, melanteriæ, cæruleæ, chrysocollæ, atramenti sutorij, diphrygisq; inveniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsè quædam lapidum cognatione quales inuenitur, & apud Cumas lapis, nullam suam vim ostendens. In eo depelluntur, quod sunt cadmia leniores, nullumq; alterum mandentibus

sa

saporem exhibent: commanducatus item lapis, dentes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia verò quieta manet, fuliginemq; luteo colore aut areo splendorem expuit, vario Zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus, colorem mutat, ac leuior multò fiet. sed cadmia nihil euariat, nē quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda araria. Vriur Cadmia superior carbonibus obruta, donec trās lucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: nox extinguatur vino Aminaeo, quæ ad emplāstra reparatur: sed quæ ad psorariū medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo existē conterūt in vino, rursusq; fictili crudo torrent, donec pumicosa videatur: iterumq; tritam ex vino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ reuens: hac spodi vice vtuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

CAP. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & ple-

Ec

runq; ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab aerariorum officinarum pavimentis & fornacibus euerritur: pompholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: unum ad aeris colorem vergens, subpingue alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactus. Candida sit pompholyx, quoties in perficiundo ere, fabri præstantiorem facere volentes detritam cadmiam cumulatius insparserint. Namque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygen coit. Caterum pompholyx non ex aeris modumateria, & fabrilis industria factitatur, sed ex cadmia quoq; ad gignendâ ipsam, eximie follibus præflata. Cuius faciunda ratio hæc est: In domo gemina contiguatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à superni partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, a excipiendam follis naurem ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fabricatum: domuncula altera huic cōiuncta sit, in aqua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis: idem negotiū obit infernè artificis minister, simulq; carbones adiicit, usque dum indit cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egest
suffu

suffitu tenuis pars, & leuis materia in summā domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adherere scit: cōflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus, aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementū capeffens, glomusculis vellerum simile redditur. Ponderosius autē in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus paucamento coheret. Quod t. maiore deterius existimandum est, ideo quod multū terra collegerit, & spurcicia in aceruatiōe referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quae accepto aceto halitum aeris praestat, colore aliquantum piceo, sapore coeni horrido: & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autē notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus, quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs probandis inueniatur eorū quae antē dicta sunt. Pompholygen in commune ita lauare oportet: Ligalam linteo mūdo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum d. mittito, quod imbrē contineat, & huc atque illuc fusciculum d. ferens, immergito: ita enim limosa pars eris ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infusa

dens, agitato, & effumilito: mutata tantisper aqua,
 & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam
 exprimito, & siccatur cinerem recodito. Alij, quan-
 tum maxime fieri potest, siccant, & manibus in a-
 qua coterunt, dum mellis crassamentum imitetur:
 deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut
 laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, in-
 fusa per linteum largiore aqua, cinerem contur-
 bant: mox spumosum, quod traiectum est, & su-
 pernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad
 vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribra-
 tum, in aliud vas transfundunt, relicto arcuoso quod
 pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, &
 in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec
 cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij pau-
 latim integram in aqua respergunt, arbitrati are-
 nas lapillosq; suo pondusculo degravatos, pessum
 ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime
 attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in
 pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam
 lauatur vino Chio marina aqua diluto, modis
 quos supra diximus: & ita redditur adstringen-
 tior, quàm aquis elota. Vis pompholygis adstringe-
 re, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & ali-
 quantum exiccare. Inter medicamenta numeratur,
 quæ leniter crustas obducunt. Quod si spodon tor-
 rere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua,
 colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leu-
 bus

bus prunis, orbiculos continuò versabis, dum assiccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: verùm post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, vt in spodij locum suffici possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cū floribus, & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur fornacibus, donec siglinum percoquatur: iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod vbi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoq; sit è termine syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus. satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detrahitis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est cādidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut molibus rubifolijs, vel è buxi coma, vel pseudocypereo cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodij vicem vsurpantur.

Aes vstum. CAP. XLII.

AEs vstum prolatur rubrum, & quod contritus colore cinnabarum imitetur: nigrum verò plusquam debeat exustum est. Fit autem è clauis solutarum narium, fictili crudo compositis:

EE 3

subperfo sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile, circumlito singulari creta spiramēto, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrun-
 runt. Alij sulphure solo vrun-
 tur, fuliginem tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, vrun-
 t, & iterum ac tertio idē efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustis: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimi-
 t, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excre-
 scentia in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cū melle delinctum, illitūve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusve quā-
 scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecillio-
 rem, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu ful-
 scens, milij effigie, & numero, brevis, ponderosus, modicē splendens, atq; constringens, qui delima-
 tam æris scobem non recepit, qua saepe adultera-
 tur. Sed id facile deprehēditur, cum dentium illisu
 dilat

dilatantur ramenta. Fit autem, cum as fornacibus
 fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularumque
 ad ea pertinentium: tum huic negotio additi mini-
 stri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infun-
 dunt, refrigerandi proposito: itaque, repentino concre-
 tu, ac addensatione, velut expulitur, & erumpit an-
 nediectus flos. Adstringit, & excrescentia coercet: of-
 fusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mor-
 det. Quaternum obolorum pondere datus, crassum
 humorem extrahit: carnosae narium & sedis vitia
 absomit: eruptiones papularum cum vino cohibet.
 Candidus contra diuturnas aurium grauitates tri-
 tus, in eas per fistulam flatu impellitur: ruam, ton-
 sillasque reprimat, farina eius cum melle admota.

Squamma æris. CAP. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypriis officinarum
 clauis, crassa quidem ipsa præstantior quæ he-
 liliis, id est clauaris, nominatur. sed ex vili promi-
 scuoque ære, aut candido, vitiosa intelligitur: quam,
 utpote tenuem, & inuolidam, damnamus, maxi-
 me approbantes crassam, rufam, præsertim si aceti
 respersu aruginem contrahat. Vim habet adstricto-
 riam, extenuantem, reprimentem, & erodentem:
 nomas coercet, vlcera ad cicatricem perducit: pota
 ex aqua mulsæ, aquam trahit. Aliqui farina sub-
 actam, dant in catapotio. Additur ad oculorum
 medicamenta, quod genarum scabritiam absu-
 mit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo.

Sicca aeris squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter cōturbatur, quousq; pessum ierit: abijcitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina caelestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma, quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumq; lentorem emittere ceperit, aqua sensim ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo validè: squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur: quo facto, expressus humor pyxide ex are rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squamæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullā prorsus lentitiam excernat, & linteo apertum biduo conquiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij vt cadmiam lauant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mucronibus decussæ, quam vocant stomoma, eadem vis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moriendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis. CAP. XLV.

Aerugo rara fit his modis: In cadij, aut aliud consimile vas acetum quàm acerrimum infunditur: superponitur inde inuersum aeneum vas, præsertim concameratum: sin minus, planum: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris, operculo: decimum post diem insidens aerugo deraditur. Aut aeris lami-

sa in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula aeris, aut lamina vna pluresve, vinaceis non reventibus, sed iam acefcentibus conduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delimata aeris coe æruginem facere licet, necnon è laminis, quibus bractea auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater verſet, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil aeris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem rodus adulterant: aliqui pumice admixto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendimus pumicem aut marmor, dum pollice sinistra manus madefacto, æruginis portuunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat, marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatæ, demumq; translatione crebra & humoris complexu dealbesunt. Quin & dentium appressu: si quidem sincera cedit, levis, & sine asperitate. Atramentum verò sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubeſcetq; id quod atramentum sutorium

acceperit: quod id vstum suapte natura talem sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scoleciam, duo sunt genera: quaedam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprii aris dimidia heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam vnam, cum salis fossilij, translucentis, aut marini quam albidissimi, solidiq; aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, subsydus Caniculae, donec colorem æruginis contrahat, & concretu strigmento sum fiat, ubi autem se in vermiculorum Rhodiæ similium speciem coegerit, recondito. Efficax & valde boni coloris redditur, si duas parteis vrinae veteris cum vna aceti adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant: quod genus, ut vitiosum, improbatur. Fit & quædã crugo ab aurificibus, mortario & pistillo Cyprii aris, cum vrina pueri impubis, quæ aurum ferruminant. Antedicta æruginum genera, vsto æri omnino respondent, sed magis effectu valent. Sciendum fossilis scoleciam præstantissimam esse: derasim sequi: postremo loco factitiam. Mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Auriscum autem crugo rase respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, exsiccant: oculorum cicatrices emendant, lacrymas

as cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatio-
 tuetur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem per-
 icunt: callos & sordida vlcera purgant, cum mel
 coctæ: callum fistularum erodunt, cum amonia-
 collyrii modo in eas adactæ. Ad gingivarum au-
 nexcrecentias, & extuberationem utiles. Ma-
 iopere extenuant genarum crassitiem cum melle
 ita: verum post illitionem sponsia ex aqua cali-
 locus fovendus est. Resina terebinthina exceptæ,
 m ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo,
 ancûq; velis, minutissimè fracta comminutaq;,
 fictili patina, flagrantibus prunis superposita:
 rsaturq; donec se mutet, & colorẽ cinereũ concí-
 it: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt
 i cruda olla eam vrant, uti dictum est: sed non
 orsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. CAP. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarum
 profluvia, admota, potuq; præstat ne conci-
 unt. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papula-
 m eruptionibus medetur. Perquam utilis ad
 britias genarum, reduvias, & pterygia, con-
 lomatis prodest, gingivas firmat, podagras il-
 lenit, alopecias replet. Vinum aquæve in qua
 idens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dy-
 tericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissõ-
 is stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam sco-
 m vocant, eadem potest quæ rubigo, sed ineffica-
 cus.

cus. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortariū plumben-
aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, d-
nec nigrescat aqua, & limi modo crasse fiat, aut
tuleria reddatur: linteo deinde colato, aquā supe-
fundēs, quo facilius quicquid est resolutum incer-
possit. Hoc iterum facito, vsq; dum satis tibi habui-
se videatur. Vbi cōfederit, priore aqua effusa, non
adiiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet ni-
gritia, postea in pastillos cogens reponito. Queda-
scobem mundi plumbi lima quasitam, mortario
stilloq; lapideis terunt, aut manibus cū aqua pa-
latim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi
pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. D-
tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alij
mata scobi modicā plumbaginem adiiciunt, affi-
mantes ita elotum plumbum præstantius esse. P-
test refrigerare, adstringere, inducere, mollire, ex-
re caua, sistere oculorum fluxiones, & vlcerū e-
crescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra
dis vlcera, condylomata, & hemorrhoidas, ex
saceo: item ad ea quæ agrè cicatricem ducunt: e-
in totum spodij effectus præbet, nisi quod non ob-
cit crustas. Syncerum plumbum affrictu, mar-
scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. CAP. XLVII.

Ritur plumbum sic: Super quā tenuis

m

las plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 spargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-
 to semper sulphure, vsquedum vas expleueris, suc-
 cundito: flagrante autem plumbo, ferrea rude ver-
 to, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilq; e-
 lumbo non vstum hæserit: tum dcum, obstructis
 aribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius
 nititur. Aut elimatum plumbi scobem in olla sul-
 pure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictū
 est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes
 perculum, dato exili spiramēto, vrunt. Alij pro sul-
 pure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij inte-
 ras laminas imponentes, acri igne vtūtur, & ru-
 cula ferrea cōtinuè mouent, dum in cinerem sol-
 uuntur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehe-
 centius vratur, cōtrahit spumæ argenti colorem.
 agis tamē nobis placet prima vrendi ratio. Plum-
 bum vstū lausatur vt cadmia, & reconditur. Eos-
 m effectus habet, quos plumbum elotum, sed mul-
 acriores. Recremētum plumbi, quod scoriam vo-
 unt, optimum est, densum, fractu contumax, cerus-
 am planè representans, nihil plumboſi habens,
 sed ad luteum colorem accedit, & vitri splendo-
 rem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum po-
 test, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs in-
 sa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-
 um colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 tum absumatur. Dein vbi confederit crassamen-
 tum

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdos lapis à plumbi similitudine dictus, respondens recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

CAP. XLIX.

Antimonium.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est modoq; nitidarum emicat, con fractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quo stibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in vniuersum dicatur, vis vsto plumbi similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas rumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosus exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerusa. Torretur pinsita farina cuculitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Virtus etiam carbonibus succensis efflatum, quoad ignem flagret: si enim paulò magis cöcremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

Molybdæna optima est plana, argenteo spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Vi-

tio

LIBER QUINTVS. 449

leſa eſt, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. ſignitur ex auro & argento. Eſt etiam quædam oſſilis, ad Sebaſtiam & Corycum inuenta. Quo genere probatur, quæ lapidofa non ſit, aut recrementofa, ſed nitens & flaua. Vim habet ſpumæ argenti, aut recremento plumbi ſimilem. Vritur laua-urq; eodem modo. Miſcetur convenientiſſimè medicamento, quæ liparas vocant, atq; emplaſtris miimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abſtergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. CAP. LI.

Recrementum argenti quod ſcoriam vocant, aut helcyſma, aut encauma, molybdenæ vim habet: quare emplaſtris quas phæis appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut- uole cum adſtringat, extrahatq;.

Spuma argenti. CAP. LII.

Spuma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conſla- a, donec perfectè igni incandeſcat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatiffima eſt At- ica: ſecunda, Hiſpanienſis: hæſequitur quæ ſit Dicæarchiæ, id eſt Puteolix, Baijs, in Campa- 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Lithargirium.

20, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, exp-
 re caua, excreſcentia in carne reprimere, ad cicat-
 cem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur arge-
 ti ſpuma, confractis partibus ad magnitudinem
 glandium, pruna ſuperpoſitis: ita accenſa folli-
 buſ ut conflagret, abſtergitur inſidens ſpurcitia, &
 conditur. Aliqui ter aceto aut vino reſtinguente
 rurſus vrunt, & eadem proſequuti, reponunt. La-
 uatur ut cadmia. Ut argyritidi nominatae, aut,
 deſideretur, alteri candor detur, ea in parteis ma-
 gnitudine fabarum confracta, chemicis Atticae me-
 ſura, ſictili nono ſuperfuſa aqua, addito candidi ti-
 tici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, lin-
 teolo puro, raro, anſulis vaſis alligato, coquitur, &
 nec hordeum fractum diſſiliat: deinde omnia in nu-
 tum craterem oris ampli tranſfunduntur: trit-
 cum abũcitur, ſpuma argenti vehementer man-
 bus affricando inſuſa aqua lauatur, aſſicataq; i
 Thebaico mortario teritur, affuſa feruente aqua
 donec ſoluta fatiſcat: excolata aqua, iterum tot
 die teritur, & veſperi inſuſa calida aqua ſinitur
 mane colis excernitur, alia inſunditur, atq; ter di-
 excolatur. Id ſeptem diebus fieri ſolet: poſtea addi-
 tis ad ſingulas minas ſpumæ argenti, quinis ſali
 foſſilis drachmis, inſuſaq; calida aqua, ter die te-
 ritur, & addita aqua excolatur: cumq; in albu-
 rit, calida inſuſa, idem facito, dum nullam pror-
 ſus ſalſedinem recipiat. Denum ardentiffimo ſol
 ſicca

LIBER QUINTVS. 452

siccata, cieto prius humore, reconditur. Sin minus,
 mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addi-
 to sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile no-
 uum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemi-
 neat: mouetur quotidie mane & vespere, aquaq; su-
 perinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit tri-
 ginta diebus: nanq; nisi moueatur, crassescit, usque
 in duritiem teste. Post hæc effusa leniter muria, in
 Thebaico mortario spuma argenti teritur, conie-
 fla; in fictile aquam continens, manibus diligen-
 ter agitatur, mutata subinde aqua donec nullū sal-
 uginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti
 spuma cādidum apparet, in vas aliud transfertur,
 & redactum in pastillos, plumbea pyxide condi-
 tur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudi-
 nes confractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquenscens contabescat, exem-
 tamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum
 est lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ
 argenti tantundem, in sole terūt, aqua continuè mu-
 tata, dum cādor ei detur. Alia ratio: Sumito quan-
 tum vis argenti spumā: vbi lana candida inuolue-
 ris, fictili nouo indita aqua, cū pugillo fabarū recē-
 tū repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disru-
 ptæ deliscent, lanaq; non denigretur, exemptam ar-
 genti spumā, & altera lana inuolutā, iterum coqui
 o, cyathum aquæ & parem fabarum modū adij-
 tens: eadem tertio, quæ supra, facito: in summa,

Ff

tantissper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adiuncto octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, et terito intermittensq; utri quàm albißimi cum aqua dilui drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris cõtraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, ediecta largiore aqua, ubi cõsidere desierit, colato: tum nouam supradictiensi aquam, manibus probè versatam finito vt confidat, ac rursus per colum trajecto. Alternis eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq; effluat, et nullam salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Canicula sydus exponito, & siccata utitur. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fæditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, lateratasq; & macularum plenas.

Cerulea.

CAP. LIII.

Cerulea fit hoc modo: Infuso in vrceū oris latissimi, aut fictile labellū quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; velaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamentumq; transfundito: debet quoq; siccari in sole, mox tru-

sa

salili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendū, cribrandumq;: vicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita vt acetū non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliquæ, vt supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos velit digerere, aceto acris subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supra dictum opus obeundum est: ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictuli nouo, maximè Attico, tritam cerussam imposito, & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vitior. Est & illud vrendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à quibusdā dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo.

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; in super excreſcentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miſcetur ceratis, & emplaſtris quæ liparæ vocantur, paſtillisq; eſt autem letalis eius potus.

Chryſocolla.

CAP. LIII.

Chryſocolla laudatiſſima Armeniaca, colore porri quàm ſimillimè reddēs. Secundū locum ſibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quò in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauādi hæc eſt: Tuſam infuſa aqua, mortario expaſſa manu ad pilam vellemeter fricato, & ſtatim quàm conſederit, colato. Alteram infundens aquam, ruſum terito: hæc viciffim proſequere, donec pura ſynceraq; ſpectetur. Dein ſiccato in ſole, & ad uſus recondito. Quòd ſi vrere volueris, ex ea terens quod ſatis eſſe videbitur, palinis ſupra carbones adponito, et alia facito quæ ſuprà diximus. Dos chryſocolla ad purgandas cicatrices: excreſcentē carnem coërcet: adſtringit, purgat, excaſcit, & modicè corpus mordendo exēſt. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones conuitant, & necem inferre poſſunt.

Lapis armenius.

CAP. LV.

Armenius lapis præfertur leuis, colore cerulco, perquàm æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chryſocolla præſtat, ſen inefficacius. Quinetiam uſum habet ad pilos in

pa

palpebris alendos.

Cœruleus.

CAP. LVI.

Coerulei origo ex ararijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali: secundū quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicē erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum.

CAP. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectoria dant officinae: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, et leue. Inter medicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpūt: burgat, & reprimut vlcera.

Ochra.

CAP. LVIII.

Ochram leuissimam, & omninò luteam eligere oportet saturatam non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat: caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris.

CAP. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarim minio ean-

F f 3

dem esse existimāt. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argentea arena permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colore permutatur, in metallis verò strangulanti halitū eructat: itaq; facies incole vesicis obuelant, vt per illas spectent, nec respirādo noxiū aërem attrahūt. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta vtuntur. Cinnabaris verò ex Aphrica deferitur, & magno constat: haecenus inuenituc, vt vix versicoloribus pictorum lineis satisficiat: intento colore nec diluto praeditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris haematita lupillo eandem: conuenit ad oculorū medicamēta, verūm efficacius: magis enim adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepto, medetur.

Argentum viuum. CAP. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusuē cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt siquidem deteresa fuligo, quae calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinatum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

riam omnē excedit. & defluere facit. Potum vinū
perniciālem habet: suo enim pondere interna exest.
Remedio est lac multum subinde potum & vomiti-
onibus reiectum, aut vinū cum absinthio, aut apij
decoctū, aut semen homini, aut origanum, vel hyssō
pum cum vino: auri limata scobs, id est ramentum
quā tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. CAP. LXI.

Rubrica Sinopis maximē probatur grauis.
densa, ad iocineris imaginem vergens, calcu-
lorum expers, concolor, cum diluitur, impendio fu-
silis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdā,
expurgataq; defertur in Sinopem urbem, in qua
venditur: unde cognomentum accepit. Vim habet
exiccatoriam, quasi inducendo obstruētem, & ad-
strictoriam: quapropter vulnerarijs emplastris,
& pastillis exiccantibus, & adstrictorijs com-
misceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut cly-
stere infusa: datur iocineris vitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. CAP. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior
est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis,
lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Ibe-
ria quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, &
degenerante in rubricam.

Lemnīa terra. CAP. LXIII.

Lemnīa terra, cuniculoso in specu nata ē
Lemno insula, palustri loco defertur, inibi

electa, & caprino sanguini permista: quam incolla cogunt in pastillos, & imagine caprae signant: unde & sphragida egos, hoc est, sigillum caprae, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa venena singularem, pota cum vino, & praesumpta, euomi venena cogit. Contra ictus morsusq; animalium, quae exitiale virus eiaculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vtantur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum futorium. CAP. LXIIII.

Atramentum futorium genere quidem vnum & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias treis habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concrescit: quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrolles, concrementum capebit, quod pecton, id est concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua madefactum decoquant, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quae racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, coeruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est

ab alijs lonchoton nominatum. Proximum, con-
 retitum. Cocleile verò ad infectus, & denigratio-
 es, aptius cæteris esse conipertum est: sed ad medi-
 nae vsum inualidius esse, experimenta docent. Va-
 t adstringere, calfacere, & crustas inducere: latas
 entris tineas necat, drachma pondere deuoratum,
 ut cum melle linctum: vomitus ciet: aduersus hau-
 a fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur:
 urgat caput, aqua dilutum, & in vellere naribus
 stillatū. Vritur, vt paulò post in mentione chal-
 citis ostendemus.

Chalcitis.

CAP. LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec la-
 pidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblon-
 gis venis, splendentibusq;. Huic abstersoria vis in-
 t, exalfaciens, & crustas vlceribus obducens pur-
 at quæ oculis & eorundē angulis hærent. In ge-
 re leuiter excedentiū est. Ad ignem sacrum, & vlce-
 r quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, &
 tribus erumpentem, cum succo porri sistit: gingi-
 rum vitia, depascētia vlcera, tonsillasq;, eius fa-
 na cōpescit. Vsta, & cum melle trita, oculorum
 medicamētis longè utilior redditur. Callum gena-
 um, & scabritiam absomit, abstergetq;. Fistu-
 s tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalci-
 medicamentum quod psoricon vocāt, duabus eius
 rtibus, cum vna Cadmiæ additis, & ex aceto
 itis. Oportet autem in sicili obruere fimo, diebus

F f 5

quadraginta, per Camiculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alii pares utriusque portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, perfecte maruerit: in reliquis verò, dum mutata floridum colorem fuerit, et sanguineum & minimum colorem contraxerit, tum demum exinienda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum per flatus carbonibus, usque dum luteo colore palleascit: aut ficti subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprum, aut simile, durum, quod friando auri color imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quòd ipsoricum ex eo non conficitur, excessus defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem ceteris præstat, utpote quod efficacius habetur, sed ad ocularia medicamenta multò superaculo inerior.

Melanteria.

CAP. LXVII.

Melanteria gemina est originis: quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concreuit. Alia verò in summis

fa

icie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Inmetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quadam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & æ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory.

CAP. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melantheriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, & non absimile: verum soræi virus inest graue, & auferam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodq; nigrius apparet, in multa foramina descendens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeq; magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitione effundatur. Quod autem iatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur. illitum cum aqua, varos extinguunt, medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrat. Iac autem ferè omnia, & alia quæ vstionem exerta non sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-
busta

busta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

CAP. LXIX

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quodam enim metallicum est, quod in Cypro sol gignitur lutosum namque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur, diphryges ideo vocatum est, quod & à sole, & à sarmentis vratur are scat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aris quasi subsidens fax est: siquidem post frigida aqua offusione, ut supra retulimus, cum de flore aris disse reremus, sublato are, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictione & gustu aris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcen multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem aris gignit, fieri: quando indictis aris assata, & in scrobis translata peruritur. Tunc enim ambiente scrobis, locum comprehendit, et exemptis lapidibus nihil minus inuenitur. Praefertur quod saporem aris reddit, æruginisque, adstringens, et vehementer exccan linguam: quod sibi exusta oclia non vendicat: quæ cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adstringere, perpurgare, extergere, siccare, excrecentia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethæ vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina aut cerato exceptum discutit.

Aur

LIBER QUINTVS. 463

Auripigmentum. CAP. LXX.

Auripigmentū in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optime existimatur crassum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellespō nascitur. Huius duo genera fluxerūt: Vnū supra etū est. Alterum glandis effigie, pallidū, & color sandarachā imitans, glebosum, ex Ponto, et Capidocia defertur quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua, viuis carbonibus subiectis, assiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; recoditur. Habet adstrictoriam, & erodentem, crustas in vehemēti predine, & violento morſu excutit: reprimit quæ excrescunt, & capillos euellit.

Sandaracha. CAP. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatioꝝ, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris lore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & stio, quæ auripigmento: explet alopecias, resinæ recepta, & scabros vngues cum fice eximit: contra phthiriasin ex olea efficax est. Tubercula cum dipe discutit. Prodest ad narium orisq; vlceri, & ceteras papularum eruptiones cum rosa: item condylomata. Datur ex mulso, purulentis extusisientibus. Suffitur quoque cum resina, diuersus veterem tussim, rapto per fistulam nari: vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

cum

cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen.

CAP. LXXII.

OMne aluminis genus ferè in Aegypto, & i
eisdẽ metallis inuenitur: etenim scissile quod
dam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & i
alijs quibusdã locis, in Melo, in Macedonia, in Li
paris, Sardinia, Hierapoli Phrygia, Aphrica, Ar
menia, & plerisque alijs regionibus, sicut & ru
brica. Plurimæ eius species: verum ad medendi
usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur
Optimum est scissile, præsertim recens, candidissi
mum gustu perquam adstringens, graue olens, ca
culorũ expers, nec glebulose aut assulose compactũ
sed sigillatim in capillamenta quædã canescenti
deliscēs, quale est quod trichites, quasi capillare no
minatur, in Aegypto natũ. Reperitur quoq; lapi
huic alumini persimilis, qui gustus iudicis digno
scitur, quod nõ adstringat. Damnatur in rotundi g
nere, quod manu confictum est: sed ex figura depre
henditur. Assumendum autem suapte natura rotũ
dum, bullis turgens, albo propius, atq; validius ad
stringens, præterea nõnihil palloris cum quadã pin
guitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natio
ne Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum proba
tio, ut sit lymphicum, lacteum, æquale, et semper sui
co madens, sine lapidibus, atq; quendã coloris igni
culum expirans. Vim habent excalfaciendi, strin
gendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis ocu
lo

lorum offundit: genarum carnem, ceterasq; excre-
 scencias extenuant. Scissile rotundo efficacius intel-
 ligitur. Vri et torreri chalcitidis modo debet. Putre-
 scencia vlcera cōpescunt: sanguinis fluxiones inhi-
 bent: gingiuas humore pragnātes cōprimunt: mo-
 tus dentis cum aceto & melle firmant. Prosunt cū
 melle vlceribus oris, eruptionibus papularum, &
 fluxionibus auriū, cum sanguinalis herbae succo: le-
 pris cōueniunt cum brassicæ folijs aut melle cocta:
 itē pruritui, & vnguiū scabritijs, pterygjs, et per-
 nionibus, aspersa cum aqua. Valent cū aceti fæce, et
 galla, pari pondere cremata, ad phagedænas vlce-
 rum, & cum salis duabus partibus, ad vitia quæ
 pascūt: furfures cum eruo & pice illita abstergunt:
 ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita au-
 xilio sunt. Contra tumores, & graue alarum in-
 gumumq; virus, illinuntur. Ex Melo autē aduectio,
 mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori
 vuluæ inditum: partus quoque extrahit: gingiuas,
 si caro excreuit, vna ac tonsillis accommodantur: ori,
 auribus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur.

CAP. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur viuū, quod apy-
 ron vocant, nitedule modo splendidum, perlu-
 cens, minimè lapidosum. Probatur in genere sul-
 phuris ignem experti, quod viret, ac prapinguae spe-
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-
 riter

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-
 ra extusisientibus in ovo sumptis, aut suffitum: pr-
 terea partus, vsti nidore extrahit: lepras, lichena
 scabros vngues, cum resina terebinthina misti, au-
 fert: cum aceto autē illitum, ad lepras efficax est.
 tiligines tollit: scorpionis ictibus, addita resina, m-
 detur: cum aceto verò, draconis marini scorpionis
 plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes,
 nitro detersum, sedat: regium morbum emēdat, it-
 sparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ou-
 sumptum. Facit ad grauedinem, & destillatione
 sudores quoq; conspersum inhibet: podagricis, cum
 aqua & nitro illitum, conducit: grauitatem au-
 ditus, suffiti nidore raptim per sistulam hausto, s-
 nat: lethargicos suffitu excitat: erumpentem vu-
 decunque sanguinem sistit: contusis auribus, cum
 vino & melle illitum medetur.

Pumex.

CAP. LXXIIII

Pvmicis probatio, vt magnopere leuis, spon-
 giosus, scissilis, nec arenosus, item teri faci-
 lis, & candidus. Crematur fragrantissimus car-
 bonibus obrutus, & vbi canducrit, extractus, vi-
 no restinguitur odorato: iterumq; incensis extin-
 guitur: & tertia vstione exemptus, & per se refri-
 geratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere,
 gingiuas abstergere: purgat cum calfactione, qua
 cauginem pupillis offundunt: explet vlcera, & ad
 cicatricem perducit: excrescentia cohibet. Fit ex
 fa

LIBER QUINTVS. 457

rina eius dentifricium. Corpori crustam obdu-
 : auellentis capillis aptus. Theophrastus author
 , si quisquam in bullientem vrceum vini pumi-
 n iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal.

CAP. LXXV.

Al fossilis efficacior est: communiter, si est can-
 didus, calculis vacans, & perspicuus, densus,
 uali compage. Peculiariter Ammoniacus natio-
 laudatur, si modo findi facile possit, & in recta
 menta diduci. In marino sale eligendus est candi-
 s, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et
 lamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphri
 Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur:
 multo validissimus est Phrygius nomine ta-
 us, aut triteus, aut ganteus Salis natura in com-
 ine perquam utilis est: adstringit, absterget, ex-
 rgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas in-
 cit. Sed hoc interest, quod alius alio sit præstan-
 r. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur
 dicamentis psoras abstergentibus. Excrecentia
 oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasq;
 nis exuberationes tollit: clysteribus infunditur:
 cutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropi-
 um tumores auxiliatur, doloresq; in saxis fote-
 tigtat, & pruritus sedat, ex oleo & aceto infri-
 s ad ignē, donec sudent. Item lichenas, lepras, pso-
 q; Anginā ex melle, aceto, & oleo illitus lenat:
 illis vnaq; , cum melle tostus. Vlceribus in ore

G g

manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedænis vlcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo. aduersus cerasen, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & terebines, albidasq; capitis pustulas, thymos & turbercula, cum seuo vitulino: furunculos cum vna passa, aut suillo adipe, aut melle discutit Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium, & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impostus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter operatus ne exiliat, conditusq; prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fossilem subactis polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & succatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq;, donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramē

uentum est, in exilibus petris inuentum, cui vis eadem qua salis.

Muria. CAP. LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: et ischiadicis veteribus. Ad fatus, aqua marinae usum præstat.

Flos salis. CAP. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, seu gari. Interdum longè magis virus olet, gustuq; mordacior, & pinguius. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, imrobatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiã aqua, diluere facilius colorem. Ad vlcera quæ cacoethæ vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur sudorem cit: alui turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum marcat. Additur acopis, & smegmatis, quæ albanis capilli gratia cõponitur: & in vniuersum acris est, & feruentis naturæ, vt sal.

Nitrum. CAP. LXXVIII.

Prefertur nitrum leue, rosæo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi

Gg 2

spongiosum quidam, quale ex Bumis affertur. Ha-
 mores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma ni-
 tri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabili
 colore penè purpureo, aut spumosa, & morden
 qualis ex Philadelphia Lydiae defertur. Secunda e
 Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur
 Vim & vstionem salis habet, tam nitrum quàm
 spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tri-
 tum cū cumino bibatur, in hydromelite, aut sape
 aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, v
 ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus i-
 linitur, ante suspectam accessionem. Miscetur em-
 plastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant
 & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida
 aut vino infusum, inflationes, purulentas aureas
 & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum
 aceto instillatum. Canum moribus ex asinino ac-
 pe aut smillo medetur: resina terebinthina admist
 furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illin-
 tur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit
 & venenis fungorum, ex posca potum: aut si bupr-
 stis momorderit, ex aqua: ijs verò qui taurinum
 sanguinem biberint, ex laserpitio: ijsq; qui cibum
 non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisq; iam
 remissioribus, & luxatis, cum cerato: in resolutio-
 ne linguae, panis commodè permiscetur. Aliqui su-
 pradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa ni-
 ua, donec incandescant.

Fax.

ELigenda fæx maximè à vino vetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti viribus ongè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testâ igni largo vrant, vsq; dum penitus incendatur. Alij viniis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ vstionis, vs aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur. Eadem vrenula facis aceti ratio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, vehementer exest, siccatur. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter examinatur: proinde nō nisi in reconditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur, vt pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri profluuium, imo ventri aut genitalibus imposita, mitigat: panos discutit: nondum exulceratos, & tubercula: rigentes mammæ, sui q; lactis impatientes, cū aceto peruncta extinguit. Cremata verò, vngues scabros cum resina aufert: addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, vt spodos, adijciunt: cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua.

CAP. LXXX.

CAlx viua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti cli-

Gg 3

bano nocte dimittito: postera die, si candidissimo fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrito, vsque dum vehementer in albuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerint, in fictile nouum conijcto, & exactè pannis operiens, noctem vnā conquiescere finito: mane eam extrahens, ubi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili et fusaneo marmore, quæ ceteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. CAP. LXXXI.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet: sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum Saxungia autem vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpentium canumq; morsibus illitus ex aceto medetur crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto, sale, & melle.

Alc

Alcyonii quinque esse genera compertum est: unum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnula oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in facieminarum smeigmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est, item renibus affectis, aqua inter cutem, leni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum deallandis dentibus aptum est: in alia smeigmata, psilothraq; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum ale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum sigillum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recodet. Lauatur vt cadmia.

Adarces. CAP. LXXXIIII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tāquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & ali quātum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ. CAP. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominant. Fæminas autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ vt alcyonium. Recentes sine pinguedine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæve conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inuiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant, siccæ recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedunt, impositæ siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & vbi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit.

Cand

Candida cura fiunt, è molliſſimis recentes, per æ-
tus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret: inſolan-
tur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectante,
& quæ abſciſſæ fuerunt, deorſum. Si verò æſtina
trenitate ad lunam ſternantur, perfuſæ ſalis ſpuma,
aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. CAP. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appel-
larunt, marinum eſſe fruticem conſtat, qui
alto extractus, duratur ſtatim atq; emergit, tan-
quam offuſo aëre protinus concreſcat. Plurimum
inuenitur ad Syracuſis, in promontorio cui Pachy-
no nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore an-
therici aut ſandycis ſaturatæ, nec ſecus terenti fa-
cilè cedens, æquabili uſquequa; concremento, rur-
ſus algæ aut fuci marini odore, quàm ramiſſi-
ſſimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod
autem in lapidis duritiâ coit, ſcrupuloſum, ina-
ne, & lacunoſum, vitioſum exiſtimatur. Adſtrin-
git, & refrigerat mediocriter: excreſcentia coër-
cet: oculorū cicatrices abſtergit: vlcerum caua, &
cicatrices explet: contra ſanguinis reiectiones ma-
gnopere efficax eſt, urinæ difficultati auxiliatur.
Quin & potu ex aqua lienem abſumit. Quod an-
tiphies vocant, corallium eſſe arbitrantur, ſpecie
tantum diſtans. Eſt autem colore nigro, arboris
figura, ramoſum magis. Vires ſupradicti habet.

Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

Gg 5

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vitur, a qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vrinur autem vino optimè perfusus, viniisq; carbonibus obrutus, perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen, non minutim cōfringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadamtenus inducit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

Asius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles veras lutei coloris ad imum actus habens. Eius flos, salsus subflauus est, summo lapide insidens, compage tenui colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: admotus lingua aliquantum mordet. Vim habet vterq; adstrictoriam, & modicè erodentem: admistus liquida pici, aut terebinthinae, tubercula discutit. Longe validior flos existimatur. De cetero siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia sanat: excrescentia colibet, tetraque vlcera & fungis similia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex

ee

podagris, misto fabe lomento: & lienosis, ex
 aceto & uina calce. Prodest flos ex melle philisti-
 is linctus. Podagrici uiuantur, pedibus in solio (x
 lapide cauato inditis. Fiunt quoque pulueres,
 ui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, &
 corporum crassitiem absumunt, cum uice nitri in
 alneo sparguntur. Si lauare libet, cadmia modo
 uatur.

Pyrites.

CAP. LXXXIX.

PYrites lapidis genus est, à quo as conflatur. Eli-
 gi debet aris similitudine, facile scintillas accen-
 ditur sic: Melle irrigatus molli pruna continuè
 latur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbo-
 es igni candentes, lapidem copioso melle perfusum
 eiciunt, & ubi ad fuluum colorem vergere cœ-
 rit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madesa-
 tum cremant, donec æquabiliter assiccatus, fria-
 bilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solum
 ritur. Ita crematus, siccatusq; , reconditur. Si
 opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi-
 uam vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam
 oculis caliginem expurgare, duritias concoquere,
 & concoctas discutere. Resina exceptus excrescen-
 a in carne cohibet, sed calorem quendam & ad-
 riptionem parit. Ita vstum nonnulli diphryges
 ppellant.

Hæmatites.

CAP. XC.

HÆMATITES optimus habetur friabilis, satu-
 rato

rato colore niger, durus & suopte ingenio equalis, nulla sorde admista, nulloq; Zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & excalfactoriam aliquantum extenuantemq;: oculorum cicatrices & scabritiā cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusi conuenit: bibitur contra difficultatē vrinae, & fluxiones mulierū in vino: & ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo cotiae & collyria oculorū vitijs apta. Vritur ut Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, ut melle lenis fiat, & bullis quibusdā intumescat. Sunt qui hematiten ita adulterāt: Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quae eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, cōducunt, paucaq; interiecta morum eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hematitidis colorem reddat: quod si ita res se habet, reponūt: superius iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur male cōfictus primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hematites longē secus in colore habet: nanq; hic floridum reddit: hematites verò saturatiorem, atq; cinnabarim imitātem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magneti lapide, vehementer ambusto. In Aegypto sponte nascitur & cum metallis enascitur.

Scl

Schistus lapis CAP. XCI.

Chistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatur maximè qui croci colorem amulat, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & tereno cohaerentium venarum discursu, pectinum odore, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmorrhagica, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua re et muliebri lacte perfusus: ad procidentia, rupta, in genarum crassitiem, & vuas oculorum, maxime opere efficax est.

Gagates. CAP. XCII.

In gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis redit: niger est plerumq; & squallidus, crustosus, per se levis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprendit fonticum morbum suffitus, recreatq; vulnæ angulationes: fugat serpentes nidore: podagricis edicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nascitur, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus hii lapides inveniuntur.

Alii plures lapides. CAP. XCIII.

[Apis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatica. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, dens

densus, nec admodum grauis. Datur cū aqua mu-
 sa, trium obolorum pondere, vt crassos humores
 liciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæma-
 te vendant. Arabicus lapis maculoso ebori simili.
 Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat: eius cinis de
 trificio optimus. Galactites appellatur, quod lactis
 succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustus
 dulcis. Ad oculorum fluxiones & vlcera conuenie-
 ter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyx-
 de plumbea recondere, propter vim glutini, quod
 obharet. Melitites omnia galactitæ similis: hoc ta-
 tum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiu-
 dem vt galactites effectus. Marochibus lapis, quem
 aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt
 in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile li-
 quescente, linteones dealbandis vestibus vtuntur. Si
 racula corporis obstruere videtur, conueniens i-
 qui sanguinem expuunt, coeliacis, & vesicæ dolo-
 ribus, cum aqua potus itidem fluxionibus vuluæ, &
 impossius velleri. Mollibus oculorū collyrijs misce-
 tur: explet enim caua, atq; delacrymationes sistit.
 Idem cerato exceptus, vlcera quæ sunt in teneris
 partibus corporis, ad cicatricem perducit. Alabastrites,
 vocatus onyx, crematus, resina aut pice assum-
 pta duritias discutit: stomachi dolores cum cerato li-
 uat, & gingiuas comprimit. Lapis nomine thyr-
 zes, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspiden-
 imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum rec-
 dit

Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis ob-
 santur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa na-
 ur, glandis effigie, candidus, scita admodum con-
 iratione, lincis æqualiter inter se distātibz qua
 industria detornatis solutus nullam qualitatem
 manifestam gustui representat. Potest ciceris ma-
 tudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum cali-
 aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ au-
 liari, & calculos in vesica comminuere. Amian-
 lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis
 o, vt pote flexili, telas & vela tantum spectacu-
 gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidē,
 flammis inuicta splendidiore exeunt. Sapphi-
 lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existi-
 tur. Contra intestinas exulcerationes bibitur.
 crescentia in oculis, vnasq; & pustulas inhibet,
 ruptas membranas cogit. Memphites in Aegy-
 iuxta Memphin inuenitur, calculorum magni-
 dine pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito,
 æ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupe-
 re, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites la-
 quæ aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam
 elu inuenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum
 quidem augetur & decrescit. Nascitur in Ara-
 a, candidus, translucēs, leuis. Huius ramēta comi-
 libus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad-
 nuleta mulieres viuntur. Arborea adalligato eo-
 frugifera redduntur. Iaspidium quædā smarag-
 dum

dum imitatur, alia crystallum, colore similis
 tuitæ: alia non dissimilis aëri, ob id vocatur aë-
 zusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex a-
 gumento vocatur: quædam lineæ albis & resple-
 dentibus præcingitur, Assyrios appellata: alia ter-
 bintha similis, quæ terebinthi zusa dicitur: alia co-
 lore callida gemmam æmulatur. Omnes amul-
 ta esse traduntur, & accelerare partum femoribus
 appensæ. Aëtites lapis est veluti prægnans, cū quæ-
 titur, alio in utero sonante. Gravida continet par-
 tus, cum lubricæ sunt vulvæ & parum tenaces, |
 sinistro brachio adalligatus: sed parturiētibus è br-
 chio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine co-
 loribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pa-
 conditum offerat: fur enim mansum deuorare non
 poterit. Quinetiā concoctus, furem coarguit: quis-
 pe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, &
 cerato exceptus, cyprino, aut glaucino, aut alio ex-
 calfaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitæ ge-
 nera multa: quidam ponderosus & niger: alter co-
 nereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius
 lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes
 alligati cōtra capitis dolores, & serpentium ictu
 prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, &
 capitis doloribus auxiliari. Lapidēs in spongīs in-
 ueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vin-
 poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniun-
 guntur: conflatur autem ex marmore, lapide Pa-
 rio.

lo, & taurino glutine. Potest cādente specillo ad-
notum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostraci-
s testæ similitudinē habet, crustosus, & in lami-
is fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro
umice vtūtur. Menses drachmæ pondere potus ex
ino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur
ilici pondere, feminis præstat ne cōcipiant. Cum
elle autem impositus, māmaram inflammatiō-
is lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est, quo
mularij sculptores lapides expurgant, ad ero-
ndū & vrendū utilis: gingiuus, quas humor ve-
at, prodest: dentifricio cōmenlatur. Arena è littori
is sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit,
capite terus, in ea obruantur. Torreri solet ad ari-
is fotus, pro milio aut sale. E cote Naxia, quod
acuēdo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilū
ducit: virginum māmās cohibet, nec increfcere pa-
tur: potum ex aceto, lienem absomit, & comitia-
bus prodest. Geodes lapis, adstringit, siccāt, caligi-
is oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, te-
um mammaramq; inflammationes sedat.

Terra.

CAP. XCIIII.

Omnis terra ad medendi vsum recepta, sum-
mam & primam vim habet refrigerandi,
eatusq; obducendi, occludendiq;: sed specie di-
ut, cū alia adiunctis quibusdam ad alia sit vti-
li. Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est,
tera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

Hb

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per crame-
 ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lau-
 tur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor-
 sum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor le-
 uiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur inter-
 diu, adiecta aqua, ut vespere consadat: antelucani-
 colo excernitur, & demum in sole trita si fieri po-
 test, digeritur in pastillos. Quod si tostata desidera-
 tur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforati
 coniciuntur, oreque vasis diligenter obturato, supra
 carbones candentes continenter follibus persentur.
 ubi verò cinis in fauillas se conuertit, aut aëreum
 colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim ha-
 bet adstringentem, & refrigeratoriā, leuiter mol-
 lientem: cana explet, & sanguinolenta cōglutinat.
 Samia præfertur candida, leuis, tãgenti lingua glu-
 tinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis: cu-
 iusmodi est quā aliqui collyrion vocant. Duæ enim
 species eius: vnā, antè diximus: altera aster appel-
 latur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac
 lauatur ut eretria, vimque consimilem habet: san-
 guinis reiectiones sistit, & feminis fluxione vul-
 uæ laborantibus, cum flore syluestris punice da-
 tur. Testium & mammarum inflammationes, il-
 lita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcet:
 contra serpētium morsus & venena, pota ex aqua
 auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inueni-
 tur, quo aurifices viuuntur poliendo auro, ut re-
 splen-

splendeat. Probaturn candore, & durtia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis potius: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum & vlcera, cum lacte efficax est: partus, vt tradunt, adligatus acceletat, & conceptus feminarum custodit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiae similis: est autem crustosa, albaq; sed fictitius formis differens. Vis eadem qua & Samiae: extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie et corpore toto commendat: in balneis pro nitro deterget. Eadem praestat Selinus: maximè laudatur, quae vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimolia duo genera, candida & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quae innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit: ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, vtraque multum in medicina commendatur, si incorruptae originis, nec spuria assumatur. Quae puigitis dicitur, colore ferè eretriae similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu linguae, vsque adeò glutinosa, vt pensilis hareat. Cui effectus idem qui cimoliae, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriae vendunt. Fornaceae teste vehementer

tosta, crustas ulceribus obducunt: quare prurigi-
 ni & papularum eruptionibus medentur. Podagri-
 cis prosunt: strumas discutiunt, cerato exceptæ. Tor-
 nacum terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum
 testa effectus. Melia colore cinereâ eretriam imita-
 tur, aspera tactu: ea digitis friata, deraſi pumicis
 modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remis-
 siusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè
 linguam siccatur: purum corpus reddit, & colore
 commendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras
 abstergit. Pictoribus vsum præbet ut colores diu-
 tius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ di-
 cuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra
 & omni alia in vniuersum, eligi debet recēs, mol-
 lis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attri-
 gerit, facile resoluatur. Ex ampelide terra, quæ
 pharmacitis nomine, in Seleucia Syria nascitur,
 laudatur in primis nigra, piceæ longos carbonēs re-
 ferens, modicè asbulosa, æquabili splendore, quæ de-
 trita, accepto oleo, statim eliqueſcit. Vitiosa censetur
 candida, & cinerea, quæ in liquorem non resolu-
 tur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calli
 blephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus
 eius ad illinendas vites sub germinationis tempus,
 utpote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

Fuligo qua pictores vtuntur, ex vitrarijs offi-
 cinis colligi solet: siquidem ei palma tribui-
 tur.

ur. Vis ei adstringendum & erodendum efficax:
 coacta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium. CAP. XCVI.

Atramentum quo scribimus, fuligine è tedis
 coacta colligitur. In singulas libras gūmis,
 erna fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiam è re-
 inarum & pictoria fuligine, de qua paulò antè
 liximus. Assumitur autem fuliginis mina, gum-
 ni, sesquilibra, glutinis taurini, atramenti suto-
 y, singulorum sescuncia. Additur conuenienter
 rodentibus medicamentis: Ambustis, ex aquæ
 ommodè crassius illinitur, sed non antè solua-
 tur, quam cicatricem induxerit: sanatis si-
 quidem vlceribus, sua sponte decidit.

Caterùm habes, amicissime


Aree, ferè quæ tradenda
 duximus pro ope-
 ris modo, quæ
 destina-

ueramus & materie auxi-
 liorumq; medica-
 lium copia.

Q V I N T I L I B R I
 F I N I S.

Hb 3

P E D A N E I I
D I O S C O R I D I S
A N A Z A R B E I, D E
venenis, quoq; modo arce-
antur, vitenturq;
Liber VI.



V P E R I O R I B V S ami-
cissime Aree libris tradidimus de ar-
omatibus, oleis, vnguentis, arboribus,
& earundem fructibus, lacrymisq;
item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, ole-
ribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis, metal-
lisq;. In hoc verò totius operis ultimo, facultates
medicamentorum recensimus, quæ prodesse nobis,
aut officere possunt. Vitata igitur orationis proli-
xitate, opus institutum prosequamur. Huiuscemo-
di autem tractatus, cum bisariam distributus sit
in partem venena precauentem, ita ut ne fallam
sumentes, aut si quando per imprudentiam den-
tur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaq;: & in ra-
tionem ipsius succurrendi, qui iam noxiam sentiunt:
primū disseram de precauendi modo, quem esse dis-
ficillimum plerique maiorum arbitrantur, quod
dantes clam venena, ita insidias temperant, ut pe-
ru

ritissimum quenq; decipiant. Siquidē venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mīstura odoramentorum eximūt: aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur: et præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganū, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymū, irim, origanū, alrotonū, castorū, aut si quid medicamentis purgatorijs cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt: vt vinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, mūsto: succis, vt in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs quæ assumitur, edulij speciē referētibus. Quare qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad saporem horum diligenter attēdere, præsertimq; potu frigidā aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates agerrimè postea cōcoquuntur. In ægris quidem facilè canemus potiones auxiliij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum artifices: itaq; ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facilè incauti seductiq; homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires habent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

caricæ sunt cum inglandiam nucibus manducata
 & quæ cedromela vocant, id est citria, seminisq;
 napi drachma cum vino. Item folia calamynthæ
 aut ercta quæ Lemnia sphragis appellatur, pon-
 dere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis iugla-
 dis nucleum: aut caricæ duas, & salis callum ieiu-
 ni sumant, & nullo veneni genere lædentur. Anti-
 dota ex vino sumpta eundem effectum præbent: in-
 ter quæ intelligitur magnū Mithridatium, et quor-
 scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæ-
 pe venenis obsistunt peculiares quidam corporis affe-
 ctus certo quodam modo constitutores cum qua-
 dam cibi potusq; qualitate, tum vini copia ita tem-
 peratorum, ut cum venenis dissentiant: siquidem
 ingesti veneni vires frangunt, atq; iam priore ali-
 mento farctis præclusisq; meatibus, obstant ne mē-
 bratim per digestionem insinuetur. Verum enimue-
 ro, quoniam fortuna necessitas interdum similia di-
 scrimina peregrè agentibus affert, absq; ullis insi-
 dijs hominum, nonnihil differendum mihi de hac
 re necessarium duco. Iam primū igitur culinam
 apparare loco subdiali convenit, cibosq; & potus
 in huiusmodi loco struere. Si id fieri cōmodè ne-
 quit: secunda erit conditio hæc, apparandi appo-
 nendq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia
 animadvertenda: frequenter enim à superioribus
 contabulamentis animalia decidunt, exigua qui-
 dem, sed quæ non modicam perniciem moliantur,

ut

et phalangia, stelliones, et alia quædã reptilia. Por-
ò vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanque
reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbē-
lo, noxium virus eructarunt, interdum verò delapsa
immersaq; expirarunt, & exitij causas haurien-
tibus attulerūt. Sed hæc hætenus dicta sint, ne cau-
i & prouidi insidijs pateant. Quod si qui sua spon-
te, aut ex quorundam insidijs sumpserūt, auxiliari
rimo quoq; tempore oportebit: siquidem dum co-
mites singulorum venenorum notæ expectantur, im-
mediabile fit venenum, & paulisper neglectū, me-
dicamentis agrè cedit. Quare si qui pro comperto
virosum sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eo-
rum qui aderant testimonio constet, protinus ad
donea remedia transeuntes, facile peculiari nati-
uæq; constitutioni restituemus. Neque enim ijs as-
sentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi fru-
stra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi,
quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus insident,
medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrūt
venena, medendi rationem aspernantur? Aequè
verò omnes morbi pro causarum ingruentium
magnitudine, proq; antecedentibus affectionibus
qualitatibusq;, quibus sit opportunum corpus,
vel medicaliles sunt, vel nullæ cedunt medicamen-
tis. Quod si qui forsitan obmutescentes, aut remu-
enti, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nul-
lam nobis eius cognitionem prabeant, tum pro-

tinus accedendū ad ea quæ cōmuniter epotis quibus
 cunq; venenis opitulari consueverunt. Atqui nullū
 magis in omnia valens auxiliū dari potest, quā
 ut proximo loco virus foras exhauriatur, priusquā
 inuale scat. Quare sine mora, calidum oleum ex a-
 qua, aut seorsum, ut vomitare cogantur, dare con-
 uenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cū
 aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago,
 vrtica, fenograceo, aut halicæ decocto, vicem eius
 exhibebit. Hæc enim nō modō vomitionibus exigēt
 vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed alui
 quoq; subducent, & corporum inanitione ita ad-
 uersabuntur, ut acrimonias venenorū hebetent. Id
 quod euidenter huiusmodi argumento deprehen-
 dere licet: Estō, ut quisquam viua calce vel face, aut
 cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulce-
 rare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulce-
 rationē nō accipiet. Atqui neq; velementer adstrin-
 gi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perun-
 gatur. Quinetiam vomitus non ob id modō quod
 vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamen-
 tum adfert, sed quod assumptum virus nunquam
 odore, coagulatus grumis aut colore, prodat: quip-
 pe cum odore & amaritudine, meconium: colo-
 re, cerussam, gypsumve: grumis lac aut sangui-
 nem animalis recens iugulati ostendat. Nam
 grauis odor regestorum, leporis marini, aut ru-
 betæ beneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab ijs
 rem

remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transcurrentibus. Oleo etiam maluae decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carnum iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesq; , & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Alium nanque subducunt, vti diximus: & stomachum resoluentia, prouocant ipsam ad vomitionem reddunt & venenorum acrimonias hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inlubent. Quin etiam medicamenta dantur, quæ communi dote prosunt: vt Lemnia terra, agaricum, abrotonum, iorio, radix eryngii, semen pastinacæ, & calamintha, nardum gallicum, castorium, ferule virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, pencedani succum, aut panacis, & radix quam magudarim appellarunt, aristolochia longa, syluestris rutæ semine, et betonica, quæ cestron nominant folia singula cum vino drachmæ pondus sumi debent. Effectum præbet poly decoctum, & seseli, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in salce operis scripta reliquimus. Communis ratio præ

præstandi auxilij ita se habet. Cæterũ ab ijs quæ
 consueuerunt euenire, communia remedia sumpti-
 tari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm plu-
 rimorum, in affectus consimiles corpus tandẽ redi-
 gunt. Quam ob causam plerisque communia cõdu-
 cunt auxilia: varia etenim sunt venenorũ genera,
 cõmunes tamẽ nec multi iðem affectus oriuntur.
 Neq; fieri potest, vt omnes cõcurrentesq; casus, quæ
 symptomata vocant, vnum venenum sequantur.
 Alioquin superuacanea fuisset venenorum singulo-
 rum traditio cum suis remedijs ab authoribus de-
 scripta. Neque verò in vno eodemq; promptum est
 inuenire, vt quis stomachi, alui, intestinorum, ieco-
 ris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur,
 vt singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur,
 obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiri-
 tus difficilis fiat, veterno prematur, vertigo obuer-
 setur, caligent sensus, stranguletur, sitiat, sanguis
 erumpat, febre conflictetur, agrè lotium reddat, tor-
 minibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prema-
 tur, rubescat, luore sugilletur, palle scat, desipiat, ster-
 tat, viribus deficiatur, & pleraq; alia faciat, patia-
 turq;: singula enim in generales affectus deducta,
 pauca numero, & cõmunia ea demonstrant, quæ
 euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ supra
 diximus, non facili fuerit deuoratum virus cogno-
 scere. Nam oris & linguae erosio, stomachi, ven-
 tris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vri-
 na

ne difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus
 lancinatio, & in plurimis partibus quidā adustio
 vis sensus, non in cātharticis modo potis reperiun-
 tur, sed in crucis quoque pinorum, & luprestē, &
 salamandra. Porrò non modò eos qui meconiū hau-
 serunt, veterno aut sopore premi, stertere, liuore
 sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto cor-
 pore pruritum sentire, sensu priuari constat, sed
 eos etiam qui mandragoram aut cicutam deuor-
 arunt. Delirium non hyoscyamus tantum in-
 fert, verum etiam quæ toxica appellantur: iti-
 dem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica
 gignitur. Strangulatio non minus in fungis,
 quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa,
 gypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni
 veneno propriū inuenire signum, quod haustum, gu-
 statumq; virus prodere possit: maximè, quòd hæc
 ceterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exo-
 riuntur, communia sequi solent. Cæterū in his quæ
 celeriter enecant, noxā signis forsitan indicare pos-
 sit, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ys
 qui ad longas egritudines spectant, nihil ad me-
 dendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat
 ad indicia noxæ, utpote cū venena statim atq; præ-
 sentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in
 longos affectus, communia reliquorum vitiorū re-
 media, cōpositionesq; flagitent, cū venifica pro-
 prietas non amplius insit. Si verò longa sit affectio,

. in

in aliquod diuturnorū morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæc tenus. Consequenter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mādabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficā vim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur quòd nonnulla eorum quibus vtuntur: venenis sunt commistā. Incuria enim magnas adfert noxas, & sepe continuo vsu eorum, homo in perniciē agitur. Proinde animalia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruca, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liqueamenta meconium, opocarpason, thapsia succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit charmaleo, aconitum, thapsia, veratrum, ixia, agaricū nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicū vocant, quod in Cholchide nascitur. Herbae oleraq;: smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum, solanū manicum, quod et dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla: gypsum, cerussa, calx, auri pigmentum, duo

duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

C A P. I.

Quibus datae sunt cantharides, signa eueniunt gravissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quiddam cedria respiciunt, dextra praecordia inflammantur: urinam aegrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine concidunt: postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox ubi vomitione plurima reiecerunt, halice aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut fenigræci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, elystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Datur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquæ

que factus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partis insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, ut pote quae dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lavare, ut per cutem summam, quae corpori noxia inhaerunt, etiam excernatur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catulis, maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem alium cient, atque venenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius elibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quae aster appellatur, si quaternae singulorum drachmae cum passo sumantur. Item pulgium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutae decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ.

CAP. II.

Is qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, linguae ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire videatur:

iur: corpus totum exæstuat: fastidium vrget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tam n pro simpli-
ci oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis et oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis. CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam venter quàm stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies cõtenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post vomitus & evacuationes, quas clysteribus molimur, arida ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmarum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiãnum omne genus esse, & lac humanum libere, conuenit.

Salamandra. CAP. II II.

SI Salamandram hauserunt, lingua inflammatio consequitur, mens & sermo prapeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeq; diutius immorante veneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum

ex melle linctum, & aliugæ decoctum, in quo nuc-
clei pinei conterantur: vrticæ quoq; folia, cum lilijs
& oleo decocta. Prosunt etiam oua testudinis ma-
rinæ aut terrestris, cocta: item ranarum ius, cum
quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

CAP. V.

Symplo ephemero, quod aliqui Colchicon, aut
syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto
corpore excitatur, non secus atq; ijs qui vrticæ aut
scilla lateffuntur: interna rosionem sentiunt: stoma-
chus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum in
ualefcente morbo, cruor strigmentis admixtus, per
aluum exigitur. Quibus, vt ijs qui salamandram
hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari con-
ueniet: sed antea quàm venenū inualefcat, claudum
est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut
malicorij: lac bibere prodest, in quo serpillum sit de-
coctum: item succum sanguinalis herbæ, aut ramo-
rum vitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ,
aut myrti cum vino. Bacca autem myrti tuse tri-
taq; , & aqua macerata, vt liquor inde sumatur,
opem ferunt. Media castanearum tunacula, simi-
lem effectum prabet, si cruda in aliquo supradi-
ctorum succo sumptitetur: origanum quoque cum
lixiuio epotum: eximie iuuantur asimini lactis
aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant:
ita vt quibus copia lactis huius adsit, non aliud
desideretur.

Dor

Dorycnium.

CAP. VI.

DOrycnion, quod aliqui manicon solanum ap-
pellarunt, epotum, lactis saporem in gustu re-
fert: continentes singultus ciet, humor linguam ve-
xat, sanguis confertim reicitur: mucosa quedam
perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque
antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt ante-
dicta, vomitus, clyster, & quæcunq; potum vene-
num expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, a-
qua mulsa, lac caprillum, aut asinum, dulce vi-
num, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdale
amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam
conchyliæ omnia, tam cruda quàm tostæ esse salu-
tare est. Conueniunt & locustæ marinæ, & gam-
mari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum.

CAP. VII.

AConitum statim in lingua inter libendum, cū
adstrictione quadam dulcescit: & subinde,
potissimū cum exurgere conatur, vertigines offun-
dit: lacrymas ciet: grauitatē pectori, & præcordijs
adfert, simulq; crebri spiritus deflatur. Quare vene-
nū vomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus
est. Utimur inter propinandum, origano, ruta, mar-
rubio, vel absinthij decocto, cū vino absinthite, vel
semperuino, vel abrotono, vel chamælæa, aut aiu-
ga. Prodest etiam nummopobalsami drachma, cum
melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis
ponderibus ex vino. Coagulum hœdi, leporis, aut

linnuli cū aceto, ferri quoq; stercus, item vinum, in quo aurū, ferrū, argēūmve candens restinguatur, potum: lixiuūq; cum gallina & vino decocta, aut carnum bulularum præpinguium iura, cum vino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heracliæ. CAP. VIII.

ME in Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntve, non secus afflicti sunt, quàm qui aconitum eliberrunt. Iis eadem quæ poto aconito conueniunt: adiuuantur in primis continuo vini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum. CAP. IX.

Coriandrū ob odorem latere nō potest: epotum autem vocem exasperat, insaniam adfert, à temulentis non abhorrentē. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, venenū fatentur. Quibus post vomitionē irino oleo concitata, vti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum, nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anserē: passum quoq; cum lixiuū sumptum.

Psyllium. CAP. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mxtore quodam affert, ita vt animum despondeant. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicis

Cicuta pota vertiginem excitat: oculisq; caliginem offundit, ita vt minimū cernatur: singultus ciēt, mētem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu strangulātur. Quare inter iutia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodū deiectionē moliemur, vt quod ad intestina prolapsū sit, excernamus: tūdemum in meracā potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per intervalla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potuidum, aut absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passō, & passum per se largius potum proficit.

Smilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis Staxus appellatur: frigus vniuerso corpori strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ conueniunt.

Epotus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Aduuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonia ranunculi herbæ generi assignatur, quæ rescentibus mentem adimit, & quadam

neruorum distentione labia in risum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagrum in vulgus infauſto omine manauit. Post vomitum peculiariter conuenit aqua mulſa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfacientibus: in calidam aquam oleumq; descendant, ſed tum multum perſticare & inungere expedit: & in ſumma, curam omnem, quæ conuulſioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyofcyamus.

CAP. XV.

Hyoſcyamū potum aut comeſum, ſimile ebrjſ habalienationē mouet: ſed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulſa copioſe data, lacq; præſertim aſinum, ſi id deſideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis ſemē ex paſſo ſumptum, & vinum falſum cum adipe ſuilla recenti, paſſoq;: itidem vrtica ſemen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & ſinapis, & naſturtium, radix, cepa, & allium: & hæc ſingula cum vino ſumantur. Poſtea ſinendi quieſcere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora.

CAP. XVI.

Mandragora ſi bibatur, conſeſtim ſopor inſequitur: exolutio, ac vehemens vetermus, nihil temere diſtans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex iſ accadat, vomitus & aqua mulſa proderit:

rit: postea nitrum & absinthium, ex vino dulci aut passo sumatur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è liacernarum exustione & extinctu. Quod si agrè i reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

Meconium.

CAP. XVII.

EPoto papaueris succo, quem meconion vocant, cõsequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehemente, ita ut sæpe inualecente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitione, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosacco calido: merum cū absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum satureiæ aut origani decocto, cū vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

Quod corniculatū papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre cõsuevit, quæ pa-

pauers succus nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

Quod pharicon vocant, sapore syluestre nar-
dum imitatur. Resolutione nervorum potius
affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem
post vacuationes vinum absinthiten potui dare, cum
cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod
sermen aliqui vocauerunt: aut spica nardi duas
drachmas, & myrrha totidem obolos, cum passo:
aut irum cum croco ex vino: dera sumq; caput illini-
re hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quod bar-
barorum sagittae eo illinebantur. Qui bibe-
rint, labiorum & linguae inflammatione torquen-
tur: incoercitus furor varias ijs imagines obuersat:
quare vix medicinae locus est raroq; qui hauserunt,
euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum
rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen
bibendum cum vino. Priuatim ijs conuenit, quinq;
folij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eo-
dem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex
cum lacte tritus: malaq; cotonea trita esse, aut cum
pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum &
balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti
sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere,
stupidi reliquum vitae tempus degunt.

Ixia. CAP. XXI.

Ixia,

IXia, quæ vophonon appellatur, inter potandum aliquid ocymo simile gustu & odore redolet: vehementem linguæ inflammationem excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus supprimit: strepitum cum animi deliquio ciet, ijsq; intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post vomitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota, rutaq; syluestris semen, aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita vt singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamelææ aut thapsiæ aut absinthij succi silicus cū aqua mulsa, & acetum calidum potum.

CERUSSA. CAP. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut malua decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex vino tritam, vel lixiuiam ex sarmentis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut

hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod vlmus
plorauit, aut humor quem vlmæ folia reddiderunt,
cum tepida aqua: sed tum quoq; vomant. Conuenit
etiam thapsiæ succus, aut scammonia, cum aqua
mulsa potus.

Fungi.

CAP. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt: omnes
tamen strangulatus suspensio similes conci-
tant. Quibus confestim succurrèdum: communiter
ex oleo vomere cogendi: mirificè iuuat lixiua ex
sarmentis aut pyrastris surculis, epota cum sale, po-
sca & nitro. Fructus, aut folia pyrastris cum fun-
gis decocta, strangulantes illam vim auferunt,
esitataq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gal-
linacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolo-
chiæ drachma: item absinthium cum vino melleq;
sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex ni-
tro, panacis radix & semen in vino, fex vini cre-
mata cum aqua, atramentum sutorium ex aceto:
radix, vel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

CAP. XXIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat:
quare eadem proferenda sunt, quæ mansis
fungis, auxilia, & ad hæc malua decoctum, quod
etiam olei vicem pensat: utpote cum pingue sit, eno-
mendo lubricas vias & faciles reddit, detradiq;
corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapidem,
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua
mul

mulsa, aut ficorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & organum aut thymū cum lixiuia, aut aceto, aut passō: hīq; decocto malua proluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumq; cōcitāt: faucium tonsillarumq; meatus cum neruorum distentione praecludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quaedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublimē relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretū sanguinem discutiūt, & aliū subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese auxiliantur: nec secus coagulum omne cū aceto & laserpitij radice, aut lasere itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Iis qui seruātur, stercorosa & fluida per sedē egeri cōsueuerunt. Stomachū aliūq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. CAP. XXVI.

EOs qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida.

da, item succum : aut laserpitij radicem, aut laser-
cum posca : thymumq; ex vino, & cum luto suo
luxuriam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam
magis lac coiret, & in casum densaretur. Neque
illos vomere conuenit : siquidem concretum lac sese
in gulæ angustias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inte-
stinalibus grauitatē cum magnis torminibus ad-
fert, & nonnunquam pondere suo intestina vulne-
rat, urinamq; supprimit: corpus intumet, plum-
beamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit
secundum vomitionem, potum syluestris homini
semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssop-
um, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vi-
no: aridum palumbis finium, cum nardo & vino.

Argentum viuum. CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ spuma
argenti infert, eisdemq; vtendum auxilijs.
Lac copiose potum auxiliari constat sed postea euo-
mant, qui hauserunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

CAP. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, po-
ta aluum & intestina cum vehementi ero-
sione excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admi-
stu illorum acrimoniam hebetāt, ac soluant, & fa-
cilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci
&

& malua succus est: natura enim utrique perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel seminis tragi herba, vel oryza, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium virus olent: procedente tempore, alius dolore afficitur & vrina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent: fictido ac graui sudore manat: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asinum, vel passum continuè, aut radicis malua foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammoni succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respiciant, aspernenturq;, solis fluuiatilibus cancris vesci possunt, bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his percoquunt. Cumq; appetere & comesse pisces ceperint, suae salutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumores ciēt, pallor corpus vehementer decolorat, ut planè buxeum spectetur, spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq; & inuita
inter

interdum genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum vomitionem multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo.

CAP. XXXII.

DEuorata cum aqua hirudines, si ori ventriculi adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebeant: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut la serpiti folia, aut betae, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrū ex aqua gargarizatur, aut atramentū sutorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, inieciela lupinorū farina, aqua frigida ore contineatur, & ad eā hirudines exilient. Prouidendum etiā ijs, quae etsi ferendi auxiliij gratia tradantur, non minora tamen ceteris venenis pericula saepius adferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agaricum: nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouēt. Quibus ea medentur quae in fungorū mentione & similibus retulimus. Nimios autē deiectionū impetus, medicamentis quae excrementa supprimunt coercemus. Neque negligenda quae parū quidem nocere videntur: interim verò vitā in discrimina agūt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouae glacies,

pap

pappi recētes: flores autē sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

Aqua frigitla abundē pota, aut meracum vinū liberalius epotū, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorū, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mitridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verū quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione supersedemus.

Venenata. CAP. XXXIIII.

DE bestijs quæ virus eiaculantur, & exitiabilibus venenis, ideò scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicum perducatur: siquidem pars hæc nō minus quàm cætera aliæ, necessaria est ijs qui artem medicā exercent, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastidia duo, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuentibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, Alexipharmacus: quo

quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueverunt, præmonstrabimus: in qua nonnihil auxili ferunt. Omnia autem in præceptu, & ad manum habere artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem: siquidem pauca è venenis & virulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula ciunt, ita ut dilationem admittant. pleraque; verò præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim male alijs cogitantes, ingenua prauitate maleficium ita temperant, ut spatium curanti liberum non relinquunt: partim scel. ris admissi conscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte veneno, mortem sibi consciscere conantur. Qui postea deprehensi, aut recipientes, & vitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasque; puteanas hac labe polluentes, certam & inevitabilem aduersarius perniciem moluntur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito, sed aliquanto post grassari natura sua comparatum est, tamen nisi primo quoque tempore coercetur, & remedijs subinde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitiali vi veneni. Proinde non vulgari industria diligentiaque; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars consuevit, in his quoque; salutem mortalibus præbeat. Quin & apud priscos genus hoc unum existimabatur esse eius parvis, quæ medicamentis pugnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præc

ratationem, & modum precauentem, salubris
sanantiq; medium statuentes, parua & leui supra
nodum persuasione decepti. Siquidem treis in hu-
manis corporibus constitutiones esse contendunt:
nam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra va-
letudine corpora laborant: tertium, qua medium
inter vtraq; locum sibi vendicat. In qua positi, sa-
nitatem specie mentiumur, facileq; in morbos &
pericula concidunt, ob vim corruptricem qua cor-
poribus nostris incumbit: quemadmodum in ijs vi-
dere licet, quos exaulescens rabie canis momorde-
it, necdum tamē aquā horrēt. In ijs quoq; qui can-
tharidas hauerunt, sed nondum vrinae tormento
cruciantur. Tripartitō igitur artem digeri, tripli-
tiq; corporis constitutioni meritō respondere tra-
dunt. Salubrem partem esse volunt, qua sanitatem
tuetur: precauentem, eandemq; prohibentem, qua
obstat quo minus in morbos incidant: & sanantē,
qua vitia discutuntur. Quibus ita responderi po-
tēst, quod primum ex ista ratiocinatione non treis
corporis tantū, sed quatuor haberi constitutio-
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui nec-
dū morbo laborant, morbo tamen maximē ob im-
pendentem, causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priore morbo defuncti, nondum tamen secundae va-
letudini restituti sunt: id quod in ijs qui à mor-
bo proximē sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
rium recreationē & robur desiderant. Sed quem-

Kk

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionē eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus vitimur auxilijs, altiore scarificatu, vñtionibus, amputatione, derodētibz epithematis, potionibus perniciosi occurrentibus, & plerisq; alijs. Verum enim vero sunt vsq; eò rudes nonnulli, vt ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceāt. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cū verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliare remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aëris occasionem, opportuni, & in morbum proui redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, vt inoffensa valetudine degant, nec morbis confluentur. Neque id silentio prætereandū, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, vt suis locis ostendimus. Cum vñ igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à virul

virulentis animalibus venenisq; cōtrahuntur, voca-
 ri cacos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.
 Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter
 sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus ob-
 seruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, an-
 numerari solent. Neque prorsus verum deprehendi-
 tur, affectus huiusmodi cacos esse. Nam quod sem-
 per se protrahit, & nullum in quibusdam necessa-
 rijs vsum exhibet, laud facili coniectura colligi po-
 test: etsi naturæ proprietate prorsus cacos eos af-
 fectus concedimus, qui ab exitiis venenis, &
 animantibus quæ virulento morsu sciunt, cōtra-
 huntur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præ-
 bet, datq; medendi occasionem, neque imperceptibi-
 le, neque cæcum, nulli re causæ obnoxium reputa-
 tur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstra-
 tionem se habere, & opinionem de abditorum co-
 gnitione cōfirmare poterit. Nam etsi sæpe minora
 sunt, quàm ut sensibus percipiãtur, euidenter tamẽ
 ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles au-
 tem in eo cōmentario quem Plustarcho dicauit, satis
 modos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nossẽ
 quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in vi-
 peris, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum
 animo reputans, ut quamuis exiguo sint corpo-
 re, vixq; conspectui subiciantur, magnorum tamẽ
 discriminum ac dolorum causas inferunt: quo-
 rum nihil præter quandam corporis exiguitatem,

vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morſu conficiunt, attingitur? quorum aliqua vellemẽtes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec deſunt quæ præſentaneam perneciẽ moliantur. Aut quantulũ eſt quod à phalangj morſu ingeritur, & vniuerſum corpus excruciat? neq; enim qui magnitudinẽ ipſorum deprehendere poſſet, cum prorsus exigua mole conſtet. Ergo quòd hæc ad affectus referantur, cõſtitit inter omnes. Verũm quòd exactẽ deprehensum ſit, vim quandam ipſi ineſſe mortiferam, quæ inſinuata corporibus moleſtiarum, quæ exoriuntur nobis cauſa ſit, in conſeſſo eſt, & omnium conſenſu perſuaſum. Nec quiſquam inuenietur vſque adeò contentioniſ ſtudio flagrãſ, qui aliunde exoriri moleſtias aſſeueret, quàm à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quanam res opus hoc efficiat, vt nihil prorsus nos laadat, incomprehenſa communis cauſæ quæ proprijs ineſt ratio: quandoquidem tum euidenter indicari poſſit cũ deprehenſa eſt. Ideò Eraſiſ tratus empiricorũ pertinaciam graui cauillatione inceſſenſ, cecis affectibus cauſas aſſignauit, inſiciatus hiſ cõmunem, & ſupremam morborum cauſam incomprehenſibilem eſſe: & hanc in eo quem de cauſis ſcrip

scripsit commentario aptissime prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi observationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est. Primum enim genere comprehendere facile possunt. Quod autem si letifera vis, corporaque permittans, ita ut perimat, ex iis quæ per genus, et non per speciem vagantur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis, & ante observationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem, ad demorsæ partis suclum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ vim eandem adipiscuntur admoovit, postremo partem amputavit: secum reputavit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, immixta ad intima perniciem repugnant. Hæc itaque quæ disseruit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur, verum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immixta vis φθγοροιοῦς, id est mortifera, nominatur: φθγοροιοῦς autem nullius officij alius esse potest, quam cause. Atque hæc nomina, μαρτίσι ππ & ἀνα-

Kk ;

καλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nulla enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quæ admodum in his vocibus μάστιγες & ἀντακαλύπτειν, partes neque certos neque principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιεῖν partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt, incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuantur: & cum desinunt, & dem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phlogoropæon subici potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit: quemadmodum accidit ijs qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque cuius causa neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phlogoropæon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod

autem asserunt, vocabula quædam in se non habere
 parteis rerum significatrices, sed nuda, & simplici
 pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum
 non omnia, sed per pauca talem nancisci conditio-
 nem existimandum est: neq; enim $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\rho$ in hoc no-
 mine $\phi\theta\omicron\rho\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\rho$ perinde atq; assumptitia pro-
 fertur, sed longè principem obtinet significationem.
 Quemadmodum enim $\phi\theta\omicron\rho\acute{\alpha}$ s, id est corruptio-
 nis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc
 verbum $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\rho$ sumi debet, vt nihil amplius ex eo
 quod hanc dictionem $\phi\theta\omicron\rho\acute{\alpha}$ secum habeat, decla-
 ret: neq; prorsus id significat, quod omnes palàm
 audiunt, & huic simile redditur, $\pi\alpha\iota\delta\acute{\iota}\ \acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota\mu$
 $\delta\iota\ \&\circledast$. Si dant à corruptione sanis fieri morbu,
 concedunt utiq; vim in huiusmodi verbo $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\rho$
 subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem effi-
 ciat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur
 per singulas causas quæ corporibus subiiciuntur, idq;
 tam in letalibus venenis, quàm in ijs quæ corpori-
 bus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causa-
 rum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt,
 non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se
 dogmaticos profitentur, causam esse partim prepa-
 rantem, partim continentem asserunt: vt inguinum
 vlcus, & inguinariâ febrim, et quæ affectui tum
 assistat, tum etiam separetur, vt à fractis præci-
 pitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natu-
 ra causa fuerit, nec vlla diuisione cõprehenditur,

vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorū quæ idē genus sortiuntur. Sed quod phthoropneon causa sit, nomen ipsum argumento est, & in iis quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante vim, & illapsum in corpora virus? Neque enim frigus, neq; æstus, neq; selectiōem corporis, neq; cruditatem, neq; aliud quicquam simile causari possunt. Verū quoniam causarum differentiis gaudet, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroque istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem verò, quod morbis presentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de iis hæc tenus. Statuendū itaq; mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, variis modis est certandū, donec vis tota corporibus excutiat. Modò enim reuocari debet ea parte, quæ pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coërceatur, quàm altius irrepens viscera tangat: aut eius pernicies eluatur, retundaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vomitionibus: si morfu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exueltu carnis circumscriptione,

ne, nonnunquam amputatione extremæ parti, euocantur. Retinentur verò infusione, & imposito medicamentorum acrimia cohibentur. Hæc simul utque arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, & euicuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremò deiectione alui, euocatus sudor, et alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero non leuissimam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet. Etenim ab ijs remedia quàm plurimum discrimen capessunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas aut exteriores excitant: alia vehementissimos dolores aut cecos cient: alia vix medicamenti cedunt, & magis minusve molestias excitant. Oportet autem ea, quæ peritula ferunt, pericacioribus auxilijs expugnari & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamenti homines in discrimen adducere: in minoribus verò, vehementium auxiliorum iniuria corpus lacescere. Finito à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula, et præsentem molestiam adducit, illud verò sensim, et dilatata in diem longam aut breuiorẽ producit. Itaque in acutis quidem confestim multa simul auxilia re præsentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quæ-

dam artis formula breuiter definita sint. Iam me-
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorfor ū
ab eo. CAP. XXXV.

DE rabiosi canis morsu sermonem alijs prapo-
suimus, quòd id animal domesticum ac fre-
quens esse consuevit, & in rabiem sepius agitur,
ac perit, ab eoq; cauere difficile: inde periculū in-
euitabile hominem manet, nisi multis utatur au-
xilijs. Canis plerunq; flagrantissimis aestibus in
rabiem efferatur: interdū quoties frigora incesse-
runt. Rabiosus autem potum, & escam auersatur:
largam spumantemq; pituitam naribus, & ore
proicit: toruē & solito tristius intuetur: in omnes
passim sine latratu irruit, & aequè feras homi-
nesq; tā familiares, quàm ignotos mordet: nec pro-
utinus infestū quicquā infligit, nisi ut vulnus, dolo-
rem: exinde morbus ille, qui ab aquae metu hydro-
phobicus Graia est voce appellatus, contrahitur.
Euenit autem cum distentione neruorum, totiusq;
corporis rubore, praesertim faciei, cum sudore, &
languore quodam. Aliqui aurae splendore fugiunt:
alijs sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt
etiā qui canū more latratus adant, & obuiā fa-
ctos morsu adoriuntur, ac mordendo similivicio la-
befactant. Proinde ex ijs qui hoc vitium senserint,
neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex hi-
storia vnum aut alterum euasisse audiamus: siqui-
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorē incidisse, et euasisse fatentur. Alij ipsum cum amulo aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberee, quadā naturarum cōcordia similem cōtraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, antequā ipsam experiretur, vindicauimus: & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

CAP. XXXVI.

Ratio medendi duplex: vna communis, qua vtendum in omnes morsus, quos virulente animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre cōsueuit: alijs verò inutilis, maximè qui ex nullo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem eorū quā minutissimè tritum habere reconditum, iisdem gentianæ radicem tusam cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris cancro- rum coihlearia, vnumq; gentianæ coniiciantur: hac in polente dilutioris modum subacta, quatri-

bio

duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu bini ternive dies fluxerint, curationē auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium quod & plerisq; vnum satisfecit, eoq; cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra inuitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet. Satius autem multo fuerit etiamsi in vanum recidat, medicamentorū inhumanos tolerare cruciatu, quàm per inertiam ac desidiā in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vererī oportet, vt iuin ora, & vicusculis cutis similia quippe maiori vulnere cōfertim copiosus sanguis emanans, potest nōnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, et prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtrisq; circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitula cū multa flamma agglutinata vel iuuamenti pręstāt, vt veneni vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vipote cū ignis cetera viribus pręstet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiatur, simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fundamentum

mentum curationi futurae praebeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustae decident, ne ulceris orae coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idque praestitutum tempus, ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari convenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè praestabit, & sylvestre allium detritum: item cepae, succusque praesertim Cyrenaeus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa quam non mansa imponantur: siquidem subacta pistare à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Ceterum tempestivus eorum usus minimè est contemnendus. Si verò, quod persaepe accidit, ante dies praefinitos cicatrices coeant, committerenturque, manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi verò propositum tempus praeterit, ulcerus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post sinapismo utendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

CAP. XXXVII.

Quae ad partem istam pertinent praesidia, ita se habent. Ceterum victus rationem ex ijs quae veneno aduersantur, coniecturae

Ethura quadam colligere oportet, simul ut veneni
 vires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quomi-
 nus ad intima pernicies illabatur. Etenim assum-
 pta perniciosarum virium penetrationi resistunt.
 Quorum utrumq; prestare potest vini meracioris, pas-
 si, & lactis potus: quippe qui hec omnia capiunt
 ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem
 eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorum,
 porrorum, ceparumq; cibis: quod ea difficulter con-
 ficiantur, vixq; aboleantur. Nam multos dies hu-
 ius cibi qualitates remanet, quo tempore nec euincun-
 tur, nec permutantur a mortifera vi, sed contrariis
 illa vis expugnat. Cui rei antidotorum usus accom-
 modatur, & theriaces, Mithridaticae, & eius quod
 eupatorio temperatur. Deniq; omnium quae magnam
 aromaticam partem sibi vendicant: quippe aromata om-
 nia viribus & substantiis agere permutantur:
 quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc mo-
 do se habet: Nosse conuenit, pauorem aquae non sta-
 to definitoq; tempore exoriri plurimum tamen ad
 quadragessimam usque diem neglectis differri consue-
 uit. Post semestrem etiam nonnullos inuadit: quendam
 post annum aquam horruisse constat. Quae nobis vi-
 su coperta fuere. Narrat et aliquos post septennium
 aquae melius fuisse tentatos. Inter principia dcmor-
 forum a cane rabiosa curandi ratio talis est. Ve-
 rum eum uero si ea quae retulimus auxilia, primis
 diebus praetermissa fuerint, nec scalpro carnem

cir

circinare, nec vñtionem experiri operapretium est.
Non enim quod iam pertransit, satis euocare pos-
sent. Nulla vtique istius rei occasio aut vtilitas, sed
in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò
curationis modus accedat. Deiectio magnum pra-
bet iuuamentum, vt pote cum mouēdo, corporis ha-
bitum transmutet: & quæ colocynthiilem recipit
hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem
moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, &
meraculi potus, quibus vis veneni vehementer re-
tunditur, quotidie sumi debent. Caterum sudores
ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi si-
napismiq; alternatim per corpus totum adycien-
di. Sed longè omnium efficacissimum auxilium
helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non se-
mel atque iterum, sed frequentius ante quadrage-
simum diem, vel post hoc tempus vti licet. Tan-
tam enim vehementiam hoc auxilium habere fer-
tur, vt quidam qui iam aquæ metum sentirent,
sumpto helleboro, simul ac primum morbi impe-
tum experirētur, fuerint seruati. Nam et iam vitio
tentato nemo vnquam seruare potest. Itaq; primū
curā contra rabiosi canis morsus breui sermone ex-
posuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus sa-
uire cōsueuerūt, transcendū. Notas vno cōtextu, de-
inde communē medendi modum, qui omnibus con-
uenire possit, explicabimus. Cursim deinceps sub-
iungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxi-
lium

lium præstare possunt. Postremò subnectentur
etiam venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à venenatis de-
morsati sunt. CAP. XXXVIII.

DEmorsis à phalangijs locus quidē ipse, qua-
si ab impaeto aculeo rubet, non intumescens,
nec per ambitum calidus est, sed mediocriter hume-
scit: vbi verò contrariorum occursum refrixit, con-
sequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum
& inguinum, conuulsionibus non dissimiles. In lū-
bis collectio exoritur, & perpetua vrinae libido la-
cescit, multaq; reddendis excrementis colluctatio.
Vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacry-
mant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopen-
dra aut dicta opluo tene, morsum intulit, locus
per ambitum liuore sugillatur, & computrescit:
interdumq; licet rarò, sæculentus atque ruber cer-
nitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusq;
id negotium exhibet, serè remedijs inuictum: præ-
terea toto corpore prurigo sentitur. Scorpionis
morsu inflammari statim incipit locus, & inciu-
rescit, ac intentus rubet, vicissimq; dolore premi-
tur. Modò siquidem exæstuat, modò frigore occu-
patur. Labor repentè fatigat, & aliquando me-
liuscule habet, aliquando vero recrudescit. Cōsequi-
tur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ cor-
poris partes refrigescunt, inguina extolluntur, per
sedem flatus exennt, capilli eriguntur, pallor mem-
bra

bra decolorat & dolor, tanquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis parvibus denigratur, & ita obstupefcit, vt tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur. A mure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proxima partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoq; tormina, difficultas vrinae, & frigida asperginis offusio consequuntur. Si vipera momordit, corpus intumet, vehementer arefcit, subalbidumq; colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustulae adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingivae ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa uerum erumpit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinae difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs qui à caecilia nomine, aut amphibana demorsi sunt, eademq; ferè auxiliantur: quare hoc venenum prius tam descriptionem sortitum non est, neq; visum est

dignum quod alio genere comprehendatur. Adryi-
no morsis pustula molestiq; dolores inuadunt, pra-
sertim quā diluta sanies emissarium subest: quin-
etiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab haemor-
rhois icteris vehementes cruciatus accidunt, qui an-
gusta contractaq; corpora ex continuo dolore red-
dunt. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunq;
parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine ma-
nat. Excrementa per anum cruenta eiciuntur,
profluxensq; sanguis in globos coit. A pulmone san-
guinem extussum, & in vomitiones effusi sine re-
medo commoriantur. Quos dipsas percussit, so-
lutus ac non constrictus tumor premit, siusq; vsq;
eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla inter-
capedine excruciet, etsi potum pleno ore assatim
trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde
toto habitu similes sunt ijs qui antea potus nihil
hauserint. Quare propter cōtinuam sitim, & pre-
ster, & causon, aut dipsas appellatur. Ab natri-
ce demorsis vlcus dilatatur, & liuidum ac ingens
auadit. Sanies ex eo multa, & atra, & male olēs,
non secus atq; ijs quae serpunt vlcibus, expuitur.
Cencliri morsum, qui viperino icterui similis est, pu-
tridum vlcus sequitur. Carnes antea, ut in aqua
inter cutem, prætumida, desluunt. Lethargo corri-
piuntur, & veterno pressi somnos captant. Eras-
stratus eos iocinere, intestino ieiuno, coloq; consti-
tari auctor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferē
pars

partes corruptæ reperiuntur. A crasse percussis
 locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sa-
 nies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto
 concretu varicosus intumescit: genitale intenditur:
 mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique
 rigore neruorum distenti commoriuntur. Ah aspi-
 de ictis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta
 acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille
 quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnu-
 bit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis,
 & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander
 perpulchrè cecinit: At vir perit absq; labore, virens
 atq; discolor: mediocris stomachi dolor afficit: frons
 perpetuò reuellitur: genæ contremiscunt, quasi sine
 sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad' diei
 trientem non dilata. Erasistratus in libro quem
 de medicaminibus & venenis condidit, de vocato
 basilisco scitè ita refert, Cùm basiliscus momorde-
 rit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaq; in plu-
 rimis quæ virus eiaculatur, comites notæ ita se ha-
 bent. Transeuntes utiq; ad medendi rationem, pri-
 mum, vt fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus
 virulentos.

CAP XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis ictum,
 quod venenum vibrat, oris suctio conuenit.
 Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ci-

bum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locu ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcuscula altius imprimere expedit, quo virosa materies, profundo euocetur. Circinatio autem carnis & sectio, scarificatione longè potentius opitulatur: namq; ab ijs duo peculiaris praesidia fiunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod eius veneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoq; sanguine excernitur. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitæ cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed iam de vstione supra in rabioforum morsu differuimus. Si verò icth pars, vtpote extrema, eam sectionem commodè non respuat, praesertim in omnibus serpentium icthibus, ut aspidis, cerasæ, similiumq; proculdubio amputanda est. Cõuenientiora supra dictis auxilia sunt quæ epithemata vocant. Imponatur sarmentitius cinis, aut ficulus, cū lixiuo stillatitio subactus, garo, & acris salsamento: porri, cepæ, & allia modè minutissimè cõtrita illinuntur, modo cremata vulnribus inijciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui hisce tanquã discordia quadam naturali pugnatilius utantur: verum huius rationem inire facillimū fuerit. Gallinæ enim calida natura praeditæ sunt, argumento, quod deuoratum insigne virus consiciunt, & aridissima quæq; semina consumunt.

mant: item nonnunquam arenas lapillosq; inglu-
 e sua deuoratos, dissoluunt. Itaq; animantis ad-
 oti calore adutus spiritus, ab icta parte impetū
 apessens exiliensq; secum venenum exigit. Nec me-
 rit quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegy-
 ti metunt, ollam picis paratam habent, & appen-
 dim fasciam: tūc enim maximè serpētium iniurias
 expauescunt, tum propter spicilegi tempus, tum
 quòd opacis simul abditæ speluncis & cauernis, de-
 oq; aruorum cespite delitefcūt. Molesissima enim
 animalia & virus eructantia, Aegyptus in cam-
 pis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut par-
 tem aliam, morsum intulerunt, qui adsunt, fasciam
 in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum bra-
 chium aut crus paulum supra vulnus obligant, &
 arctissimè duo è presentibus distringunt, locumq;
 secantes qua circumactus est laqueus, picem instil-
 lant. Cumq; satis vulnus excepisse videtur, laqueū
 resoluunt, & cepis alijsq; supra memoratis illi-
 nunt. Præterea pix liquida cum sale trito & fer-
 uente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter inno-
 uetur. Conuenit & cedria, & sinum caprarum
 ex vino decoctum. Locum aceto calido, calamintha
 in lotio maris aqua, aut acida muria decocta, fo-
 ueri salutare est. Quinetiam non desunt emplastra
 vehementissima, & calidissima, qua venenum eli-
 cere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi
 sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye com-

ponuntur: de quibus consequenter erit tractandum.
 Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos
 incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates
 conscripserunt, ut elephanti fel crocodilive sangui-
 nem ouaq; testudinis, & consimilia. Nam cum iu-
 uantia quædam literis tradidisse videntur, plane
 in hac sola incidentibus imposuerunt. Quare talia
 deuitanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate,
 peruestigari possint: neq; quò nostra fides ipsi obstrin-
 gatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimen-
 tum præstiterint. Quæ autem ad communem o-
 mnium usum pertinent, quæq; facile suppeditari, et
 omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt,
 subiungenda videntur. Intulus itaq; & erica, &
 astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpen-
 tium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virena-
 tes platani pilule in vino diluto coctæ, & paliuri
 decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctæ
 etiam lauri bacca & deuorata, piperq; largius esi-
 tatum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porro-
 rum priuatim ex pane, aut allium, aut cepæ, sal-
 samenta q; quàm acerrima: origani decoctum cum
 vino potum, fœniculi, pulegij, calaminthæ, porro-
 rumq; succus cum melle desorptus. Hæc quidem à
 plantis conquiruntur. Ab animantibus verò quæ-
 dam utiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in
 cibo, leporinum coagulum cum vino, itidem casto-
 rij sextans: testes marinæ testudinis sumpti mul-

sum

um prodesse traduntur: mûstella sale inueterata
 inter auxiliaria medicamenta est. Commendatur
 in primis exenterata, quæ sale siccescens inuetera-
 tur, ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis
 est. Sed de simplicibus, quæ dari solent hætenus. Per
 ussis à serpente prodest alui deiection, diffluens su-
 lor, vrina copiosè reddita. Sunt et compositæ quæ-
 lam potiones, quæ mira remedia polliceri tradun-
 tur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis si-
 ilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ
 iabæ dantur cum vino. Itidem syluestris ruta se-
 ninis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galba-
 ni, singulorum pares portiones trita, & cum eru-
 cæ succo subacta, digeruntur in pastillos, qui drach-
 mæ pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum
 vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dice-
 rem. De peculiaribus remedijs contra bestias quæ
 venena vibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia virulen-
 torum ictuum.

C A P. X L.

INter ferientium venenatorum notas nihil de ve-
 spis & apibus articulatim digestimus, quod
 conspicuè omnibus forent, & nihil excellens
 aut notatu dignum in his obseruaretur: inter re-
 media tamen, earum meminisse non fuit alienum.
 Igitur aduersus vtrarumque ictus prodest illita
 malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fatus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerē, adiecto sale trito & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiā cum hordei farina & aceto subactam. Ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinēda. Lauacris perpetim vtendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliae herbae semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina conuenit. Item myrica fructus, & camapityos, & viridiū cupressi pilularū decoctum, admisto vino. Sunt qui fluminalis cācri expressi succū, cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestiis liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sal quā lenissimē tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fovendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut ferpillum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis a scorpione, praesenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse qui ictum vibrauit, tritus, & percussio loco impositus, suae plagae remedium est, ob cecam quandam naturarum (vt constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, huius semine, & aithra, scorpium conuenit. Sulphur igne

ignem non expertum, resina terebinthina exceptū,
& emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem
galbanum ad spleniū formam ductum, & calamin-
tha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino
parata, in decocto rutæ. Semē trifoliæ herbæ tritū,
& vulneri iniectū opitulatur. Hæc ad affectum lo-
cum pertinent. Post hæc quam efficacissimis potio-
nibus vtendū, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præser-
tim corticis linæ drachmæ cū vino, iusa gentiana,
& pulegium decoctū, & bacca lauri paucō nume-
ro trita, & calamintha cum posca, in qua magno-
pere discoqui debet: cupressus cum vino & rutæ,
nec secus ficulneum lac, la serpentinum, si adu: sin de-
sideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est po-
tio trifoliy, & ocymi semen. Horum autem omniū
vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, &
diluta vini potiones. Ei qui marina pastinaca ici-
tur, omnia quæ de viperarum morso paulō post re-
feremus, simili modo conueniunt. Peculiariter au-
tem ictus à marino scorpione, & dracone inferun-
tur, qui molestos cruciatus ciunt: interdum autem,
sed rarō, nomas excitant. Quibus absinthij, saluiæ,
aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastina-
ca diuulsa & vulneri imposita, sui ictus medela
est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex gal-
bano spleniū per se vulneri exterius impositum, vt
medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea fa-
rina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui veneficia luit: resistunt quoq; acini dulcis puni-
ci decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita,
necnon aqua calida fatus: sed hæc ad locum perti-
nent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime
si in vino detur. Præterea serpillum, et galbanum,
et erucavino madefacta, recētes cupressi pilulæ cū
aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethriū
cū vino, & chamelaonis herbæ radix. Nec desunt
qui literarum monumentis tradiderunt, tritū mu-
rem araneum cōtra suos ictus commodè libi. Quā
hīstoriam apud alios inuentam, dignam duntaxat
censuimus, quæ annotaretur. Alij asseruerant demor-
sum non aliās exulcerari, nisi prægnans mus ara-
neus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt. Si vipera
morsum impressit, simum caprinum cum vino,
studiosè impositum opitulatur. Item laurus, &
abrotonum, & galbanum splenij loco superiectū,
& origanum viride inditum. Pulli gallinarum
discerpti, & confestim admoti: erui farina vino
subacta: radicis cortex vsque eò tusus, vt in pulue-
rem solutus abeat, & scilla tostā: detritum chama-
melum hordeaceæ farinae cataplasma in aceto mul-
so preparatum: sed locus antè eo calido foveatur.
Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-
lus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-
lio constantem auxiliari produnt. Leporini coagu-
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi
hem

hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, &
ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum
frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, &
porri recentes, ſaſſamenta acerrima, & opipara.
Simplicia hæc ſunt. Percuſſis à vipera præclare au
xiliatur medicamentū, quod myrrha, piperis, caſto
rij, floris portulacæ ſeminisq; , dimidio acetabulo
conſtat: hæc omnia in Cretico paſſo teruntur, aut
in alio probato. Eraſiſtratus in eo libro qui περὶ
σωμάτων, id eſt de viribus, inſcribitur, pleraque
alia tradidit, quæ iſtis ab vipera auxilium ferre
poſſunt: inter quæ talia maximè laudantur. Galli
nacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ braſſi
cæ tritum, & acetabuli meſura cum vino potum.
Quinetiam bonū eſt digitum in liquidam picē in
tingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bi
bere. Hæc ſunt quæ contra viperæ iſtus auxilian
tur. De amphibana mentionem hoc loco fecimus,
quoniam ferè remedijs ad viperas ſcriptis, percuſſi
ab ea adiuuari ſoleant. Adryino iſtis conuenit ari
ſtolochia cū vino pota, trifoliū herba, radix haſtu
læ regiæ ſimiliter aſſumpta, & fructus ex omni
quercus genere, & tuſcæ ilicis radices, & illiæ par
ti iſtæ auxiliantur. Hemorrhoi diſſatisq; morſus
velut immedicabiles à plerisq; maiorum deplorati
relinquebantur: quare ſi peculiaribus contra diſſa
dem remedijs egeamus, communia experiri operæ
pretium erit. Protinus autem ſcarificatione uti,
vſtion

ustionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata admove, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salsamentis, utiles esse. Meracæ potiones & lavacra prosunt, quæ subinde interiecto brevi spatio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit, quo semel erumpente, opem ferre nō potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoidæ eadem prosunt. Insuper quæ in commune opitulatur, ut scarificationes, ustiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in diapsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum & aqua subactum, lixiua cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliguata. Bibuntur etiam hinc aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino. Fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satireia trita, & syluestris ruta, & serpillū cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Itē cardamomum & gētiana. Si cerastes percussit, cita partis amputatio suffragatur: quare sine mora ictam partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vren-

na

tia insuper reliquijs admouenda: siquidem virus
 hoc veneno basilisci simile est. Iis qui ab aspidē fe-
 riuntur, quæ de cerasē scripta sunt auxilia dari de-
 bent. Nam venenum hoc, quemadmodum basilisci,
 aut sanguis bubulus, celeberrimè in arterijs sangui-
 nem cogit. Ad basilisci morsum, vt Erasistrā-
 tus author est, auxiliatur castorij
 drachma in vino pota: item
 papaueris succus,
 Ictuum re-
 media
 ita se habent.

SEXTI ET VLTIMI
 LIBRI FINIS.

NOTHA ET DIO- CSORIDI FALSO

adscripta, quæ ut facile, si quis ita uelit,
suis singula locis applicentur, numeris
notantur: quorum primus Dioscoridis
paginam, secundus uersum signat.

6.12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thelpi-
de, ab alijs vrania, a nonnullis catheron aut thau-
mastos, à Romanis marica radix, à quibusdā gla-
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecatrix, ab
Aegyptijs nar appellatur.

8.2. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-
reā, aut radicē nauticā, Galli piper apium vocant.

9.6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13.23. Magi sanguinem Martis, Latini perpen-
sam, alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij ce-
rea, alijs nardū rusticū, Galli bacchar, Hetrusci suc-
cinū: odorata herba est, qua in coronamētis utunt.

14.8. Quibus odor inest cinnamomo proximus:
asperum siccumq; solum amat. Eius radix, ruptis,
convulsis, in tussi vetere, & spirandi difficultate,
& si vrina agrè redditur, opifer. est: menses ciet:
contra serpentium ictus, eam in vino bibere saluta-
re est. Folia, ut quæ adstringant, illita capitis dolo-
ribus, oculorum inflammationibus, incipientibus
agilopijs, mammis tumentibus à partu ignibus sa-
cris

NOTHA.

eris auxiliantur. Olor somnum gignit. Crateus herbarius de eo ita scriptum reliquit. Asarum.

24.17. Alij spagnon, alij phasganon, Syri diaxylon vocant.

27.5. Ab aliquibus castor, ab alijs cynomorphos, à magis Herculis sanguis appellatur.

28.23. Symphyton aliqui vocant, alij persicā, alij medicā, alij oreštū, alij neclariō, alij cleoniā, alij ideābaton, aut phlomi idcum, Latini terminalium, aut enulam Campanam, Aegyptij lenen.

68.29. Iuniperum paruum Græci arceuthida, aliqui mnesitheum, alij acatalidem, Aphri xnorinsipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

69.15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alij mnesitheū, alij acateram, Romani iuniperum, vulgò cognita est, cupressō assimilis: asperis maritimisq; locis plerunq; nascitur, easdem quas supralicta vires habens.

59.17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Romanis herba Sabina appellatur.

76.7. Rhamnum alij persephonion vocant, alij leucacantham, Romani spinam albam, aut cerualem spinam, Aphri atadim.

67.21. Halimum alij damasonium vocant, alij erymon, alij britanicā, alij rhabdion, alij basilion, magi Mercurij basim, aut Oseridis diadema. alij elys

DIOSCORIDIS

elysthephanon, aut sacrū caulē, Pythagoras anthe-
noros, Aegyptū asontiri, alij asphen, alij ascaluri,
alij asariphen. Latini albucium aut ampeluciam.

85.6. Agnon alij agynon, alij lygon vocant,
alij amictomianon, alij tridactylon, magi semnō,
alij hēm-aideos. Aegyptū sum, Romani salicem ma-
rinam, alij piper agreste, alij lecrisiticum.

122.20. Eorū vter sale conditus, & in umbra
siccatus, cōtra eximias vacuationes medicamentorū,
trium drachmarum pondere, praesenti est auxilio:
quandoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri au-
tem debet in farinam, & aqua subactus dari.

158.18. Telin, alij carpon, alij buceron, alij ego-
ceron, alij cerantidem, Latini fenum graecum appel-
lant, Aegyptij itasin.

159.5. Aliqui linocalamin vocant, alij annon,
alij linō agrion, Romani linum, Perri Zēraphoēs.

164.15. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij
brechon vocant.

165.10. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij
golgosium, Romani rapum vocant.

166.10. Alū polyides eryngiū, Aphri thorphat.

167.5. Sylvestris raphanus, quam Romani ar-
moraciam vocant, alij montanum raphanum,
alij apium, alij iscada, alij chamēbalanum. Roma-
ni etiam radicem sylvestrem: ramulos tenues, iun-
ceos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs rutæ syl-
vestris, oblongioribus, & angustioribus: semine
par

NOTHA.

paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri
figura, cādido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars
radicis superior vomitiōe bilē pituitamq; extrahit,
inferior per alui, tota susq; deq; purgatiōes mouet.
Quod si iibi in animo est succū extrahere, radix tu-
sa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pin-
na eximit. Is sesquiobolo potus, vtraq; pie purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotripam appellant, alij
triplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anthema vocauit, Zoroa-
stres diadema, Aegyptij chocortem, magi lienem
capra, aut muris vrinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Ae-
gyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocant.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestri. Cap. Syluestris
portulaca, quam aliqui aizoos syluestre vocant,
alij telephon, Romani illecebram, aliqui portula-
cam. Aphri mæmoen, Daci lax, Aegyptij mochmu-
tim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsu-
tis, latioribus: nascitur in petrosis, nonnunquam in
hortis, folia oleæ habet, minora multo, plura & te-
nera, rubentes cauliculos, ex vna radice multos, in
terra sessiles, qui māducati bonum succum pariūt,
viscosi, et aliquātū, salsi. Visi excalfactoria, acris,
exulcerans: discutit strumas, cū axungia illita.

M m

DIOSCORIDIS

173.3. Aliqui petræon, alij myacantham, alij myon vocant,

173.27. Arnoglosson, alij arnion vocant, alij probatiō, alij cynoglosson, alij heptapleurō, alij polyneurō, Magi eurechnemona, Aegyptij asonth, Romani plantaginem, Hispani thxaricam. Pœni alijrcon.

175.10. Syrius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires desecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

175.12. Aliqui aquatilem anagallida, alij dare-nion, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

175.21. Alij Veneris coronam, Romani veneræ, aut eusteralem.

176.24. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Pœnis atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

177.2. Sonchon asperū aliqui cichoriū vocant. Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

177.26. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Romani intubum.

180.9. Thridaca hemeron, Romani lactucam satiuam, Aegyptij embrosi dicunt.

180.21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrum, Romani lactucam syluestrem appellant.

181.8.

NOTHA.

181.8. Romani bisacutū, Aegyptij dorisatrum,
Syri adorium, Aphri tiriēta appellant.

181.16. Romani herbam scanariam, aut acul-
lam nominant.

181.21. Alij caucum, alij myitin, Democritus
brion. Romani pedem gallinaceum, aut pedem pul-
li, Aegyptij seselin vocant.

181.28. EuZomon Romani Erucam vocant,
Aegyptij ethrericem, Pæni asuric.

182.27 Alij cynomorion appellant, à similitu-
dine, canini genitalis, alij leonē, Cypraj thyrfinem,
communiter lycon.

185.27. Crommyon aliqui polyidos vocāt, ma-
gi calabotim, Romani cepam.

186.26. Græci scorodon, alij geboscon, alij ela-
phoboscon vocant.

188.9. Romani sinape vocant.

189.9. Cardamon alijs cynocardamon, alijs
iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Roma-
nis nasturtium dicitur.

189.25. Aliqui thlaspidion, alij sinapi persicū,
alij myiten, alij syluestre sinapi, alij dasmophon,
alij myopteron, alij hitron, Aegyptij suitepsum,
Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedem
gallinaceum vocant.

190.20. Aliqui chamæplion, magi Hercules
alphita, Aegyptij erethmon.

194.4. Ab aliquibus cerdon, ab alijs cathar-

DIOSCORIDIS

sis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamerrhyton, à magis callirrhhyton, ab Aegyptijs xno, à Pienis syris, à Latinis lanaria herba aut radícula appellatur.

194.18. A quibusdā cissanthemon, ab alijs cissophylon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites, ab Osthane aspho, à magis miaspho, Aegyptijs thesee, à Romanis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab alijs arcar vocatur.

160.14. Dracunculus. Cap. Draguntii magnū aliqui aron, alij isaron, alij iaron, alij hieraciū, alij biarō, alij arniagtion, alij ciperiūla vocāt: in umbrosis sepibus gignit. Caulē habet rectū, leuē, duūm cubitorū, haculi crassitudine, versicoloribus draconū maculis, purpureis tamē euincētibz: folia rumicis, inflexa: fructū summo caule facit, racemosum, coloris primū cineracei, mox per maturitatē in crocum & purpurū vergētis: radicē pręgrandē, rotundam, candidā, cortice tenui vestrā. Colligit, & dū maturescit, succus exprimit. succaturq; in umbra. Radix quoq; mēribus effoditur, elotaq; particulatim cōciditur, & funiculo transfixa siccatur in umbra. Cū diluta potiōe, crudā, coctā mēve, cū melle delingi prodest, cōtra orthopnæas, rupta, cōnulsā, iussim, et destillationes: pota cū vino venerē stimulat: vlcera quę cacoethe vocātur atq; phagedenica, expurgat, pręserim cū vite albæ: ex ea et melle collyria

NOTHA.

ria ad fistulas & partus euocandos cōponuntur:
ad vitilignes cū melle, efficaciter illinitur: polypos
& carcinomata absumit. Succus ad oculorū medi-
camēta, itē cōtra nubeculas, caliginem, albuginesq;
effectū; prabet: herbæ radicisq; odor, teneros conce-
ptus abortu vitiat: itē si triginta grana eius in po-
sca bibātur. Sunt qui eius succū cū oleo aurīū dolori-
bus infudere: quinetiā folia, vtpote quæ adstringāt,
vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut ra-
dicem exemerit, posse à vipera feriri insciantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracō-
tiam, Cypriū colocasion dicunt.

198.13. Græci asphodelon, alij narthecion, Ro-
mani albucum vocant.

199.11. Floret mēsisibus albucum. Quare æqui-
noctio verno, antequām semen adoleuerit, deme-
tendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita-
tem inlubere, quod herbarius Crateuas assēuerat:
addiditq; sanare podagra dolores, si drachmæ pō-
dere bibatur.

200.7. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe
impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad sup-
purationem perducunt, & rumpunt.

202.4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij cor-
ui malū, alij ophioscorodon, alij phyllostaphylon,
quidam thalliā, aut petræam, alij olophyton, alij
ioniten, nonnulli oligochloron, aut acuntion, aut

DIOSCORIDIS

hippomanes, alij trichomanes, magi potera, alij pentheron, aut cor lupi, alij alochorodon, alij crinon, alij thlaspin, Romani persicu sinapi, aut inturim, Aphri herbiacathon.

203.16. Ranunculū aliqui syluestre apin vocāt.

204.8. Anemonem, alij agriam, aut nigrā vocant, alij anemonem phoenicam, alij enemion, nonnulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinem aut barbylam, Osthanes berilion, item ornios ceranion, Pythagoras atractilida, magi cnicum agriā, Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

205.16. Aliquibus ænone vocatur, alijs anthemis, alijs homonœa, aliquibus flos campestris, Romanis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia, Gallis corona.

205.22. Ea, vt herbarius Crateuas author est, cōtusa cū axungia, strumas discutit. Cribrata cū farina cū nitro, & sulphure ignem nō experto contra vitilignes efficax est: eaq; sicco linteo antea confictas in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone, quam artemonen aliqui, alij arselam, aut sarcoellam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syluestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones impositu sanat: oculorum inflammationes mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur: vulnera cōglutinat: conuulsis, & vellicatibus imposita medetur, inflammationibus utilis, contra serpentium mor

NOTHA.

morsus cum vino bibitur.

205.24. Anagallis purpurea, quibusdam æritis aut ægitis vocatur, alijs sauritis, magis oculi sanguis, aut chelidoniō: Romanis macia, Hetruscis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphrō. Anagallis communis, quibusdam corchoron, alijs halicacabon, alijs Zeliaurus, magis nycteritis, Aegyptijs meci, Romanis aneciaton, Aphris asirrisæ.

206.12. Aliquibus citharon, alijs cissaron, alijs chrysocarpos, alijs poëtica, alijs corymbethra, alijs cysion, alijs dionysia, alijs ithytherion, alijs persis, alijs cemos, alijs asplenos, Romanis sylua mater, alijs hedera, Gallis suhites.

207.17. Chelidonium magnam nonnulli pœoniam vocāt, alijs cratæam, alijs alybiū, alijs glauciā, alijs pandios radix, quidam philomedion, alijs othion, Romani fabium, Galli thonan, Aegyptij moth, Daci crustana.

290.13. Auricula muris. Cap. Myosota alijs myoton, alijs anthyllion, alijs alsinen, nonnulli myorthochon, alijs myrtosplenon, Latini muris auriculam vocant, Aphri labatholabat. nomen ideò accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideò alsine dicta est. Ea helxine similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus cōuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus insillatur: in totū ea-

D I O S C O R I D I S

dem potest, quæ helxine.

209.24. Isatis satiua aliquibus augion, alijs egne, Magis arufion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

210.8. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, satium glastu, luteu florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre, in cacumine autem folliculos linguae speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulemq; supra binum cubitorum altitudinem attolli: syluestre vero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore: florem purpureum, aut coeruleum, fructum cruciformem, asperu, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

210.10. Aliqui syluestre semperuiuum, alij portulacam syluestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurin.

213.3. Aliqui Rhiam vocant.

213.29. Aliqui centauriam radicem, alij aloen Gallicam, alij narcen, alij chironion, Dardani aloitin, Romani genus aut cicendiam, alij ciminalem vocant.

214.29. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

216.4. Appellatur à quibusdam ararisa, & melecaprui, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, ioutitis, Gallis theximion, Aegyptijs sophocph, Siculis chamamelon, Italis malum terre. Da-

NOTHA.

cis absinthium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petrosis. Ad gravem febrim efficax est, si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur: vulnera imposito sanat: carcinomatis narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest: rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Cratenas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradiderunt, et præterea podagricis eam auxiliari.

216.6. Glycyrrhizam aliqui pōtīcam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticā, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithram, alij libyestason, alij homœnomæon, alij peenthæomæon, Latini dulcem radicem appellauere.

216.24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronē, alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestim, magi Herculis sanguinē, Romani phierri, & vneferam, & fel terræ.

217.17. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnorum, vrinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217.19. aliqui limnesion, alij helleboriten, alij amaranton, magi Herculis sanguinem, Latini febrifugiam, alij auram, multi radicem, Daci tul-

DIOSCORIDIS

ni saluam vocant.

235.4. Hedyosmon satium alij mintham, alij calamintham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherthumerthumonihu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymide, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij stephanen, Daci mosulam.

237.23. aliqui 7ygin syluestrem, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominat amaracū, alij triphyl-
lon, alij agathides, alij cnecion, alij acapnon, Pytha-
goras thrambē, Aegyptij sopho, Armenij myuron,
magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini
maioranam.

239.20. aliqui organida, aut hysobriū vocāt.

239.28. alijs syluestre basilicum, Latinis oci-
mastrum.

240.25. ruta montana, quā aliqui rhyten mon-
tanam vocant: & hortensis, quā Aegyptij epnubū,
Syri harmala, alij besafa, Aphri churma.

242.25. Syluestris ruta Cap. rutā sylustre ali-
qui appellāt hypericō, alij androsamon, alij coron,
alij chamæpityn, Romani hederalē, aut centonalē,
Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus
est, ideo chamæpitys aliquibus nominat. Frutex est
surculosus, rubescens, folia rutæ figura: flores lutei,
qui digitis triti sanguineo succo manant, vnde an-
dros

NOTHA.

drofemon vocitarunt. Ramuli subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis et asperis. Vrinâ ciet, menses appositu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitus medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leuconion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant. Latini rusticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babylon, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alij anicetum, magi cynocephali geniturâ, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini anethum, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci pulpum.

251.18. siue cuminum syluaticum.

251.11. Ammi, Latini ammiu Alexandrinum, quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.9. alijs sonchites, Romanis lampuca, Pæni sithuleas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion, Rmani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedinon, ab alijs hydrofelinon agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant, Aegyptij anonim.

254.6.

DIOSCORIDIS

ni saluam vocant.

235.4. Hedysmon satium alij mintham, alij calamintham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pberthumerithumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymide, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij stephanen, Daci mosulam.

237.23. aliqui 7ygin syluestrem, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominat amaracu, alij triphyl-
lon, alij agathides, alij cnecon, alij acapnon, Pytha-
goras thrambe, Aegyptij sopho, Armenij myuron,
magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini
maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocāt.

239.28. alijs syluestre basilicum, Latinis oci-
mastrum.

240.25. ruta montana, quā aliqui rhyten mon-
tanam vocant: & hortensis, quā Aegyptij epnubū,
Syri harmala, alij besafa, Aphri churma.

242.25. Syluestris ruta Cap. ruta syluestre ali-
qui appellāt hyperico, alij androsamon, alij coron,
alij chamapityn, Romani hederalē, aut centonalē,
Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus
est, ideo chamapitys aliquibus nominat. Frutex est
surgulosus, rubescens, folia ruta figura: flores lutei,
qui digitis triti sanguineo succo manant, vnde an-
dros

NOTHA.

drofemon vocitarunt. Ramuli subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis et asperis. Vrinâ ciet, menses appositu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitis medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leuconion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant. Latini rusticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babylon, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alij anicetum, magi cynocephali genitura, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini anethum, Aphri siciriam, Aegyptij arachu, Daci pulpum.

251.18. siue cuminum sylvaticum.

251.11. Animi, Latini ammiu Alexandrinum, quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.9. alij sonchites, Romanis lampuca, Pæni sithileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion, Romani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedinon, ab alijs hydrofelinon agrion, Romanis apiu rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant, Aegyptij anonim.

254.6.

DIOSCORIDIS

234.8. aliqui grielon, alij agrioselinum.

255.22. aliqui elaphicon, alij nephricon, alij ophi-
gerion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpyxon, alij
lymen vocant, Romani cervi ocellus, Aegyptij che-
min, Apliri ascaucan.

256.25. hippomarathrum, aliqui marathin,
alij marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, magi
thymarnolion, Latini feniculum erraticum, ali-
qui mion, Galli sistrameor.

257.29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs pa-
ralysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs del-
phinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron,
aut cronion, Romanis bucinus minor vocitatur.

258.14. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij py-
roton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, magi py-
riten, Romani salinarem vocant.

238.25. aliquibus Zea aut capsanema appellat.

260.19. aliqui arangē vocant, alij phalāgion,
alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, qui-
dam choroclanon, aut cenanthen, Romani herbā ru-
tinalem, Aegyptij apsapher, magi osirin.

261.21. aliqui agrion vocant, alij agriophyl-
lon, magi bonum: demonem, Romani satariam.

263.8. aliqui melanthium, alij mecona agrion
melana, Romani papaver nigrum appellant.

269.2. herba est ex qua ammoniacū fit suffi-
men, quod thymiama vocant, aliqui agaZylon,
alij criotheum, alij heliustrum, Romani guttam.

271.18. aliqui ampelocarpon, alij omphalo-

NOTHA.

tarpon, nonnulli philanthropon vocant.

271.29. aliqui aspidion, alij haplophyllon, alij accyseton, alij adyseton nuncupant.

272.12. aliqui cission, alij cissophyllon.

272.20. aliqui armyrō vocant, alij enicon sylvestre, alij aspidion, magi aphedron, Aegyptij che-
non, Romani praesepium, aliqui fusum agrestem,
alij colum rusticam.

273.2. quidam clinopedion, alij polygonaton,
alij Iouis colum, alij echeonymon vocant.

273.8. Edocuit experientia contritos in vino
albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quae vio-
lentiae vocantur, magno esse praesidio.

273.10. aliqui cleonicon, alij ocimoides, alij Zo-
pyron vocant.

273.21. aliquibus leontopodion, alijs leuceoron,
alijs leontiō, alijs doris, aut doriēteris, alijs lychnis
agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rha-
peion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Ro-
manis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

275.4. aliqui athanaton vocant, alij acyloniō,
alij ballarion, alij geranopodion, quidā corymbiō,
aliqui taurion, alij sceptron, aut maloton, Aegy-
ptij semeon, magi sanguinem apocathemenes, Ro-
mani genicularem aut ballariam.

275.7. aliās tragonaton, aliās atocion, aliās hic-
racopodion, aut lampas vocatur, Aegyptijs se-
mura, magis apocathemenes taurus, Romanis
agre

DIOSCORIDIS

agreste intubum.

275.13. Crinon basilicon alij crinanthemon vocant, alij gallirion, Magi Martis sanguinē, Osthānes aurem crocodili, Aegyptij symphæphon, quidā tialon, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Syri sasa, Aphri abiblabon.

276.6. Alij magnū vocāt, aliqui nophitan, alij notianoscemin, alij nosprasson, alij nothera, alij nochelin aut noſtelin, alij nophryn, alij gnotorim, alij gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut vlcerariam, aut marrubium nigrum, alij canthurinū. Aegyptij asphon, magi Iſionis sanguinem.

276.18. Alij melitaon, alij meliphyllon, alij erythran, alij temeſe, Latini apiaſtrum aut citraginem, Galli meriſimorion vocant.

277.5. Praſion, alij eupatorion, alij phyllophares, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij aſteropen, magi tauri sanguinem, aliqui apledron, alij Hori genituram, Latini marrubium, aliqui lebeoniam, Aphri atierberziam.

278.6. Aliqui phyllin, alij acaulon, alij sylueſtre lapathum vocitant.

278.16. Alijs leucacantha dicitur.

278.26. Alij cnicion vocant, Romani trifolium acutum, aut odoratum.

279.14. Polium montanum, aliqui tenuſion, alij phœux aſpidion, alij achamenn, alij ebenin, alij melosmon, nonnulli belion, quidam leonthocharon

ron

N O T H A.

non vocant.

282.25. Aliqui scorbion, alij pleuritin, alij dy-
sofmon, alij syluestre calaminthen, quidam chamae-
dryn, alij mithridaniō, magi Podotis sanguine, Ae-
gyptij apho, Romani trisagine palustre appellant.

281.13. Beclion quidam rhichion, alij petrinā
vocant, alij peganon, alij piithion, alij pagonaton,
alij chamaeleucen, alij procheton, alij arcophyton,
alij chamægeron, Aegyptij saariban, Latini tusila-
ginem, quidam pharphariam aut pustulaginem,
Bessi asa.

281.28. Quibusdam polyclonos, alijs monoclo-
nos, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anactorios,
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, magis homi-
nis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis valen-
tia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia,
alijs rapium, aut tertana, Gallis pona. Dacis Luo-
ste dicitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarū du-
ctus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sam-
psuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans,
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in
malagmati lentorem, & stomacho imponat, sa-
nitati restituetur: qui neruorum dolore crucian-
tur, si sucum ex rosaceo illinant, sanantur.

282.18. Romani caprum syluaticum vocant,
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij

N n

DIOSCORIDIS

merseon.

283. 6. Aliqui Pelonitin, alij tricā, alij geranog-
ronta, Romani vchinastrū, Aphri iūscen appellant.

283. 9. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxy-
phyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant,
magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmo-
niam, aut cicotriam.

282. 15. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocon,
alij anaxiton, alij anaphalim. Aegyptij semeon,
Galli gelasonen, Latini centumculum vocant, qui-
dam tucularem, alij albinum.

284. 8. Aliqui cerascomion, alij leucanthon vo-
cant.

284. 15. Conyza magna. Cap. Conyza magna
aliquibus cynoZematitis, alijs danais, alijs tana-
chiā, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dynosmos,
magis brephoclonos, quibusdam anubias, nonnullis
hedemias, Aegyptijs ceti. Romanis intybi, aut mi-
litaris, aut deliarium, aut febrifuga, alijs phragmo-
sa, alijs musteros, alijs pissa nuncupatur.

285. 2. Aliqui conyZam parvam, alij panion,
alij libanotidem, magi cronon vocant.

285. 10. Alij hemerocatalacton, alij crinon a-
grion, alij crinanthemon, alij porphyraētes, alij bul-
bum hematicon, alij anticantharon, Aegyptij io-
cri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut ma-
cinum, Aphri abiblabon vocant.

285. 28. Aliqui Basilicon vocāt, Latini violam
albā.

NOTHA.

lbam, aliqui angustiam, nonnulli violam matro-
alem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alij melion aqueum, alij entaticon, alij
riapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum
appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. à Latinis geminalis, à Dacis hormia di-
itur.

289.14. Aliqui osnada, alij ononin, alij phloni-
tin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrada appellēt, alij leucen,
alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitim, alij atu-
rion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtro-
doten, magi mustela sanguinem.

281.25. Quidam anthyllon, alij anthemida vo-
cant, alij eranthemin, alij leucanthemō, alij foran-
thin, alij campestrē florem, Romani solastrum.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemon, alij
eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamæme-
lon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melan-
themon, alij chrysocomam, alij calliā, Romani ma-
lum, Aphri aſtertiphen appellant.

293.11. Alij antemida, alij leucanthemon, alij
chamæmelon, alij chrysocalm, alij melabathron,
nonnulli campestrē florem, Romani solis secaliū, ali-
qui millefoliū, Hetrusci cautim, Aphri thamath.

294.5. Alij balsamenā, magi hæmorrhā, alij

DIOSCORIDIS

Mercurij geniturā, alij aphthitis semen, aut mint-
sitheum, Romani cappacoraniā, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelion, quibusdam orobax,
alijs hemagogon, alijs pæsedon, alijs monogenion,
alijs meonion, alijs pæonion, alijs panthiceratos, a-
lijs idei dactyli, alijs aglasphotis, alijs theodonion,
alijs selenion, magis selenogonon, alijs phthisis. Ro-
mani casta.

295.12. Alij agonychon vocant, alij leontion,
alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantali-
tin, alij diosporon, Romani columbam, Daci gono-
letam, alij heracliam.

296.3. Aliqui teuthrion, alij dracanon, alij cin-
nabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam mino-
rem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Alias cestron aut medusa dicitur, La-
tinè venerca aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinam dicunt.

297.12. Alij alithiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, alij schinostraphon,
alij asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydrastinam, Romani termi-
nalem dicunt.

299.6. Aliqui acopen, alij anagyron, alij agna-
copon vocant.

299.27. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, alij escaemenem,
alij hypericon, alij corion, alij chamæpytin. Ro-
mani

N O T H A.

iani opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocalem, Daci in iassexe appellant.

301.24. Alij ascyron, aut dionysiadem.

302.21. Alijs pitysorysis, alijs ori Zelon, ūs qui Pontum incolunt olocyron, alijs bryonia syluestris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, magis Minerva sanguis, Latinis aiuga aut cypripum, Dacis dochela appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices: animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta: grauibus somnis resistit: ad omnem medendi vsum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangulari, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorē finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij heracliam, alij asphalton, alij chiliophyllon, alij clemata, alij polycarpon, alij carcinethrō, alij tenthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion, alij Zarithream, alij pedalion, Aegyptū thephin, aliqui stemphin, magi genituram herois, aliqui vnguem muris, Latini sanguinariam aut semō

Nb 3

DIOSCORIDIS

nalem, Aphrichulum.

307.27. Alijs philetæron, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7. Aliqui epigetin, Aegyptij philacuon, Romani ambuxum vocitant.

309.23. Romani soldaginem vocant.

310.1. Rutaceis similes.

310.20. Alij tobion, Romani stipam vocant.

310.26. Alij calycanthemon, alij periclymenon, alij heliophyes, nonnulli hepatitin, alij milacem, alij anatolicon, alij diticon, alij merginem, Latini volucrū, aliqui volucrū maius, Aegyptij oxyui, alij clymenō, alij clymenion, quod et agonon nuncupāt.

311.8. Aliqui Aeginam, alij clymenon, alij carpathon, alij splenion, alij epatitin, alij axinam maiore, nonnulli clematitin, alij myrsinen, alij calycanthemon, magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon, aliqui sarxiphragon, alij empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest: singultum sedat: calculos vesicæ frangit, & vrinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs

neur

NOTHA.

neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mysijs mēdruta, Syris neudā, alijs lycosemphyllon: alijs belleborosemata, alijs scyllion, magis lupicor, Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabulum terræ, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

312. 27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313. 2. Aliqui medicam appellant, alij triphyl-
lon, alij clemation, nonnulli osmon, quidam trigo-
non, alij cypellion, alij polyphyllon, Romani trifo-
lium odoratum, Agyptij epaphon.

313. 11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à nōnul-
lis polyrrhizon, à Romanis vindicta nominatur.

313. 21. Aliqui anaclorion, alij phasganon, alij
machæronion, alij arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genitalem.

314. 10. Alij holon vocant.

314. 16. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos,
à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis a-
prus dicitur.

315. 2. Anchusam aliqui catanchusam vocant,
alij libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij
onophyllon, alij porphyrida, alij mydusam, alij sa-
lyca, alij noneam, Aphri huixsath.

316. 12. Aliqui aridam, alij alcibiadion, Romæ
ni alcibiaccum nominant.

316. 25. Aliqui & hæc echio vocāt, alij scorpiu-
ron, alij sparganō, alij altheam, alij amarantida,
alij probateam, alij elaphion, alij antiminon, alij

D I O S C O R I D I S

porphyrida, alij augion, alij nemesion, alij phileterion, alij hyenopsolon, alij thyrstitim, alij ihermusin, alij misopathos.

317.5. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egicon, alij amaxitin, Aegyptij amphivocant, Latini gramen, aliqui asphyllion, alij sanguinalem, alij violam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

318.9. Magi genituram, aut sanguinem Titani, alij scorpionis urinam, Pythagoras parmiron, Andreas xanthophanea, Osthane boephthalmos, Aegyptij sendionor, Romani vertemnis, alij soleastrum, Aphri vdedonin.

319.5. Aliqui myriomorphon nominant, alij chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, Latini supercilium Veneris, alij acron sylvaticon, alij militarem, alij millefolium.

319.12. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs selinorition, ab alijs asyntrophos, à magis Titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab alijs sentes, à quibusdā mora baticana, à Dacis matia, Aegyptijs hemoos, alijs ametros appellatur.

321.2. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani volucrum mains.

321.17. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alij pentatonion, alij pentadactylon, alij pseudoselinum, alij callipetalon, alij xyloloton, nonnulli xylopetalon, alij asphalton, alij pentacemon, alij thymiatitin,

NOTHA.

tin, Aegyptij orphitekeocen, alij enotrō, magi ibidis
vnguē, alij ibidis pennam, alij hermodactylon,
Romani quinquefolium, Galli pempedulam, Da-
ci propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phae-
nicopteron, alij rhon stachyos, alij osthaleu, Aegy-
ptij athnon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anaba-
sin, alij cheredranon, alij Phædran, alij itianden-
dron, alij gis, alij schænoſtrophon vocāt, Aegyptij
pherpfram, magi Saturni cibum, Romani equina-
lem, alij equi salicem, aut anabasion, alij ephyrō.

324.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganon, Romani cor-
nulacam, alij bituensa, Daci saliam, Aegyptij so-
ber, Aphri achæosim.

325.20. Oxyſchænos aliquibus schænos lewis,
alijs oxypternas, alijs Solis superciliū, Romanis iū-
cus marinus, aut manualis, Aphris cludua dicit.

325.13. Alijs adocetos, alijs neuras, alijs phry-
nion, Romani bouinalis.

325.17. Alijs chryſitis, alijs chryſanthemō, nō-
nullis amaranton, alijs diospogon, Aphris dubach,
vel burchumail, Romanis Iouis barba appellatur.

325.25. Aliqui chryſospermon vocant, alij da-
spin, alij organū, alij arcophthalmon, Romani

DIOSCORIDIS

aridariam.

327. 9. Aliqui calchitin vocant, alij chalcantion, alij calcantilemon, Romani acantham, Herusci garuleum, Aphri churseten.

328. 8. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobotanen, alij philtrodoten, Aegyptij pempte, magi Iunonis lachrymam, nonnulli mustela sanguinem, alij sanguinem Mercurij, Romani cristam gallinaceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij exuperam, aliqui herbam sanguinalem.

328. 20. Alij erigenion, alij chamalycon, alij sideritin, quidam curitin, alij persephonion, alij Iouis colum, alij dichromen, alij callesin, alij hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij pemptibem phtham, Pythagoras, erysi septon, Romani cinnalem.

329. 11. Aliqui chamaesycen, alij gatalen, alij onycha vocat, Romani pinum truiam, aut ficum terrae, aliqui glandulam, alij tium, alij nonariam.

329. 22. Aliqui heloniam, alij porphyranthes, Romani vaccinum, alij vlcinum vocant.

330. 4. Nonnulli oxytonon, Romani papaueralem, Aegyptij nanti.

330. 23. Papauer sativum aliqui chamaesycē, alij papauer rixada, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti.

333. 11. Aliqui paralion, alij sylvestre papauer, alij thalasion, Romani fabulum marinum, Aphri
sifim

sifimacam vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia accidit, quàm qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen aestate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij pythionion, aliqui dioscyamon vocant, alij adamata, alij adamenon, alij hypnotitō, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dithiambrion, magi, Pythagoras, & Osthanes, xeleo, Zoroastres tiphonion, magi rhapsodicā, Romani mananoentariam aut apollinare, Aegyptij saphitho, Hetrusci fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

336.5. Aliqui cataphrysin, alij cynocephalon, alij chrysalion, alij cynomyam, alij psyllerim, alij sicelioticon, Siculi comidijn, Romani herbam pulicarem aut silbacium, Aphri vargugum appellant.

336.27. Romani strumum vocant, alij cacubulum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismunim vocant.

338.2. Aliqui dircion appellant, alij strychnon manicon, alij dorycmō, alij calliada, Romani apollinarem minorem, alij vlticanam herbam, aut opsaginem, Daci cycolidem, Pæni cacabum.

338.19. Strychnon manicon, alij anydron, alij pentadryon, alij enoron, quidā orthogyion vocāt.

339.22. Alij exeranthēs, aliqui antimnion aut antimion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij

DIOSCORIDIS

ptij apenium, Pythagoras anthropomorphon, alij
alæten, alij thridaciam, alij cammaron, Zoroastres
diamonon, aut archinen, magi hemionos, aliqui go
noeonas, Rom. caninū mālū, alij terreſtre mālū.

342.18. Alij cyamon leucon, Rom. colomeſtrū.

343. 4. Gonion, aliquibus eginos, alijs ethuſa,
alijs apoleguſa, alijs dolia, alijs amauroſis, alijs pa
ralyſis, nonnullis aphron, quibuſdam creidion, alijs
æten, alij catechomenion, alijs abioton, alijs apſeu
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody
nos, alijs dardanis, alijs catapſyxis, Oſthani baba
thy, Aegyptijs apēphi, Romanis cicuta appellatur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij parda
lianches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij pha
leon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippomanes,
alij onuſtin, alij ophioſcorodon, alij cynaricam, alij
elaphoſcorodon, magi paralysin, Romani braſſicæ
ruſticam aut caninam.

344.20. Alij ſpongon, alij hæmoſtarin, Roma
ni rhododendron. Lucani icmanem, Aegyptij ſchim
phen, Poeni rhododaphnen dicunt.

345.23. Aliqui elitim vocant, alij canocerſeam,
alij amelxinen, alij euſinen, alij amorginen, alij ſu
cotachos, alij pſychuacos, alij melampelon, alij cit
tampelon, alij ciſſamethon, alij anatetamenon, Ro
mani volutum laparon, Aegyptij apap, alij par
thenion, alij ſideritin, alij heracleam, nonnulli agriā,
quidam elibodion, alij polyonymon.

NOTHA.

347.9. Alij myortochon dicunt, alij myorto-
splenon: Romani muris auriculam, Panni labatho-
labat.

347.20. Agriam phacon aliqui, alij epipteron,
Romani viperalem, alij iceosmiridonon vocant.

347.27. AiZoon maius, aliqui aithales, alij am-
brosion, alij chryssipermion, alij Zoophthalmon, alij
bubophthalmon, alij stergethron, alij æonion, alij
aichryson, alij holochryson, nonnulli chrysanthem-
mon, alij protogonon, alij boron, alij notion: magi
paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam cu-
spiam, aut Iouis caulem nomināt, alij leapedes, alij
sedum maius. Aegyptij pamphanes.

348.17. AiZoon paruum, alij petrophyes appel-
lant, alij brotion, alij theobroton, crobysson, alij chi-
merinen, alij ceraunian, Romani vitalem, alij sem-
peruium, Aegyptij etyceltam.

348.24. Semperuium quod tenui cōstat folio,
aliqui aizoon paruum, alij petrophyes, alij aizoon
syluestre, Romani semperuium minus appellant.

349.2. Aliquibus cymbalion, alij scytalion, alijs
hortus Veneris, alijs terræ umbilicus, alijs stæchis,
alijs stergethrō, Latinis umbilicus Veneris dicitur.

349.19. Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen,
Latini vrticam, Aegyptij selepsion, Dacidyen appel-
lant. Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen, Ro-
mani vrticam mollem vocant.

350.12. Alijs galeobdolon, vel galephos, Aegy-
ptijs

DIOSCORIDIS

ptiys etopi, Latinis *vrlica* labeo dicitur.

350.23. Alijs *galation*, aut *gallerion*.

351.4. *Erigeron* à Latinis *herbulum*, aut *senecio* vocatur, aliàs *erechthites*.

351.25. *Marinum bryon*, aliqui *ballarin*, alijs *iranen*, Latini *gnomeusilon* vocant.

352.14. Aliàs *stachyites*, apud Aegyptios *ethen- chis*, Latine *fatalis* dicitur.

352.20. Aliquibus *fluuiatilis stratiotes* nuncu- patur, Aegyptijs *tibus*, magis *eluri sanguis*.

353.11. *Phlomon*, alijs *phlonon*, Latini *verba- scum*, alijs *pheminalem* vocant.

355.8. *Arcion* alijs *profopida*, alijs *profopion*, alijs *aparinen*, Latinis *personatā*, aut *lappā* appellant.

355.24. Alijs *borion* appellatur.

355.28. *Capnon*, aliqui *corydalion*, aut *corion* vocant, alijs *syluestre corydalion*, alijs *capnon* in hor- deis, alijs *capniten*, alijs *marmariten*, alijs *capnogor- gion*, alijs *chelidonion micron*, alijs *peristerion*, alijs *cantharida*, alijs *chaleocri*, Romani *apium* aut *fu- mariam*, Aegyptijs *cnyx*, alijs *tucin*.

356.7. Alijs *tripedion*, alijs *tribolion*.

356.12. Aliqui *libyon*, alijs *triphyllon*.

356.22. Aliqui *telinen*, alijs *lotum magnum*, alijs *triphyllon*, Romani *trifolium maus* appellant.

357.18. Alijs *melophyllon*, alijs *stratioticen*, alijs *achillion*, Latini *millesolium* vocant, aliqui *super- cibum veneris*, Galli *beliocandas*.

NOTHA.

358.27. Alij myrrham, alij conilen vocant.

358.23. Aliqui buglossum magnum vocant, Romanam spinam mollem.

359.6. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyophtalmon, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

359.19. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non viderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas rhizotomus hæc de ea refert: Si viridis cum axungia utere tundatur, contra rabiosorum morsus, turgentia guttura, proderit. suffium quoque serpentes fugat.

359.27. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut mirariam, aut violam purpuream vocant.

360.5. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

360.16. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron vocant, magi paracacry, Aegyptij erxoën, Rom. scopā regiam, Aphri Zigar, nonnulli thepso.

361.2. Alio nomine chameleuce, alio cissos acarpos, aut terra corona, aut selinitis, Latine bedera pluuiatica dicitur.

361.17. Magi eluri gonon, Osthanes taurich, Aegyptij antuenrinbesor, Romani linguam bubulam, alij libanium, Peræni asanaph vocant.

362.

DIOSCORIDIS

362.2. Alij phyton, alij caballation, alij splineio,
alij scolymon, Romani linguam canis, aut caninā
appellant.

362.14. Aliqui Zoonychon vocant, alij ætony-
chon, alij cemos, alij damnamenē, alij idiophyton,
nonnulli phytobasiliam, aliqui crossion, alij crosso-
phithoon, magi sanguinem crocodili, alij crocome-
rion, Aegyptij daphnænen, Romani minercium,
alij palladium, alij neumatium, alij flammulam.

362.23. Aliqui & id antirrhinō, alijs anarrhi-
non, nonnulli lychnida agriam vocant.

362.29. Nonnulli lychnida agriam appellant.

363.8. Catanante aliquibus damnamete, alijs
dionysias, alijs thyrsio, alijs demos, alijs cemos, alijs
crotion, magis archaras, alijs arcopus, Romanis
herba filicula, alijs datisca, Dacis caropitha dici-
tur.

363.21. Aliqui psychen, alij merida, alij pota-
mogitona, alij stachyten, Romani caliummarem
nominant.

364.11. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Ae-
gyptij epier, Romani cinnamulem, alij terræ capil-
lum, alij supercilium terræ, Daci philophithela
vocant.

365.4. Aliqui pterion, alij opteron, Romani ca-
pillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli &
eam adianton appellant.

NOTHA.

365.11. aliqui phasganon, alij antithesion, alij
hascanō, alij choeradolethron, alij & hanc aparī-
am nominant, Latini lappam.

365.24. aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs
romos, Romanis auena dicitur.

365.29. aliqui siphonion, alij atrospelon vocāt.

366.28. alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs
cynosbatō, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs ana-
tolicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe,
Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

367.23. alijs hieromyrton, alijs myacātha, alijs
agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos,
alijs anāgelos, alijs acaron, alijs ocnerō, alijs cinen,
alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæmyrte,
Bæotis gyrenia, magis Herculis genitura appellat.

368.10. aliqui idean, alij danaën, alij hippoglot-
ton, alij Zalam, alij stephanen, alij daphnon, alij
samoithracicen, alij methrion, alij hypoglossion
vocant.

368.19. Daphnoides alipo simile, flos vt nym-
phæa, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in
quo semcn: aliqui chamædaphnen, alij peplion, alij
eupetalon vocant.

369.2. aliqui & hanc alexandrinam appella-
runt, alij daphniten, alij hydragogon, Romanis lau-
reolam, alij laclaginem, Galli vsu bim.

369.11. aliqui ascida vocāt, alij atomon, alij pi-
gatoxarin, magi sanguinem Herculis, alij poly-

D I O S C O R I D I S

dos, alij anaphyston, Aegyptij somphia, alij vnr
Galli laginum, aliqui anepsa.

370.22. aliqui melampodion vocant, alij ecsta
mon, alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorrh
zon, alij cyiranion, magi Zomarition, Aegyptij
iscam, alij elaphine, alij cemeleg, Latini veratrum
nigrum, alij saraca, Daci prodiorna.

372.10. aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lyco
cytalion, alij helleborum album appellant.

372.17. aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

372.27. aliqui elaterion vocat, alij grynon, alij
baln, alij syncrisin, alij hubalion, alij scopion, alij
pherombron, alij peucedanon, alij notion, Romani
ancetum, alij agrestem, Pæni cufimezar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucume
ris trita radix, & drachmae vnius pondere pota in
hydromelite, vomitus ciet. Si quis facile secundū co
nam vomere velit, binis obolis sit contentus.

375.16. alij triphyllon, alij stefion, alij astaphi
da, alij phthiroctonō, alij phthiriō, alij apanthropō,
alij polyides, alij pseudopathes, alij arsenoten, Aegy
ptij ibesæden, Romani herbam pediculariā vocat.

376.4. aliqui hypopyon vocat, alij paucranon,
alij scammonion, alij thelyterim, Romani ferula
ginem, alij ferulam syluestrem, Pæni bæden.

378.17. aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.26. aliqui narcisso anydro, alij autogenes,
alij bullon emeticon, alij lirion, Romani bulhum
morbit

morbitarium dicunt.

380.16. alij hippophyes, alij hippophanes, alij hippion, alij echinion, alij pelecion, Romanilap-
pagem vocant.

381.17. aliqui sesamō sylvestre vocāt, alij fesci
cypriō, alij crotona, Aegyptij systhanna, aliqui tri-
xin, magi sanguine febris, Latini ricinū, alij lupā.

382.5. aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. aliqui clema, alij crambion, alij para-
lion, alij canopicon vocant.

386.13. aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. alij spumosum papauer vocitan.

387.20. aliquibus scamonia radix, alijs colo-
phonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, ma-
gis appolewmonos, Aegyptijs sanilum dicitur.

389.5. alij chamaelea nigra, alij pyros achmen,
alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion,
Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam
olea stellum vocant.

389.16. alij chamaeam, alij pyros achmen, alij
cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dendron arctu, alij heme-
ron, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci sebam
vocant.

390.23. alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Eu-
boica, Gallis ducone, Dacis olma.

392. 2. nonnulli ischiada, alij cham. chalamum
agriam, alij linozostin, Latini radicē sylvestrem,

D I O S C O R I D I S

Pæni thorphathsadæ appellant.

392.16. aliquibus colocyntha ægos, alijs sicyapi-
era, alijs alexandrina colocyntha, 7oroastri thym-
bra, Qsthani autogenes, Romanis cucurbita sylua-
tica, Dacis tutrastra dicitur.

393.8. alijs cedæ, Romani inuolucrum vocant.

394.15. alijs ophioſtaphylo:, alijs chelidonium,
aut melothrō, aut pſilothron, aut archexōſtin, aut
agroſtin, aut cedroſtin appellant.

395.22. alijs chironion ampelon, alijs bucranion
Romani oblameniam, alijs batanutam, alijs betisal-
cam, Daci priadelā, alijs pegrinā, Aphri lauothē.

396.8. Pterin, alijs pterio, alijs pterincō, alijs daſy-
clonon, alijs anaſphoron, alijs blechnō, alijs polyrrhi-
zon vocāt, magi hermulain. Romani ſilicem, alijs
laculā, alijs ſiliſfanariā, Aegyptij aſini ſanguinem.

395.23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin
nominant, Romani linguam ceruinam.

397.9. Polypodion aliqui ſcolopendrion, alijs pte-
rin, alijs polyrrhizon, Latini ſiliculam vocant.

398.2. aliqui pterion, alijs nymphæam pterin no-
minant.

398.21. alijs argyron, alijs aritrilin, alijs chryſi-
tin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem ma-
ſculam, alijs teſſeculatam, Aphri aſumes.

399.6. aliquibus linoxōſtis, Aphris armas, alijs
aſumes labon dicitur.

399.14. aliqui ſcorpiuron vocāt, alijs heliotro-
pon,

N O T H A.

on, alij dialion, alij heliopon, alij scorpioctonō, alij
samon agrion, alij scorpion vram.

400.4. alij scorpionem vocant.

405.3. Idē adstringit: prodest stomacho qui ci-
lis tenax non est, aut, tardius cibum cōcoquit. Item
ijs qui ilei dolore conflantur: cōuenit in gruida-
rum malacia: sorptum auxiliari constat, cum po-
pulatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi om-
phacium non nisi post annos multos bibi potest.

429.17. quam alij Medicinam, alij symphyton,
alij idæum phlomon, alij orektion, alij nectarion
vocant.

448.6. alij larbason, alij gynæcion, alij Chal-
cedonion.

458.20. alij pecton, hephton, aracton, lonchotō.

505.7. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum
ferat, contra venena & improbos homines prode-
rit: pecoribus inuandis appenditur: nauigijs circum-
poni solet: valet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter fa-
cit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, be-
stias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-
luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, &
locum totum obliuio, cum somno indulgendum est:
strangulatus vulua mirum in modum auxiliatur:

DIOSCORIDIS

urina stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylis si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tōsillarum tumores, viam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, pforam perniciali fame cōtraclam iuuat: remoratos à partu menses eicit: infusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cum luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensi doloribus oculorum auxiliatur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem rescit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnium siccatum manibus terito, & redigens in farinā adiecta vini stilla, corpus tāgito: siquidē contra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas prapurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, vt presenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinā illinito. Herbam vere, magnis aestibus, autumnoq; eruito.

De Salvia,

Sal

N O T H A.

Salvia singultum tuſimq; diſcutit: omnibus malis vlceribus cum cera & roſaceo ſumpta auxilia-
tur: lienis dolorem dyſenteriamq; , pota cum vino albo pari modo ſanat: ſanguinem excreantibus, po-
tu medetur: ad extrahenda vuluæ onera efficax
eſt: peſſimæ mulieres peſſum: ex ea ſubiiciunt, vt par-
tus excutiant.

De Cupreſſo.

Cupreſſus herba contra raucedines auriculasq;
prodeſt: induratos tonſillarum tumores, aquam in-
ter cutem, & coxendicum cruciatus perſanat.

De Centaurio.

Centaurium contra inflammata vilia & pul-
ſantes iclus valet: feminis vuluæ malo laboranti-
bus auxiliatur: ſtillicidiÿ vrinæ, calculorumq; tor-
menta leuat. Herbam vere oriente ſole legito.

De Buphthalgo.

Buphthalmum creſcente luna legere oportet. Fa-
cit autem contra pauores, laruas, & mala medica-
menta, ſciſinationes. vtpote cum eas auertat. Radi-
cem ſi quis mādāt, denicem expuet, fluxionemq; con-
feſtim ſiſtens auxiliatur: qui & ventrem reſoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æſtus Caniculæ ante Solis
ortum vellitur: appenſaque contra venena, faſci-
num, pauores & laruas prodeſt: item contra fe-
brem cum horrore venientē, diurnam nocturnam-
ue, & aduerſus tertianā. Proclitur lemures à mō-

D I O S C. N O T H A.

te, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorum
& fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes:
vegetiores reddit pueros, imo ventri appensa & ad
arcendos pavores nocturnos manu teneto. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum erua-
tur, & collo appedatur, veneficas mulieres, omnef-
que fascinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventris
dolorem hibitur: si quis grana septem domum inie-
cerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion di-
citur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans.
Bibitur contra omne venenum, & iecinoris vitia.

F I N I S.

CURATIONVM
MORBORVM IN
DIOSCORIDE
contentarum
index.

Abscessuum re-
media,

M ^{BI}
Cucurbitæ

Thlaspi

Mentha

Viscum

Bechion, siue tussilago

Pentaphyllon

Buglosson.

Abortum fas-
cientia,

Asparagus

Arisaron

Ampeloleuce

Hedysaron

Populus alba

Oxyacanthos

Coagulum

Brassica sativa

Cyclaminos

Dracunculus duplex

Onosma

Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue
abortivum

Vinum helleborites

Conyza.

Abortus re-
media,

Sabina

Galbanum

Aconito con-
traria,

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamaepitys

Vinum in communi

Scoria, siue recremen-
tum ferri.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

Aculeos extra-
hencia.

Vide, spicula corpori
infixa extrahencia.

OO 5

I N D E X

- | | |
|--|---|
| <p>Aculeatorum
ictus remedia.</p> <p>Laurus
Malua
Symbrium
Anisum
Althæa
Oxalme
Vinum thymite
Adipm medelæ
Diosc. lib. 2. cap. 68</p> <p>Adurentes me-
dicinæ.</p> <p>Buprestis
Cantharides
Pityocampæ
Salamandra.</p> <p>Adustionum
remedia.</p> <p>Vide, ambustorum re-
media.</p> <p>Aegilopiæ re-
media.</p> <p>Afarum
Myrtus
Iuglans
Oriza
Malua
Plantago
Myosota, vel myoso-
tis altera
Baccharis
Anthemis</p> | <p>Strychmon sativum siue
Solanum hortense
Aegilops
Vua ænanthe
Alica.</p> <p>Alarum virus
extinguentia.</p> <p>Myrrha
Myrtus
Scolymos, siue Car-
duus.
Alamen.</p> <p>Algoris reme-
dia.</p> <p>Laurinum oleum
Ocimum vnguētum
Cinamomum
Aristolochia tertia
Abrotonum
Vinum scilliticum
Oleomel, vel elgomeli.</p> <p>Allij acrimo-
niâ extinguentia,</p> <p>Ruta.</p> <p>Alopeciæ morbi
remedia.</p> <p>Harundo
Iuglans
Auellane
Erinaceus terrestris
Hippocampus
Ranæ
Locustæ</p> |
|--|---|

C V R A T I V V S.

Adeps	Asarum
Fimum	Crocus
Rhaphanus	Crocomagma
Beta	Cepe
Milium	Oleum amygdalinum
Sinapi	Oleum cicinum
Cyclaminus	Oleum balaninum
Asphodelus	Oleum cnidium
Batrachion	Olea Aethiopica
Myosotis	Fagus
Nymphæa	Galla
Cynoglosson	Faba Thebaica
Adianton	Siliquæ
Thapsia	Mespilus
Aerugo ferri	Corutis
Sandaracha	Ficus Aegyptia
Halcyonium	Caprificus
Cotes	Cerasia
Cinis vngularum ca/ prinarum	Melimela
Aluū cōturbātia.	Citrea mala
Eruum	Pruna
Orobis	Amygdalæ amaræ
Brassica sativa	Morus
Allium	Ficus
Capparis	Tellinæ
Peplus	Chamæ
Vuæ recentes	Iuncus odoratus
Vinum dulce	Cochleæ terrestres
Aqua maris	Sepiæ
Flos salis.	Silurus
Aluum soluentia	Pisces saxatiles
atq; purgantia.	Lac
	Lac schistum
	Butyrum
	Medulla

INDEX.

Fel	Cestron
Finum	Scordion
Tragus	Chamapitys
Linum	Androsæmon
Lens	Papauer ceratitis
Phaselus	Vrtica
Rhaphanus	Cynoglosson
Lapathum	Spartum
Nasturtium	Balanus myreplica, fl.
Bruum	ue glans vnguentaria
Bruca	Hippophaës
Scandix	Characias
Lactuca	Linozostis
Cucumis	Lathyris
Cucurbita	Quercus
Atriplex	Chamæsyce
Brassica sativa	Cici
Brassica marina	Scâmonium
Malua	Ampeloleuce
Blitum	Thelypteris
Asparagos	Passum
Porrum	Mellicratum
Cepe	Vinum albanum
Struthion	Vinum lesbium
Zinziber	Coccimela
Cyclaminos	Vinum melitite
Scilla	Thalassomeli
Bulbus esculentus	Vinum absinthite
Agaricum	Vinum helleborite
Aloë	Vinum scammonite
Absinthium seriphium	Rubrica sinopis.
Hyssopum	Aluū sistentia.
Ammoniacum.	Aspalathus
Phyllitis	Mastichinum

C V R A T I V V S.

Laurinum	Seris
Populus nigra	Bromos
Populus pieca	Chondryllæ
Paliurus	Oriza
Oxyacantha	Alica
Cynosbatos	Milium
Cistos	Faba
Rosa	Lens
Acacia	Anethum
Palma	Apium
Palma elate	Aphace
Malum punicum	Smyrnion
Malus	Hippomarathrum
Siliquæ	Acantha
Cotonæ	Aloë
Mala epirotica	Hæma
Pira	Ruta
Mespillus	Anisum
Lotus	Orchis serapias
Cornus	Pæonia
Sorbus	Althæa
Prunæ syriaca	Polygonon mas
Lepus terrestris	Lagopus
Lac	Clematis daphnoides
Caseus	Xyris
Fuligo butyri	Anchusa
Sanguis	Gramen Parnasium
Fimum	Rubus
Lyncurion	Pentaphyllon
Triticum	Phoenix herba
Brassica sativa	Idæa radix
Hordeum	Oxychoentis
Plantago	Rubrica sinopis
Crinon	Aizoon

I N D E X

Papauer fatium

Adianton

Phlomidēs

Viræ

Vinum phalernum

Vinum œnantie

Vinum passum

Vinum rhoite

Vinum myrtite

Vinum cedri

Vinum lauri.

Aluinis vtilia.

Coagulum

Nymphæa

Clymenon

Papauer fatium

Omphacomeli.

Amatorijs ve- nificijs attributat.

Cyclaminos

Catanance.

Dorycnion

Cotyledon

Mandragoras

Leontopodion

Phyteuma.

Ambustorum

remedia.

Acacia

Asphodelos

Aristolochia

Althæa

Ascyron

Aizoon maiua

Arction

Alumen

Atramentū scriptoriū

Buccinum

Beta

Cypres

Cistos

Coriū vstū, siue veterū
calceamentorum

Cynoglossum

Cinnabaris

Ebulus

Fimum

Philomus, siue verba-
scum

Gallion

Hedera

Hypericon

Helxine

Lactuca sylvestris

Lilium

Myrtus

Morus

Malua

Narcissus

Oliuæ colymbades

Ouum

Picea

Platanus

Plantago

Sesamum

Stimmi

Sal

Thus

C V R A T I V V S.

Vnguentum felinum
Amphisbænæ
morsus curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 64.

Anginæ reme-
dia.

Acetum

Absinthium

Cyprinum vnguentum

Cedria

Cepe

Crocodilium

Elaterium

Fel animalium

Fimum

Hirundo

Hysopus

Irinum

Laserpitium

Mel

Oxymel

Spartum siue genista

Sal

Violæ

Piper

Pix

Rhaphanus.

Anhelitus dif-
ficultatis re-
media.

Afarum

Balsamum

Naphtha

Centaurium maius

Baccharis

Peucedanum

Galbannm

Parthenion

Adianton

Ampeloleuce

Et infra in verbo, Or-
thopnoicis.

Animalium fes-
ritas mitigatur.

Oenagra.

Ani remedia.

Vide, Sedis remedia.

Animalia ven-
tris expellen-
tia.

Vide, Tineas latas pel-
lentia.

Animalia quæ
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præ-
fationis fine.

Animaliū ictus
remedia.

Bdellium

Panaces heracleon

Terra lemmia

Diosc. lib. 6. cap. 55.

Animi defectus
remedia.

Cucumis

I N D E X

Pulegium

Coris

Animi volupta

tes auget,

Buglosson.

Animi deliquia

generantia.

Diosc. lib. 6. in prefat.

Anodyna.

Hyoscyamus

Aconitū pardaliāches.

Antidotum in-

gredientia.

Acorus

Phu

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cyphi

Scincus, siue singus

Sanguis

Rapæ fatiuræ

Napum, siue bunias

Brassica fatiua

Piper

Abrotonum

Stichas

Ruta

Caros

Anethum

Petroselinon

Hedysaron

Mandragoras

Rubrica, siue terra le/
mnia.

Apium ictus

remedia.

Laurus

Malua

Sisymbrium

Althæa

Diosc. lib. cap. 57.

Apostematum

remedia.

Vide, Suppurationum

remedia.

Appetitum ge-

nerantia.

Cerasia.

Appetitum in-

citantia.

Vinum in communi

Vinum Selenite.

Aquæ inter cutē

remedia.

Vide, Hydropicorum

Araneis con-

traria.

Morus

Grossi

Melanthion.

Aranei ictus

remedia.

Mullus

C V R A T I V V S.

Mullus piscis

Allium

Melissophyllon

Coris

Oxychoenus

Hyacinthus

Aizoon maius.

Argenti viui

curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 18.

Argematō morbi

remedia.

Fel animalium

Vrina

Lactuca sylvestris

Cera

Argemone

Anagallis

Ocimum

Papauer seratitis

Lotus sativa.

Aquatorum

remedia.

Onos, siue millepeda

Asparagus

Cyclaminos

Spondylion

Oenanthe

Buphthalmos

Chrysanthemon

Vinum absinthite.

Arsenici, siue au-

ripigmenti curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 19.

Articulorum

morbis vtilia.

Amurca.

Anethinum

Agaricum

Arction

Bulbus esculentus

Centaurium minus

Cinis vitium

Helleborus niger

Scammonium

Mandragoras

Meon

Naphtha

Nardus

Narcissus

Ouum

Oxymel

Palma elate

Pentaphyllon

Psyllium

Ruta

Thapsia

Thymoxalme

Vua passa

Vinum melitite.

Arterię remedia.

Irinum

Myrrha

Thus

Caryotæ, siue caryo-

tides.

P p

INDEX

Ficus	Lentiscus
Sinapi	Terebinthus
Prason, id est porrum	Fuligo picis
Glycyrrhiza	Cypressus
Triticum	Iuniperus
Rhaphanus	Vlmus.
Laserpitium	Palmarum
Pentaphyllon	Cyprus
Vua passa	Lilia
Rhodomeli	Cistos
Tragacantha.	Hypocistis
Aspidum mor-	Cidonia
sus remedia.	Rosa
Cimices lecti	Acacia
Butyron	Salix
Clematis	Vitex
Daphnoides	Olea sylvestris
Aqua maris	Quercus
Diosc. lib. 6. cap. 70.	Castanea
Astrictoriae me-	Galla
dicinae.	Thus
Aspalathus	Palma
Bryon	Palma elate
Crocus	Malicorium
Oleum omphacinum	Myrtus
Oleum ex oleastro	Myrtidanum
Myrrha	Malus
Vnguentum melinum	Cotonea
Vnguentum oenanthi-	Perfica
num	Pira
Cortex thuris	Pira sylvestria
Picea ac pinus	Mespilus
Pityides	Mespilus alia
	Cornus

C V R A T I V V S.

Morus	Vitis syluestris
Lixiuia ex ficu	Nuclei acinorum
Ionia sine Cionia	Vua œnanthe
Adeps	Omphacium
Adipum medicinæ	Passum
Faba Aegyptia	Vinum omphacites
Lens	Vinum nigrum è la-
Portulaca	brusca
Seris	Vinnm cydonites
Porrum	Omphacomeli
Hedera	Vinum apijtes
Miosotis	Vinum myrtites
Agaricum	Vinum palmeum
Rhaponticum	Vinum è cedro
Gentiana	Vinum pilsite
Abfinthium	Vinum abfinthite
Abfinthium seriphium	Vinum tragoriganite
Mentha	Vinum prasite
Melilotus	Vinum calaminthe
Maron	Vinnm aromatite
Ruta	Spuma argenti
Cyminum satium	Chysocolla
Hieracium maius	Cinnabaris
Conyze tertiū genus	Calcanthon
Lyfimachium	Diphryges
Clymenos	Arsenicum
Anchusa	Sal
Idaa radix	Fex vini
Granum tinctorum	Spongiæ
Chrysocome	Lapis phrygius
Aizoon maius	Apis Asius
Phlomides	Lapis scissilis
Lotus syluestris	Terra eretria
Ebulus	Lapis samius

Pp 2

INDEX

Fuligo pictoria.	Cornix
Assulas fixas	Cucurbita.
corporibus extra-	Cepe
hentes,	Cappariz
Cochlex terrestres	Cucumis anguinus.
Attonitis vtilia.	Daphnides
Ampeloleuce.	Dracunculus maior
Auruginem tol-	Ficus
lentia.	Fel animalium
Lycium	Faba Aegyptia.
Agaricum	Flos æris
Libanotis coronaria.	Flos salis.
Auricularum	Hedera
remedia.	Helxine
Bulbus esculentus.	Irinum vnguentum.
Auriū medicine.	Hyssopus
Cannabis sativa	Laurinum
Araneus	Lycium
Adipum medicine	Lapation
Asphodelus	Malum punicum.
Abſinthium	Myrtus
Anisum	Mel
Aparine	Myosotis
Aqua maris.	Mentha
Acetum	Melilotus
Acetum ſcilliticum	Myrrha.
Alumen	Oleum amygdalinum.
Aphronitrum	Oleum balaninum
Blattæ	Oleum hyoſcyaminū.
Beta	Olea ſylueſtris.
Crocus	Onos
Ciſſos	Origanum
	Omphacium.
	Pix.

C V R A T I V V S.

Populus alba
 Plantago
 Porrum
 Peucedanus
 Prasion
 Polygonon mas
 Papauer satium
 Psyllium
 Rhus obsoniorum
 Rosa
 Salix
 Senecta serpentis
 Sefamum
 Sinapi
 Spondylium
 Stoebe
 Strychnum satium
 Sulphur
 Thus cum pice
 Terebinthina
 Vermes
 Vrina
 Vinum myrteum, siue
 myrsinite
 Vinum cedrites.

BDELLARVM,
 siue hirudinum
 curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 32.
 Bestias fugantia.
 A cantha leuce, siue spi
 na alba.

Bestiarum ve
 nenatarū remedia.
 Balsamum
 Bestiarum mor
 tus remedia.
 Helenium Aegyptium
 Sanguis
 Porrum
 Allium
 Argemone
 Eryngium
 Pulegium
 Apium
 Vinum cedrite
 Sal
 Terra Samia.

Bilem adgene
 rantia.
 Iuglans.
 Bilem purgātia.
 Agrioraphanus
 Androsæmos
 Anchusa
 Apios
 Brassica canina
 Calamintha
 Clematis
 Cici
 Cucumis anguinus
 Characias
 Chamælea
 Helleborum nigrum

I N D E X

E laterium	Vide, gutturis reme- dia.
E bulus	B uprestis veneni remedia.
E pithymum	Lac schiston.
E mpetron	Dioscorides libro 6. cap. 23.
H elenium	C ACHEXIAB, id est maciei re- media.
H ippophaës	Aqua maris.
H eliotropium	C acoetæ reme- dia.
I ris illyrica	Vnguentum rosaceum
L ychnis sylvestris	C rocinum
L athyrus	T hus
L inozostis	G landes
M alus	F icus
M elanthion	C icer
M entha	P lantago
M andragoras	D racunculus maior
O cimum	D racunculus minor
P arthenion	H edera
P eplos	V iscum
S cammonia	A sclepias
T hlaspi	P syllium
T hapsia	V rtica
T hymelæa	P etalites
V itis sativa	C admia
V nguentum susinum id est, lilij.	D iphryges
B lattas in se con- trahentia.	F los salis.
P hlomides.	C alcis curatio, Diosc. 6, cap. 29.
B oum scabiem emendantia.	
C edria	
B ronchocelas discutientia.	

C V R A T I V V S.

Calculi reme- dia.

Cyperus
Cardamomum
Oleum amygdalinum
Cerasia
Amygdalus amara
Olsifragus
Vrina
Sium
Struthion
Centaurium maius
Bdellium
Daphnides
Paliurus
Pruna
Fimum
Lapathon
Sisymbrium
Ononis
Cuminum sylvestre
Artemisia
Hippomarathon
Asplenon
vntchemis
Parthenion
Pæonia
Lithosperma
Athæa
Tribulum
Saxifragum
Gramen
Traion

Acanthus
Cotyledon prima
Vitis sativa
Myrtus sylvestris
Oxalme
Lapsi iudaicus
Ochra
Lapides spongiarum.

Calefactoriæ medicinæ.

Adipum medicinæ
Medullæ animalium
Fel
Cera
Propolis
Triticum
Raphanus
Raphanus agria
Sisymbrium
Sisymbrium aquaticum
Sinapi
Nasturtium
Thlaspi
Erysimon
Piper
Zingiber
Dracunculus maior
Dracunculus minor
Asphodelus
Aulbus esculentus
Agaricum
Gentiana
Anonis, siue Ononis.

INDEX

Eryngion	Myrrha Boeotica
Absinthium	Styrax
Absinthium seriphiū	Bdellium
Hyssopum	Thus
Origanum	Terebinthus
Tragoriganum	Resina
Pulegium	Palimpissa
Mentha	Iuniperus
Serpyllum	Sabina Cedria
Sampsuchum	Cedrides
Maron	Laurus
Aspalathus	Daphnides
Crocomagma	Cyprus
Helenium	Cistos alia
Oleum vulgare	Vitex
Oleum sicyonium	Amygdalæ amaræ
Strigmēta gymnastorū & palæstrarum	Ficus
Elæomeli	Lixiua ex ficu
Laurinum	Cisseris
Sampsuchinum	Cochleæ terrestres
Ocimum	Fiber
Anethinum	Buprestis pityocampa
Susinum	Salamandra
Cyprinum, siue ligustrinum	Oesypus
Irinum	Panaces heraclion, siue Herculeum
Gleucinum	Ligusticum
Amaracinum	Seseli Malsiliense
Metopium	Sison
Stasie	Anisum
Nardinum	Caros
Malabathrinum	Anethum
Myrrha	Cyminum satium
	Ainmi

C V R A T I V V S.

Oreoselinum
 Smyrnion
 Hippomarathrum
 Daucus.
 Libanotis.
 Lasepítium
 Galbanum
 Ammoniacum
 Stachys
 Scordion
 Artemisia
 Anthemis
 Chrysocome
 Portulaca agrestis
 Lotus sylvestris
 Vinum picatum
 Vinum in comuni
 Aqua maris
 Vinum è cedreo, arbo-
 ribusq; alijs
 Vinum è cypresso
 Vinum cedrite
 Vinum chamædryite
 Aerugo aurificum
 Chrysocolle
 Calcanthon
 Alumen
 Sulphur
 Flos salis
 Pyrites
 Lapis hæmatites.

Calefactorum
 remedia.

Lana succida.
Caliginis oculi
 lorum remedia.
 Fel animalium
 Lactuca sylvestris
 Ocimum Cepe
 Dracunculus maior
 Sinapi
 Nasturtium
 Erysimon Piper
 Zinziber
 Dracunculus minor
 Anagallis
 Chelidonium maius
 Sagapenon
 Chamædrys
 Chamæsyce
 Flos æris
 Pumex
 Fax vini
 Lapis thyites.

Callorum
 remedia.

Triticum
 Lasepítium
 Chalcitis lapis.
Cancrescentis
 bus vlceribus
 medetur.

Vrtica.

Canes occi-
 dentia.

Pp 3

I N D E X

Asparagus	Canis non rabidi
Apocynon.	morsus remedia.
Canis rabiem	Amygdalæ amaræ
fanat.	Iuglans
Alyssum.	Ficus
Canis rabiosi	Mituli
morsus remedia.	Gobius
Lycium	Cucumis
Caucri	Bulbus esculentus
Cinis vitium	Mentha
Garum	Ebulus.
Omotorichos	Canis impetum
Smaris	cohibentia.
Iecur ardens canis	Iecur & dens canis.
Triticum	Canis necantia.
Sanguis	Chamaeleon albus.
Mel	Canum scabiem
Grosi	emendantia.
Panaces heracleon	Oleum lentiscinum
Cepe	Cedria.
Laserpitium	Cantharides
Vrina	fugantia.
Aster atticus	Vnguentum melinum.
Melilophyllon	Cantharidum
Vrtica	veneni remedia.
Cynoglosson	Lac schiston
Foeniculum	Adipum medicinae
Ballote	Diosc. lib. 6. cap. 1.
Oxalme	Capillorū deflu-
Aphronitrum, siue spu-	uium reprimentia.
ma nitri.	
Diosc. lib. 6. cap. 37.	
Herm. Corol. cap. 212	

C V R A T I V V S.

Oleum ex oleastro

Myrrha

Cistos alia, siue ladanū

Myrtus

Brassica satiuā

Nasturtium

Aloë

Adiantum.

Capillum deni-
grantia.

Cupressus

Fagus

Ilex

Palma elate

Myrtus

Hedera

Elelisphacos

Rubus

Vinum myrtite.

Capillum ruf-
fautia.

Cyprus

Lycium

Lotus

Fæx vini.

Capillū flauū
reddentia.

Aqua maris.

Capillum pur-
gantia.

Fœnumgræcum

Linum.

Capillos tin-
gentia.

Acacia

Myrtus

Morus

Stratiotes terrestris

Ebulus

Terra ampelites.

Capillos nus-
trientia.

Iuglans.

Capitis vlcerū
remedia.

Balsamum

Oleum ex oleastro

Oleum amygdalinum

Vnguentum rosaceum

Telinum

Narcissinum

Myrrha

Thus

Vrina

Fœnogræcum

Cicer

Linum

Malua

Allium

Cyclaminos

Bulbus esculentus

Melilotus

Lilium

Bettonica, siue Britan-
nica.

INDEX

Xyris
 Rubus
 Rubus Idæus
 Oxalme
 Vinum myrsinite
 Sal.

Capitis doloris remedia.

Iris Illyrica
 Asarum
 Meon, siue meu
 Oleum oleastri
 Oleum amygdalinum
 Vnguentum rosaceum
 Narcissinum
 Cyprus
 Rosæ
 Vitex
 Amygdalæ amaræ
 Torpedo
 Lac humanum
 Lana succida
 Curmi
 Silymbrium
 Sefamum
 Hedera
 Portulaca
 Aloë
 Mentha
 Serpyllum
 Baccharis
 Ruta
 Anisum

Spondylion
 Peucedanum
 Melanthion
 Coniza maior
 Anagyris
 Bettonica
 Radix hederæ
 Oxychoenos
 Psyllium
 Papauer rhoza, siue er-
 raticum
 Strychnon, siue solanū
 satium
 Aizoon maius
 Hippoglosson
 Chamædaphne
 Myrtus sylvestris
 Elaterium
 Scammonium
 Vitis sativa
 Vinum
 Vua oenanthe
 Aqua maris
 Acetum scillite
 Lapis ophites.

Capitis dolorem facientia.

Styrax
 Oliuæ
 Glandes
 Palma
 Arbutus
 Iuglans

C V R A T I V V S.

Erinum	Lasertpitium
Abfynthium	Olea fylueftris
Ferula	Pix
Meu fiue meon	Plantago
Peucedanus	Panaces heracleon
Mandragora	Sabina
Vinum gypfatum	Vua paffa.
Vinum phoenicite	Cardiacorum
Vinum rhetini te	remedia.
Vinum mefagite.	Bupreffis.
Caput purgan-	Seris.
tia.	Rubus.
Anemone	Carnem tene-
Bralfica fatiua	riorē reddentia.
Beta	Vrtica fiue acalyphe.
Cepe	Carnem coale-
Chelidonium minus	fcere facien-
Calcanthum	tia.
Cyclaminos	Lixiuia ficus
Origanum.	Symphyton.
Carbunculorum	Carnes fuper
medicinæ.	uacuas compe-
Bralfica fatiua	fcencia.
Cupreffus	Characias
Cinnamomum	Cadmia
Cyprus	Aes vftum
Coriandrum	Flos æris
Characias	Lasertpitium
Bruum	Lana vfta
Finum	Lapis Afius
Iuglans	Spuma argenti
Lupinum fatium	Smaris.
Nafturtium	

I N D E X

Carcinomatū	Sal
remedia,	Dioscor. lib. 6. cap. 55.
Fuligo thuris	& 69.
Buprestis	Cerussæ curatio.
Cicer	Diosc. lib. 6. cap. 22.
Brysimon	Cerionum vlce-
Dracunculus maior	rum remedia,
Dracunculus minor	Grossi
Aristolochia tertia	Pepo
Vrtica	Quere, Fauos rumpen-
Galiopsis.	tia,
Caseus ne cariē	Ceruicis rigoris
sentiāt,	medicinæ.
Dracunculus minor.	Vide, Opisthotonico-
Caua implentia.	rum remedia,
Cadma	Chironiorū vl-
Promphilyx	cerum reme-
Cerussa	dia,
Lapis schistos	Plantago
Lapis morochthus	Ampelocoece.
Terra samia	Cholericis vti-
Fuligo thuris	lia,
Aristolochia tertia.	Cotonea mala,
Cepæ arimonīā	Calamintha
retundit,	Ferrum Mentha
Ruta.	Polygonon mas.
Cerastæ ictus	Cicatricum re-
remedia.	remedia,
Cedria, siue cedrinus	Anemone
liquor	Aloë
Harundo	Adeps
Rosa	Bulbus esculentus

C V R A T I V V S.

Balanus myreplica

Cistos

Centaurium

Chamaesyce

Calx viua

Corallium

Aes vstum

Aeris flos

Aerugo aurificum

Fuligo butyri

Faba Fex vini

Oleum myrtinum

Oleum balaninum

Oleum cicinum

Olea æthiopica

Peucedanum

Plumbum elotum

Pumex

Scoria argenti.

Cicutæ cōtraria.

Passum & vinum

Vinum in communi

Acorum

Hermo. Cor. cap. 17.

Cimices fugan-
tia & necantia.

Hermo. Cor. cap. 366.
& 306.

Clauorum re-
media.

Smaris

Fimum

Lasertium

Coeliacorum

remedia.

Myrrha

Hypocistis

Licium

Olea syluestris

Quercus aut robur

Galla Thus

Myrtus

Cotonea Morus

Lixiua ex ficu

Ceruinum cornu

Faba Aegyptia

Lapathon

Plantago

Coronopus

Rhaponticum

Acantha leuce, siue spi-
na alba

Ferula

Lasertium

Tragos herba

Papauer satium

Vinacei

Nuclei vinaceorum

Elæomeli

Vinumphœnicite

Vinum rhenite

Ferrum

Lapis morochthus.

Colli remedia.

Colocynthis

Fimum

INDEX

Galerita
Mel
Petroselinum
Ruta
Sesamum
Talus suis.

Colorem com- mendantia.

Acetum scillite
Buphthalmos
Cerussa
Cuminum satium
Laserpitium
Mastichinum
Vnguentum rosaceum
Vinum
Vinum aromatite.

Collectionum remedia.

Amomum
Vnguentum telinum
Zopissa
Naphtha
Myrica
Paliurus
Cyprus
Olea sylvestris
Glandes
Morus
Grossi
Ouum
Triticum
Hordeum

Foenogracum
Linum
Cicer
Agrioraphanus
Plantago
Sonchos
Nasturtium
Bulbus esculentus
Argemone altera
Rhaponticum
Acantha leuce
Thymus
Coriandrum
Smyrnum
Libanotis
Viscum
Parthenion
Cannabis syluatica
Anagyris syluatica
Helxine
Pentaphyllon
Peristerion supinus
Papauer satium
Stratiotes aquaticus
Cytisus
Ampelos leuce
Vinum in communi
Vinum adynamon
Vinum cydonite.

Comitialis mor- bi remedia.

Cardamomum
Balsamum

Naphtha

C V R A T I V V S.

Naphtha		Helleborum nigrum
Populus nigra		Hippophœston
Ficus		Ampelos leuce
Iuncus odoratus		Ampelos melæna
Lepus terrestris		Oxymel
Mustella	Iecur	Acetum scillite
Vnguis asini		Lapis selenites
Lichen equi		Lapis aëtites
Iecur hirci		Cotes.
Hirundines		Conceptioni
Serum		contraria.
Lac humanum		Epimedium
Coagulum	Fel	Heliotropium maius
Sanguis		Aerugo ferri
Fimum		Alumen
Plantago		Lapis ostracites
Bryngion		Herm. Cor. cap. 177.
Ruta		Conceptionem
Seseli Mafsiliense		facilitantia.
Libanotis		Coagulum
Spondylion		Lolium
Peucedanum		Staphylinos agrios
Laserpitium		Lapis famius.
Galbanum		Concoctioni
Sagapenum		vtilia.
Ammoniacum		Anethum
Trifolium		Althæa
Conyza		Acetum scillite
Anthyllis		Balsamum
Symphyton		Crocus
Cestron		Crocomagma
Pentaphyllon		Caros
Papauer aphrodeles		Cestron
Viola purpurea		

Q-9

INDEX

Calx viua	Lixiua à ficu
Bruca	Fimum
Ligusticum	Dracunculus maior
Pulegium	Dracunculus minor
Papauer satium	Asphodelus
Resina	Capparis
Styrax	Argemone
Seseli Mafsiliense	Rhaponticum
Sulphur	Gentiana
Vinum	Aristolochia tertia
Vinum resinatum	Centaurium maius
Vinum absinthite	Acantha leuce
Vinum tragoriganite	Abrotonum
Constrictoriae	Origanum
medicinae.	Pulegium
Vide, Adstrictoriae me-	Calamintha
dicinae.	Serpyllum
Conuulsionis	Baccharis
remedia.	Panaces heracleon
Iris Illyrica	Libanotis
Acorus	Peucedanum
Cardamomum	Laserpitium
Asarum	Sagapenon
Costus	Galbanum
Iuncus odoratus	Clinopodium
Balsamum	Chamaedrys
Helenium	Alisma
Calamus odoratus	Cestron
Sampsuchinum	Xyris
Metopium	Symphytum
Bdellium	Psyllium
Iuniperus	Phlomidis
Cedrides	Ampeloleuce
Halimos	Vinum scilliticum

C V R A T I V V S.

Vinum chamædryte
 Vinum tragoriganite
 Vinum daucites
 Vinum panacite.

Condylomatum
 remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum

Myrtus

Cotonea

Ouum

Aloë

Anethum

Libanotis

Ballote

Stachys

Phalangion

Pentaplyllon

Vitis sativa

Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

Cordis tremoris
 medicinx.

Nardi spica.

Coriandro con-
 traria.

Vinum in communi

Diosc. lib. 6. cap. 9.

Corpora defun-
 cia à corruptione
 diu tuetur.

Cedria,

Corpus macres-
 scentia.

Canchamum.

Coxæ doloris
 remedia.

Strigmenta à palestris.

Coxendicum
 doloris remedia.

Asparagus

Agaricus

Althæa

Abrotonum

Aster Atticus

Acetum scilliticum

Centaurium minus

Calamintha

Coris

Cestron

Cucumis sylvestris

Erysimum

Euphorbium

Fimum

Garus

Helenium

Ammoniacum

Hypericon

Hiberis

Heliochrysos

Iris Illyrica

Lolium

Lupinum sativum

Laserpitium

Naphtha

Onos

Populus alba

Q q a

I N D E X

- | | |
|---|--|
| <p> Panaces heracleon
 Peucedanum
 Pentaphyllon
 Ruta
 Scammonium
 Vinum asarite
 Xyris.
 Crassitudinem
 extenuantia.
 Porrum
 Staphis agria.
 Croceum colo-
 rem facit.
 Rhaponticum.
 Cruditatis re-
 media.
 Balsamum
 Strigmenta à balneis
 Gentiana
 Vinum scilliticum.
 Cruetas gene-
 rat.
 Lana vsta.
 Culices fugan-
 tia.
 Cupressus
 Conyza
 Ebulus
 Absinthium
 Hiberis
 Plumbum vstum.
 Cutē albicantia. </p> | <p> Rapum sylvestre.
 Cutem erugātia.
 Oleum amygdalinum
 Styrax.
 Cutem lenientia.
 Amygdala amara
 Oleum sicyonium
 Vnguentum telinum
 Succus Peponis
 Terra Chia.
 Cutis vitia tol-
 lentia.
 Adarce
 Ampelos leuce
 Amygdalæ amaræ
 Cochleæ terrestres
 Costus
 Chamaeleon niger
 Iris Illyrica
 Lac
 Ficus
 Linum
 Lupinus
 Lotus sylvestris
 Mel ponticum
 Oleum raphaninum
 Picea
 Sanguis leporis
 Spuma argenti.
 Cutis pruritus
 remedia.
 Lac. </p> |
|---|--|

C V R A T I V V S

DENTIVM do-
loris remedia.

Amurca
Halicacabus
Asparagus
Allium
Anagallis
Aristolochia
Acantha leuce
Absinthium
Arction
Acetum
Acetum scilite
Alumen
Batrachion
Cedria
Cytinus
Cochlex terrestres
Capparis
Chelidonium maius
Chamaeleon niger
Clematis daphnoides
Cucumis anguinus,
siue syluestris
Characias
Colocynthis
Ephemeron
Helleborus niger
Ficus Galba
Galbanum
Hedera
Hyoscyamus
Hyssopus
Laserpitium

Leucacantha
Myrica
Morus
Melanthion
Melissophyllon
Naphtha
Olea æthiopica
Picea
Plantago
Panaces heracleon
Pyrethrum
Peucedanum
Pentaphyllon
Rhus
Ranæ
Sepiæ
Senecta serpentis
Strychnon hypnotico,
siue somniferum.
Vnguentum rosaceum
Vermes terreni.

**Dentiū stupo-
ris remedia.**

Portulaca.

**Dentitioni in-
fantium vtilia.**

Leporis cerebrum
Butyrum cum melle.

Dentifricia.

Purpura
Buccinum
Cerninum cornu
Halcyonium

Q. q 3

I N D E X

Corallium.	Et in verbo, Pituitæ de
Dentibus stupo-	stillationis remedia.
rem adferentia.	Dilachrymatio-
Cadmia.	nes emendantia.
Dentes firmantia.	Picea
Lentiscus	Pinus.
Oliuæ colymbades	Discussoriæ me-
Myrrha	dicinæ.
Oleum omphacinum.	Androsæmon
Dentes albicare	Althæa
facit.	Viscum
Halcyonium.	Galbanum
Dentes vitiatos	Ammoniacum
extrahentia.	Lapis Gagates.
Amurca	Dolorum inue-
Oleum oleastri	terarorû remedia.
Dentes mouentia.	Sinapi
Oleum oleastri.	Lana succida
Depiles facientia.	Ligusticum.
Scolopendria	Dolores lateris.
Characias.	Vide, laterum dolores.
Desquamatis	Dolorem ne sen-
utilia.	tiant qui vrendi se,
Strigmenta gymnasto-	candiv é sunt.
rum	Mandragoras
Lana succida.	Lapis memphites.
Destillationes	Dorycnj curatio
coërcentia.	Diosc. lib. 6, cap. 6.
Iritum	Draconis maris
Styrax	ni morsus.
Naphtha	Mullus piscis

CURATIVVS.

Vrina
Ocymum
Absinthium
Plumbum elotū & cre
matum
Sulphur
Diosc. lib. 6. cap. 61.

Dryini morsus
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 65.

Duritiem emol-
lientia.

Amaracinū vnguentum
Bdellium
Buphthalmos
Cyprinum
Capparis
Erysimon
Aegilops
Ficus
Fimum
Glans
Galiopsis
Hydropiper
Ammoniacum
Lens
Linum
Lapis alabastrites
Megalium
Melanthion
Mandragoras
Porrum
Panaces heracleon

Pentaphyllon
Paronychia
Pyrites
Styrax
Sanguis
Smyrnion
Terra cimolia
Vinacei.

Dysentericorum
remedia.

Adipum medicinae
Asparagus
Argemone
Agaricum
Althæa Alcea
Alisma
Aizoon maius
Butyrum
Cupressus
Cotonea
Cornu
Cervinum cornu
Coagulum
Cera
Clematis daphnoides
Elatine
Eupatorium
Fœnogræcum
Faba Aegyptia
Ferrum
Galla
Omphacium
Hypocistis

Q 4

INDEX

Hedera	Symphitum
Hippuris	Stœbe
Lentiscus	Sideritis achillea
Lycium	Salsugo
Lotus	Tragion
Lixiua ex ficu	Vitis sativa, siue vini-
Lac schliston	fera
Linum	Vinacei
Lapathum	Vinum cydonite
Lyfimachia	Et in verbo, Intestino-
Myrrha	rum remedia.
Macer	EBRIETATI
Malum punicum	vtilia
Melissophyllum	Amygdalus amara
Naphtha	Brassica sativa
Nymphæa	Absinthium.
Nuclei acinorum	Elephantia re-
Oriza	media.
Omphacium	Cedria
Oxalme	Erinaceus terrestris
Portulaca	Serum
Plantago	Fel animalium
Phyllitis	Zythum
Polemonium	Plantago
Pentaphyllon	Calamintha.
Papauer ceratidis, siue	Elephantiasis
corniculare	gnentia.
Quercus	Vinum sicyte.
Rubrica, siue terra le-	Emollientes me-
mnia	dicina.
Silurus	Adipum medicina.
Sanguis	Bdellium
Sium	Cinamomum
Scordium	

C V R A T I V V S.

Cyrtos
 Cistos
 Cera
 Cerussa
 Calcanthum
 Calx viua
 Oesypus
 Fœnogræcum
 Gleucinum
 Ammoniacum
 Irinum
 Laurus
 Lana succida
 Linum
 Lapis Gagates
 Metopium
 Myrrha Bœotica
 Medullæ animalium
 Naphtha
 Palimpissa
 Panaces heracleon
 Psyllon
 Plumbum elotum
 Resina
 Styrax
 Viscum.
 Enterocelæ re-
 media.
 Hippuris, siue equise-
 tum.
 Ephelidis vti-
 lia.
 Balanus myrepica

Cici.
 Epinietydis mor-
 bi remedia.
 Olea syluestris
 Myrtus
 Amygdalæ amaræ
 Grosi
 Fimum
 Brassica satiuæ
 Plantago
 Cucumis
 Porrum
 Absinthium
 Coriandrū cum melle
 passa; vua
 Viscum
 Heliotropium maius
 Vua passa.
 Epiphoræ reme-
 dia.
 Asarum
 Malobathrum
 Cotonea
 Crimnon
 Coriandrum
 Liliū
 Ambrosia
 Vua passa
 Terra samia.
 Erucis pinorum
 conuenit
 Vnguentum meliū
 Dioc, lib. 8. cap. 2.

Q q 3

I N D E X

Eruptionum re- media.

Serum
Lupinum satium
Beta
Portulaca
Pentaphyllon
Balanus myreplica
Vinum myrsinite
Alumen.

Excreationis cras- sæ pectoris reme- dia.

Pix liquida
Dracunculus minor
Tordylon.

Excrescentia de- primentia.

Alumen
Cerussa
Cinis vitis
Diphryges
Erinaceus marinus
Lapis
Ochra
Pumex
Pyrites
Scordion
Spuma argenti
Sal.

Extenuatoriæ medicinæ.

Artemisia
Anthemis
Iris Illyrica
Hyssopus
Lapis hæmatites
Pulegium
Panaces heracleon.

Extractoriæ me- dicinæ.

Galbanum
Viscum
Thapsia
Scoria argenti.

FACIES ne à so- le adulatur

Ouum.

Faciei vitia auge- rentia.

Ampelos agria
Halcyonium
Adarces
Brassica sativa
Bulbus esculentus
Balanus myreplica
Cinnamomum
Cochleæ terrestræ
Cyclaminos
Eruum
Ficus
Hedera
Iris Illyrica
Lepus
Lilium

C V R A T I V V S.

Lotus syluestris
 Mastichinum
 Mel sardoum
 Oleum amygdalinum
 Oleum raphaninum
 Pepo
 Polygonaton
 Spuma argenti
 Sisymbrium aquaticum
 Thapsia.

Faciei rugas au-
 ferentia.

Cacalia.

Fastidium gene-
 nerantia

Vinum catorchite

Diosc. 6. in præfat.

Fatigationum
 remedia.

Adeps.

Fauos rūpentia.

Eruum

Vua passa

Peponis radix

Grossi.

Faucium morbi
 remedia.

Acetum

Acetum scillite

Cacalia

Aethiopia

Ficus

Lac

Laserpitium

Mel

Papauer satiuum

Styrax.

Fauces asperas
 facientia.

Characias

Cimolia terra.

Febribus con-
 traria.

Mala punica.

Febrifugia.

Centaurium minus

Conyza.

Febriū remedia.

Agaricum

Aristolochia tertia

Anthemis

Anchusa

Aphronitrum

Balsamum

Buglossum

Costus

Cucurbita

Clymenon

Fœniculus

Hypericon

Hyoscyamus

Heliotropium maius

Lac humanum

Lagopus

I N D E X

<p>Myrrha Ouum Oleum sicyonium Portulaca Piper Panaces heracleon Polygonon mas Pentaphyllon Peristerion supinus Rhaponticum Ruta Smyrnion Sagapenon Saxifraga Trifolium Vinum mellitite Vinum rhoite Vinnm hyssopite. Febris quartanæ remedia, Araneus Buglosson Cimices lecti Dipsacum Hypericon Heliotropion maius Pentaphyllon Verbenaca supina Trifolium Ruta. Felle suffusis vtilia, Adiantum</p>	<p>Vinum asarite Fellei humoris remedia, Absinthium Centaureum minus. Feritatem anima- liū mitigantia, Oenagra, Ferruminandi vim habentia, Spuma argenti Rubrica sinopis Spongia Lapis morochthus. Filium masculū generantia, Phyllon Orchis Crataegonos. Fistularum res media, Adeps Acisaron Cinnamomum Characias Chalcites lapis Dracunculus minor Dipsacus Helleborum nigrum Orchis Serapias Omphacinum Papyrus</p>
--	---

C V R V A T I V S.

Plantago
Pentaphyllon
Stratiotes terrestris.

Flatus discuti-
entia.

Cinnamomum

Ocimum

Vinum stichadite.

Flatum adgene-
rantia.

Malus

Rythum

Phaseolus.

Fluxionum re-
media.

Fuligo butyri

Erysimon

Lichen in petris

Ocimum

Portulaca

Pepo

Squama æris

Papauer[ati]um

Acantha

Arabica

Chium vinum

Acetum

Ebenus

Licium

Lixiuia ex ficu

Vinum rhoite

Vinum terebinthinum

Vinum pissite

Vinum melaplinthium.

Fœtus necantia.

Vide, Partus necantia.

Fœminas steris

lescentia.

Lepus terrestris

Hedera.

Formicę morbi
remedia.

Cicer

Characias

Chamæsyce

Batrachion

Dipsacum

Heliotropium maius

Lacerta

Ruta

Thus

Vitis sativa.

Fracturæ res
media.

Fuligo pictoria.

Fungorū venenas
torū remedia.

Verbenaca

Fimum

Mel

Rhaphanus

Absinthium

Melissophyllon

Fungi

Vinum in communi

INDEX

Acetum	Oxalme
Calcanthum	Olea
Sal	Salix
Pyrorum ligni cinis	Vnguentum melinum
Aphronitrum	Vnguentum telinum
Cinis vitium	Vrina
Lapis Aſius	Vinum myrsinite
Dioſc. lib. 6. cap. 23.	Allium
Furunculorum	Beta.
remedia.	G ANGRAENAE
Ficus	morbi remedia.
Groſſi	Ampelos leuce
Triticum	Brasſica ſtivia
Rhaphanus	Bulbus eſculentus
Aſphodelus	Cinnamomum
Galbanum	Characias
Pycnocomum	Galiopſis
Sal	Iuglans
Aphronitrum.	Lixiua e ſicu
Furfures tollētia.	Lilium
Allium	Lens
Adiantum	Lupinum ſatium
Alumen	Laſerpitum
Fœnograecum	Rhus
Fel animalium	Rhaphanus
Groſſi	Vrtica
Linum	Vua paſſa.
Lilium	Genitalium mor-
Myrtus	bi remedia.
Malua	Asparagus
Oleum oleaſtri	Amurca
Oleum amygdalinum	Aloë
Oleum myrtinum	Aſter atticus

C V R A T I V V S.

Cyprinum

Cotyledon

Fœnogræcum

Flos salis

Linum

Malum punicum

Polygonon

Sampſuchinum

Vinum terebinthinū.

Genitalium vī-
rus extingue-
tia,

Alumen.

Genarum mor-
bi remedia,

Aloë

Aerugo aurificum

Aerugo ferri

Ammoniacum

Lapis ſchiſtos

Mituli

Naphtha

Olea ſylueſtris.

Genituræ pro-
fluuij in ſomno
remedia.

Lactuca ſylueſtris

Nymphæa

Hermol. Cor. cap. 932

Generationem
deprimentia,

Clymenon

Heliotropium maius

Mentha

Thelypteris

Xyphion

Asplenon.

Genituram ex-
tinguentia.

Cannabis ſatiuæ ſemen

Anethum.

Genituram au-
gentia.

Semen coriandri

Coriandrum.

Genitalium tor-
porem inducē-
tia.

Cicuta.

Gingiuarū mor-
bi remedia.

Aristolochia tertia

Aloë Acetum

Acetum ſcillite

Alumen

Butyrum

Canchamum

Cytinus

Chalcitis lapis

Aerugo aurificum

Aerugo ferri

Galla

Lycium

Lepus terreſtris.

INDEX

Lac schiston
 Lapis alabatriles
 Myrrha
 Mastiche
 Oleum omphacinum
 Pruna
 Plantago
 Pumex
 Rosa
 Rubus
 Staphis agria
 Sal
 Tribulus
 Vna oenanthe
 Vinum rhetinite.

Clabros aut de-
 piles faci-
 entia.

Scolopendra
 Characias.

Gladiorum acie
 perstringentia.

Malum syluestre.

Glandis membri
 remedia.

Mel.

Grauedinis re-
 media.

Styrax.

Gurgulioni vti-
 lia.

Silurus

Gutturis reme-
 dia.

Bdellium

Ficus

Aster Atticus

Vinum halosantinum

Gypsi curatio.

Lixiua ex ficu

Diosc. lib. 6. cap. 24.

HÆMORRHOL-
 darum remedia.

Amaracinum

Allium

Anonis

Aloë

Cepe

Irinum

Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum

Palma

Plumbum elotum

Rhus

Rubus.

Hæmoroidarum
 curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 66.

Halitus oris re-
 media.

Agallochum

Anisum

Citrum

Bromos

Malo

CURATIVVS.

Malobathrum

Myrrha

Mastiche

Vinum selenite.

Hastulas infis

xas corpori ex-
trahentia.

Oxyacantha.

Hepaticorum re-
media.

Vide, Iecinoris morbo
rum remedia.

Herbæ quæ peri-
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Herniæ medicinæ

Cinnamomum

Cupressus

Cytinus

Pentaphyllon

Psyllium

Xiphion.

Herpetis con-
traria.

Strichnon satium

Acerum.

Hirundinum vi-
fus restaurantia.

Chelidonium maius.

Hirundines

pellentia.

Acetum.

Hirudinis

curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 31.

Hominem ne-

cantia.

Iuniperi ramenta

Simulax seu taxus.

Hominis morsus
remedia.

Iuglans.

Horrores excu-

tientia.

Vide, Rigorem excu-
tientia.

Hulcerantes

medicinæ.

Buprestis

Salamandra

Batrachion

Ruta

Lonchitis

Hedysaron

Clematis

Portulaca agrestis

Ampeloleuce.

Vlcerum reme-
dia.

Amygdala amara

Anemone

Amylum

Anagalis.

R r

INDEX

Aristolochia	Aerugo aurificum
Aloë	Fel
Anthemis	Glans
Althæa	Grossi
Anchusa	Hedera
Astragalus	Goëd, id est, coriandrū
Aconitum	Gentiana
Arction	Iris Illyrica
Acetum	Isatis
Arsenicum	Indicus lapis
Alumen	Lixiuia cū cinere ficus
Brasica sativa	Lentiscus
Beta	Lycium
Bulbus esculentus	Lana combusta
Ballote	Lolium
Caries lignorum	Lens
Cistos	Lupinus
Chelidonium	Libanotis
Centaurium	Laserpitium
Chamæleon niger	Lilium
Coriandrum	Myrtus
Chamædrys	Mel
Chamæpitys	Mandragoras
Chamelæa	Nasturtium
Cadmia	Narcissus
Cinis vitis	Olea sylvestris
Corallion	Oleum amygdalinum
Dracunculus	Orobis
Elelisphacon	Orchis
Eupatorium	Oenagra
Ebulus	Omphacium
Aes vstum	Plantago
Ficus	Pix
Fimum	Palma

C V R A T I V V S.

Purpura combusta	Amurca
Pepo	Halicacabus
Panaces	Allium
Peucedanum	Abfinthium
Prallon	Anifum
Pentaphyllon	Androfaced
Periftereon fupinus	Alifma
Papauer ceratitidis, id eft eft, corniculare	Ampelos agria
Pfyllium	Aqua maris
Plumbum lotum	Acetum
Pumex	Aphronitrum
Rhamnus	Halcyonium
Ruta	Bupreffis
Stratiotes terreftres	Cyperus
Scordion	Cinnamomum
Sandaracha	Calamus odoratus
Sal	Cochlex terreftres
Spongia	Cicer
Thus	Chamæleon albus
Viſcum	Chamædris
Thelipteris	Ceftron
Teftæ fornacum	Cotyledon
Vrtica	Cucumis anguinus
Humorum malo- rum medicinæ.	Cici
Metopium vnguentū	Helleborum nigrum
Nardinum	Ebulus
Amygdalæ dulces	Ficus
Mel.	Erinaceus terreftres
Hadropicorum remedia,	Hippophaës
Asarum	Hippophæſton
	Hyſſopus
	Laſerpitium
	Lathyrus
	Origanum

R r z

INDEX

Plantago	Picea
Pancratium	Pinus
Polium	Daphnoides
Raphanus	Palma elate
Ruta	Amygdalæ amaræ
Scilla	Lac humanum
Sampsuchus	Scandyx
Staphylinus	Struthium
Smyrnion	Anagallis
Strychnon hypnoticō,	Agaricum
siue solanum somni-	Rhaponticum
ficum	Gentiana
Sal	Glycyrrhiza
Trifolium	Bryngion
Tithymalus	Abinthium
Vitex	Serpyllum
Vrina	Spondylium
Vinum scillite	Ammoniacum
Vinum rhetinle	Anthemis
Vinum cedrite	Chamæpitys
Vinum asarite	Vettonica
Vinum panacite.	Eupatorium
Hyoscyami cu-	Hyoscyamus
ratio.	Pentaphyllon
Diosc. lib. 6. cap. 15.	Chrysocome
I ECINORIS	Papauer ceratitis, siue
remedia.	cornutum
Acorus	Epipactis
Nardi spica	Isopyron
Nardum gallicum	Vinum cydonite
Amomum	Vinum pilsite
Iuncus odoratus	Vinum abinthite
Agallochum	Vinum nardite
	Vinum asarite

C V R V A V I V V S.

Vinum ex syluestri a-
faro

Vinum chamælatēs

Rubrica sinopis.

**Ignis sacri re-
media.**

Asarum

Acacia

Acinos herba

Anchusa

Lycopsis

Aizoon maius

Brassica sativa

Acetum

Beta

Baccharis

Bechion

Crocus

Cupressus

Coriandrum

Cicuta

Cotyledon

Cici

Chalcitis lapis

Aerugo ferri

Harundo

Helxine

Isatis

Lens

Lilium

Lens palustris

Lapis smyris

Myrtus

Malua

Mandragoras

Portulaca

Piantago

Parthenion

Polygonon mas

Pentaphyllon

Peristereon rectus

Papauer sativum

Psyllium

Rhamnus

Rosa

Ruta

Rubus

Idæa

Salix

Sanguis

Seris

Strychmon, siue solanū
sativum

Stratiotes aquaticus

Vrina.

**Ilei morbi re-
media.**

Oleum vulgare

Strychnos halicaca-
bus.

**Impetiginis mor-
bi remedia.**

Amygdalæ amaræ

Lapathon

Lichen in petris

Lolium

Rr 3

I N D E X 973

Thus	Aspalatus
Myrrha	Amygdalæ amara
Nasturtium	Absinthium
Sinapi	Anisum
Propolis.	Anethum
Incussis vtilia.	Antemis
Phlomides.	Althæa
Infantes mor-	Costus
tuos vtero ei-	Cicer
cientia.	Cyminum
Dictamnus.	Eryngion
Infantibus	Epithymum
vtilia.	Helenium
Athara	Hyssopum
Aster Atticus	Heracium maius
Strychnum satium	Iuncus odoratus
Smilax aspera.	Iuniperus
Infantium pupil-	Lac
læ vt glaucæ, non	Ligusticum
nigræ reddan-	Hordeum
tur.	Ocimum
Auellana.	Peucedanum
Inflationes faci-	Rapa sylvestris
entia.	Rhapoticum
Allium	Triticum
Capparis	Thymoxalme
Glans	Vrtica
Laserpitium	Vinacei
Porrum	Vinum
Bulbus esculentus	Vinum pifsite
Inflationum res	Vinum absinthie
media.	Vinum scilliticum
	Vinum chamædryite
	Vinum tragoriganite

C V R A T I V V S.

Vinū syluestris nardi.
Inflammationū
remedia.

Coriandrum

Adeps

Asphodelus

Argemone

Anagallis

Artemisia

Aizoon maius

Acetum

Butyron

Brassica syluestris

Bechion

Brion thalassion

Casia

Cotyledon prima

Elatine

Ebulus

Faba

Ficus

Harundo

Hyoscyamus

Irinum

Laurus

Linum

Lupinum satium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens pulustris

Lapis

Melilotus

Mandragoras

Naphtha

Ocimum

Ochra

Picea

Platanus

Portulaca

Pulegium

Parthenion

Polygonon mas

Papauer erraticum

Rosa

Rhus

Susinum

Sabina

Sesamum

Sonchos

Scordion

Symphytum

Statiotes aquaticus

Triticum

Tribulus

Vinacei

Xyris.

Inguinum mor-
bi remedia.

Vide, Genitalium.

Ingenium prom-
ptum facientia.

Ouum.

Infaniam indu-
centia.

Hyoscyamus

Strychnon hypnoticū

R r 4

I N D E X

Mandragoras.

Infanientium

remedia

Bettonica

Helleborum nigrum.

Insomnia indu

centia.

Vide, Somniferæ me-
dicinæ.

Intestinorum

remedia.

Agallochum

Anthemis

Cochleæ terrestres

Hippuris

Irinum

Lac

Linum

Mastichinum

Malua

Hordeum

Palma

Portulaca

Rosaceum

Rosa

Ruta

Salix

Spartum

Vinum surrentinum

Triticum.

Et in verbo, Disenteris
corum remedia.

Intertrigo vt tol-
latur.

Vitex

Corium.

Ischiadicorum

remedia.

Afarum

Balsamum

Cardamomum

Silurus

Fimum

Nasturtium

Thlaspi

Rhaponticum

Thymus

Ammoniacum

Leontopetalon

Erythrodanum

Ascyron

Androsenum

Chamæpitys

Polemonia

Ocimoides

Aethiopis Arction

Chamæcissos

Spartum

Colocynthis

Oxymeli

Vinum panacite

Salsugo

Adarces.

Iumentis con-
traria.

C V R A T I V V S.

Gramen cilicum

Nerion.

Iumentorum

scabiē emen-
dantia.

Amurca

Alysson

Lupinum sativum

Oleum picinum

Oleum lentiscinum.

Iumentorum

ulcera emem-
dantia.

Oleum picinum

Alysson

Thelypteris.

L A B I O R. V M
fissuræ remedia.

Adeps

Lycium.

Lac coagulantia.

Balsamum

Ficus

Lac extinguentia.

Cicuta.

Lachrymas

trahentia.

Aerugo aurificum.

Lacertæ morsus

remedia.

Portulaca

Seps, siue lacerta cal-

chidica, in vino epota.

Lachrymæ que
perimunt.

Dioscorides libro, 6.
in præfat.

Lachrymatios

nes emendan-
tia.

Vide, dilachrymationes
emendantia.

Lactis vberta-
tem facientia.

Argemone

Anethum

Ampeloleuce

Cicer

Circæa

Echion

Fœniculus

Halimos

Hordeum

Lactuca

Malua

Melanthion

Ocimum

Sonchos

Vitex.

Lactis coagu-

lati curatio.

Dioscorides lib. 6. cap.
26.

Lassitudinum

remedia.

Rr 5

INDEX

Anethinum
Adeps
Clymenon
Laurinum
Ammoniacum
Sal
Lapis gagates
Vinum chamælatēs.

Laterum morbi remedia.

Acorus
Agallochum
Asphodelus
Aristolochia tertia
Ampeloleuce
Balsamum
Brassica sativa
Bdellium
Cyprinum
Fimur
Centaurium maius
Gentiana
Galbanum
Hordeum
Leucacantha
Myrrha
Naphtha
Phu
Panaces heracleon
Petroselinum
Prasiū, siue marrubiū
Pseudobunion
Ruta

Sagapenum
Terebinthina
Thapsia
Vrtica
Vinum cedrite
Vinum hyssopite
Vinum richadite
Vinum tragoriganite
Vinum aromatite
Vinum acorite
Vinum glycyrrhite.

Lendes necantia.

Cedria
Mel
Myricæ
Beta
Allium
Alumen.

Lentiginis macu- læ remedia.

Alysson
Halcyonium
Aqua maris
Ampeloleuce
Brassica sativa
Bulbus esculentus
Balanus myrepica
Cinnamomum
Bruum
Galbanum
Melanthion
Raphanus
Sanguis leporinus

CV R A T I V V S.

Sifymbrium sylueſtre
Spuma argenti
Triticum cum aceto.

Lepræ remedia.

Allium
Anemone
Aristolochia
Acantha
Anchusa
Acetum
Ampelos leuce
Halcyonium

Alumen
Adarce
Bupreſtis
Bralsica ſatiua
Cochleæ terreſtres
Clematis
Fraxinus
Cucumis anguinus
Helleborum nigrum
Aerugo aurificum

Ficus Fel
Hordeum
Iuniperus
Lolium
Lapathum
Lepidium
Myofotis
Oleum oleaſtri
Oleum cicinum
Olea æthiopica
Oriza

Salamandra
Serum
Sinapi
Struthion
Scammonia
Sulphur Sal
Terebinthina
Thapſia
Terra melia
Vlmus
Vrina
Vitis ſatiua.

Leporis marini remedia.

Fiber
Cornus
Lapis ophites
Halcionium
Chamæleon niger
Cicer
Cucumis anguinus
Characias
Helleborum nigrum
Ficus
Glutinum
Laſerpitium
Olea
Pruna
Rhaponticum
Ruta
Sal
Vitis ſatiua
Vinum tethalaſſome.

I N D E X

num.

Lienis morbi

remedia.

Iris Illyrica

Nardum gallicum

Myrice

Acorus

Canchamum

Oleum amygdalinum

Lycium

Vitex

Cotonea

Linum

Ficus Aegyptia

Lac humanum

Lupinum satium

Raphanus

Lapathum

Sinapi

Brassica sativa

Nasturtium

Piper

Struthion

Hedera

Cyclaminos

Pancration

Capparis

Lepidium

Agaricum

Rhaponticum

Aristolochia tertia

Crocodilion

Absinthium

Hysopum

Tragoriganum

Pulegium

Dictamnus

Sison

Anison

Smyrnion

Peuucedanum

Sagapenom

Ammoniacum

Viscum

Polium

Chamedrys

Leucoion

Nymphæa

Asplenon

Hemionitis

Brythrodanum

Vertonita

Louchytis altera

Polemonia

Clymenon

Xyris

Anchusa

Adiantum

Pteris

Ampelos leuce & agria

Aqua maris

Vitis sativa

Acetum scilliticum

Vinum panacite

Ferrum

Corallium

Lapis Asius

Vrtica

CV RAT I V V S.

Coris

Hermol. Cor. cap. 12 4

Linguae utilia.

Olea æthiopica.

Lippitudinis res
media.

Ebenus

Lapis hæmatites

Plantago

Spongia.

Liquores qui
perimunt.

Dioscorides lib. 6. in
præfat.

Liuorem emen-
dantia.

Allium

Aqua maris

Iuglans

Lana succida

Rhaponticum

Sinapi

Lupinum satium

Thapsia.

Locorum mulie-
brium remedia.

Anethum

Althæa

Fœnogræcum

Linum

Leucoion

Trifolium.

Lumbricos ne-
cantia.

Coriandri semen

Abſinthium ſeriphium

Brassica ſativa

Chamaeleon albus

Calamintha

Myrrha

Portulaca

Oleum cicinum

Thelypteris

Lupinum satium.

Lumborum affe-
ctuum remedia.

Aspharagus.

Capparis

Chamaepeuce

Echion

Harundo

Leucacantha

Papauer cornutum

Sampſuchinum

Smyrnion.

Lupos necantia.

Aconitum pardalian-
ches.

Aconitum alterum

Apocynum.

Luscioſorum re-
media.

Fel animalium

Sanguis.

I N D E X

Naphtha	Cyclaminos
Cedrides	Asphodelus
Myrice	Capparis
Tilia	Anemone
Hypocistos	Hedera
Lycium	Agaricum
Acacia	Aristolochia tertia
Vitex	Centaurium maius &
Olea sylvestris	minus
Lotus	Bryngion
Amygdala amara	Abſinthium
Ficus	Origanum
Cochlex terreſtres	Tragoriganum
Fiber	Pulegium
Bupreſtis	Eleliſphacos
Oefypus	Calamintha
Fimum	Thymus
Cicer	Serpyllum
Raphanus	Sampſuchus
Lapathum	Baccharis
Brasſica ſatiua	Ruta
Chondrylla	Panaces heracleum
Lactuca ſylveſtris	Liguttiſicum
Caucalis	Seſeli Maſſilienſe
Bruca	Tordylon
Ocimum	Sifon
Cepe	Fœniculus
Orobanche	Oreofelinon
Allium	Petroſelinum
Porrum	Hippomarathrum
Ampelopraſon	Hippoſelinum
Naiſurtium	Smyrnion
Thlaſpi	Daucus
Struthion	Libanotis

Aniſum

Melan

C V R A T I V V S.

Melanthion
 Laſerpitium
 Sagapenon
 Euphorbium
 Clynopodium
 Chamedrys
 Lilium
 Meliſtophyllon
 Praſinum
 Stachys
 Trifolium
 Polium
 Scordion
 Artemiſia
 Leucoion
 Anthemis
 Pæonia
 Erythrodanum
 Anagyris
 Alisma
 Coris
 Hypericon
 Ceſtron
 Medion
 Xiphion
 Tragion
 Heliochryſos
 Mandragoras
 Vrtica
 Myrtus
 Adiantum
 Mirtus ſylneſtris
 Laurus Alexandrina

Daphnoides
 Chamædaphne
 Helleborus niger & al-
 bus
 Ampelos melæna
 Helio tropion maius
 Vinum ſcilliticum
 Vinum abſinthite
 Vinum hyſſopite
 Vinum aromatite
 Vinum daucite
 Vinum panacite
 Vinum helleborite
 Vinum dictamnite
 Staphyllinus.

Menſtrua ſi- ſtentia.

Lentifci ſuccus
 Myrica
 Oxyacanthos
 Thuſ
 Palma
 Malum punicum
 Myrtus
 Lepus terreſtris
 Fuligo butyri
 Coagulum
 Sanguis
 Acinos
 Acantha Arabica
 Hieracium maius
 Nymphæa
 Pæonia

INDEX

Limonion
Medion

Sideritis achilleos

Rubus

Idæa radix

Tragos Lyssmachia

Oxychoenos

Heliochrysos

Papaver sativum

Mandragora

Aizoon maius

Aerugo ferri

Vinum rhetinite

Fax vini

Lapis asius

Morochthus

Hæmatites

Ostracites

Terra samia.

Mentem com-
mouentia.

Coriandrum.

Oreoselinum.

Metalla quæ pe-
rimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Mollientes me-
dicinæ.

Vide, Demollientes.

Morbi regij me-
dicinæ.

Vide, Regij morbi.

Morborum quæ
serpunt remedia.

Vide, Malorum quæ
serpunt.

Mulierum deside-
rio quo fatisciat.

Acorum

Picea

Pinus

Adeps bubulus.

Mulierum in-
firmitatum re-
media.

Amomum

Balsamum

Susinum

Seseli Malsiliense.

Mures necantia.

Chamaeleon albus

Aconitum pardalianches

Helleborus candidus

Hermol. Cor. cap. 28.

Muris aranei mor-
sus remedia.

Mus araneus

Abſinthium

Crhyſogonon

Diosc. lib. 6. cap. 62.

Muris morsus
remedia.

Grosſi

Allium.

C V R A T I V V S.

Muscas necantia.

Lyfimachia.

Myrmecias tol-
lentia.

Ficus.

N A R I V M morbi
remedia.

Malum punicum.

Nauseam discus-
tientia.

Tragoriganum

Pulegium

Foeniculus.

Nauseam mo-
uentia.

Laurinum.

Susinum.

Neruorum mor-
bi remedia.

Oleum sicyonium

Oleum elæomeli

Laurinum

Cyprinum

Gleucinum

Amaracinum

Metopium

Bdellium

Lixiua ex ficu

Erinaceus terrestris

Cochleæ terrestres

Vipera

Vermes terreni

Lac humanum

Triticum

Poterium

Peucedanum

Laserpitium

Lilium

Satyrium

Melissophyllon

Althæa

Cocus

Erigeron

Cacalia

Narcissus

Hippophæston

Vini qualitas

Aqua maris

Acetum scilliticum

Vinum stichadite

Vinum thymite

Fex vini

Fiber.

Nervos lædentia.

Malus

Hedera

Vinum

Vinum gypsatum

Mesagite.

Nervos tollentia.

Mel sardoum.

Nigredines ab-
tergit.

Sabina.

Nodis vtilia.

S s 2

I N D E X

Bdellium.

Nomorum mor

bos curantia,

Asparagus

Sabina

Papyrus

Cistos

Olea syluestris

Olea

Oliuæ colymbades

Malum punicum

Smarides

Fel animalium

Vrina

Lilium

Plantago

Arisaron

Asphodelus

Maron

Prasium

Orchis serapias

Britannica

Peristereon supinus

Galiopsis

Vua œnanthe

Omphacinum

Acetum

Oxalme

Squama æris

Aerugo aurificum

Chalcites lapis

Flos salis

Lapis ostracites.

Nubeculas ocul

lorum emen-
dantia.

Vide, Oculorum reme-
dia.

Nyctiloparum

morbi reme-
dia.

Vide, Lusciosorum re-
media.

O B M V T E S C E -
R E facientis.

Mandragora.

Oculorū epipho-
ræ remedia.

Asarum

Malabathrum

Cotonea

Sesamum

Lens

Cucurbita

Anemone

Argemone

Myosoris

Gentiana

Baccharis

Ruta

Apium

Hemerocallis

Rubus Idæa

Papauer satium

Phlomidis

Aster atticus

C V R A T I V V S.

Viola purpurea	Rosa
Cicuta	Lycium
Oculis contraria.	Acacia
Lactuca	Salix
Porrum	Olea syluestris
Ocimum	Olea Aethiopica
Coriandrum	Palma thebaica
Anethum.	Cytinus
Oculorum mor-	Myrtus
borum remedia.	Cerasia
Acorum	Halicacabus
Casia	Mituli
Cinnamomum	Cochleæ terrestres
Amomum	Scorpius marinus
Balsamum	Vipera
Canchamum	Senecta serpentis
Crocum	Sepia
Crocomagma	Mullus piscis
Oleum vulgare	Ouum
Elæomeli	Hirundines
Oleum amygdalinum	Ceruinum cornu
Myrrha	Lac humanum
Thus	Costus
Fuligo thuris & resinæ	Fuligo butyri
& picis	Lana vsta
Picea	Oesypus
Cupressus	Fel animalium
Sabina	Sanguis
Platanus	Vrina
Populus alba	Amylum
Myrice	Faba
Acalis	Lens
Ebenus	Brassica sativa
	Portulaca

Mel

I N D E X

Seris	Pepo	Tribulus
Lactuca sylvestris		Erinos
Ocimum		Gramen parnasium
Cepe		Rubus
Sinapi		Elatine
Piper		Papauer fatium , &
Zingiber		cornutum
Cyclaminos		Hyoscyamus
Asphodelus		Mandragoras
Dracunculus maior		Aconitum pardalian -
Dracunculus minor		ches
Argemone		Aizoon maius
Anagalis		Helleborus albus
Clelidonium maius		Cici
Orthonna		Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos
Tragacantha		Lotus sativa
Aloe		Sesamoides maius
Absinthium		Aes vstum
Abrotonum		Vua cenanthe
Ruta		Vinum surrentinum
Sampsuchus		Acetum scilliticum
Melilotus		Cadmia
Ruta Galatica, siue syl-		Squama æris
vestris		Ærugo aurificum
Panaces heracleon		Plumbum elotum
Fœniculus		Stimmi
Libanotis		Cinnabaris
Sagapenon		Chalcitis lapis
Ammoniacum		Alumen
Sarcocolla		Pumex
Chamaedrys		Sal
Prasium		Flos salis
Stœbe		Fex vini

C V R A T I V V S.

Spongia	Cyprus
Corallium	Tilia
Pyrites	Acacia
Hæmatites	Olea syluestris
Galactites	Cassanea
Thyites	Malum punicum
Morochthus	Mæna
Sapphirus	Lac schiston
Geodes	Butyrum
Samius.	Plantago Aloë
Opistotonicorū,	Origanum
id est, ceruicis rigo,	Leucoion
re laborantium	Orchis serapias
remedia.	Anthemis
Acanthion	Periclimenon
Eryngium	Rubus
Laserpitium	Staphis agria
Sagapenon	Vua œnanthe
Satyrion	Omphacium
Coris.	Acetum scilliticum
Opñ remedia.	Sandaracha
Sal	Alumen Sal.
Diosc. lib. 6. cap. 17.	Orthopnoicis, id
Oris halitus re-	est, difficulter spi-
media.	rantibus re-
Vide, Halitus oris re-	media.
media.	Helenium
Oris vlcerum re-	Myrrha
media.	Cupressus
Cyperus.	Daphnides
Aspalathus	Cotonea Vrina
Fuligo picis	Struthion
	Cyclaminos

INDEX

Dracunculus maior

Abrotonum

Hyssopus

Calamintha

Thymus

Baccharis

Seseli Mafsilienfe

Hieracium maius

Smyrnion

Spondylium

Peucedanum

Melanthion

Ammoniacum

Meliffophyllon

Bechion

Botrys

Anemone

Hippuris

Vrtica

Elaterium

Hippophæſton

Vinum panacite.

Oſſium ſquamas

extrahen-

tia.

Aristolochia

Ampelos leuce.

Oſſa fracta con-

ſolidantia.

Vetonica

Xyris.

Oues necantia.

Nerion.

Oxypara ingreſ-

dientia.

Ligusticum

Caros

Anethum.

PALPEBRA,

rum remedia.

Vnguentū roſaceum

Maſtiche

Reſina

Fuligo picis

Groſſi

Lixiuia ex ſicu

Vrina

Alumen

Chondrylla

Vide ſuprà, Genarum

morbi remedia.

Palpebrarum pi-

li euulſi ne rena-

ſcantur.

Tellinæ

Sanguis

Capnos.

Pallidum colo-

rem facientia.

Hieracium minus

Alcœ.

Panorum reme-

dia.

Atriplex

Acetum

Bulbus eſculentus

CV R A T I V V S.

Coriandrum cum faba
fracta

Conyza

Ficus

Galiopsis

Olea sylvestris

Helxine

Ocymastrum

Ammoniacum

Ifatis

Plantago

Xyphion.

Pantheras ne-
cantia.

Aconitum pardalian-
ches.

Papaveris cu-
ratio.

Dioscor. lib. 6. cap. 17.
& 18.

Papularum re-
media.

Vrina

Flos æris.

Paralyticorum
remedia.

Capparis

Brythrodanum

Colocynthis

Ampelos melæna

Vinum scilliticum

Aphronitrum.

Partus necantia.

Daphnides

Coagulum

Adeps hircinus & ouil-
lus & bubulus

Nasturtium

Thlaspi

Ruta

Hedysaron

Helleborus albus &
niger

Colocynthis

Ampelos leuce

Vinum phthorium.

Partus quibus
iuuatur.

Iris Illyrica

Cinnamomum

Balsamum

Vnguentum telinum

Irinum

Amaracinum

Myrrha

Picea

Fiber

Olea æthiopica

Oesypum

Fimum

Cicer

Lupinum sativum

Allium

Cyclaminos

Dracunculus maior

Dracunculus minor

S s 3

I N D E X

Hedera	Sulphur
Gentiana	Lapis Iaspis
Centaurium maius	Aëtites
Centaurium minus	Samius.
Pulegium	Paronychiarum,
Elelisphagos	id est, vnguiū mor-
Calamintha	borū remedia.
Baccharis	Thus cum melle
Panaces heracleon	Olea sylvestris
Staphylinus	Myrtus
Thynni falsi caro	Ebur
Seseli Messiliense	Paronychia
Smyrnion	Vua œnanthe
Peucedanum	Aerugo ferri.
Sagapenum	Parotidum, id est,
Galbanum	auriū apostematū
Clinopodium	remedia.
Ammoniacum	Ficus
Chamædrys	Fimum
Prasium	Linum
Bechion	Faba
Artemisia	Lapathum
Conyza	Plantago
Leucoion	Erysimon
Onosma	Viscum
Anthemis	Althæa
Anchusa	Psyllium
Mandragoras	Strycnon fatium
Laurus alexandrina	Vrtica
Ampelos leuce	Galiopsis
Heliotropium maius	Terra cimolia
Vinum panacite	Et in verbo, Aurium
Vinum helleborite	medicinæ.
Alumen	

C V R A T I V V S;

Pauescentium re-
media.

Linum

Melicratum

Hydromel.

Pecoris scabiem
emendantia.

Vide, Iumentorū sca-
biem.

Pecori vtilia.

Adiantum.

Pecus necantia.

Merion

Aconitū lycoctonon.

Pecus mortuum
extrahentia.

Aristolochia.

Pectoris morbi
remedia.

Acorus

Meu

Costum

Myrrha

Iuncus odoratus

Pityides

Terebinthina

Iuniperus

Ficus

Pomum

Nasturtium

Piper

Chelidonium minus

Rhaponticum

Stichas

Thymus

Ruta

Libanotis

Sagapenum

Ammoniacum

Scordion

Bechion

Vrtica

Isopyrum

Vinum cedrite

Vinum aromatite

Vinum nectarite

Vinum daucite.

Pediculos ne-
cantia.

Allium

Alumen

Mel

Cedria.

Pedum qui à fri-
gore alserūt remedia.

Cyclaminos.

Pedum rimarum
remedia.

Scilla.

Perfrictionis me-
dicinæ.

Iris Illyrica

Cyperus

Balsamum

I N D E X

Oleum	Asphodelus
Ficus Aegyptia	Scilla
Vinum stichadite.	Batrachion
Percussis à fe-	Arction
ris vtilia.	Cotyledon prima
Balsamum	Aqua maris
Paliurus	Alumen.
Mustela	Peripneumonia
Ouum	corum remedia.
Argemone	Abrotonum
Hippomarathrum	Tragoriganum.
Coagulum	Pestilentie con-
Sanguis	traria.
Piper	Myrrhis, id est celiso-
Elaphoboscum	lium
Phyllitis.	Vinum omphacite.
Pernionum re-	Phalangiorum
media.	ictus remedia.
Vnguētum melinum &	Cinnamomum
telinum	Terebinthus
Thus cum suillo adipe	Myrica
Acacia	Myrtus
Ficus	Lixiua ex fico
Cancrī	Cancrī
Pulmo marinus	Malua
Vngues asini	Asparagus
Adeps Lens	Lactuca syluestris
Eruium	Hedera
Rapa sativa	Abrotonum
Beta	Daucus
Cyclaminos	Spondylium
Dracunculus maior	Aparine
Dracunculus minor	Phalangium

C V R A T I V V S.

Myrrhis	Leucoion.
Aqua maris	Phthiriasis, siue
Diosc. lib. 8. cap. 38	pedicularis morbi re-
Phagedænæ mor-	media.
bi remedia.	Strigmenta gymnasto-
Fel Fimum	rum
Dracunculus minor	Myrica
Ifatis	Hedera
Chamæleon niger	Staphis agria
Panaces	Sandaracha.
Staphylinus	Phthificorum re-
Perafites	media.
Characias	Pix
Ampelos leuce	Adeps
Vinum	Porrum
Acetum	Agaricum
Alumen	Rhaponticum
Sal Flos salis.	Acantha
Pharico veneno	Prasium
contraria.	Cestron
Vinum albanum	Lapis Asi.
Diosc. lib. 6. cap. 19.	Piligenarum ne
Phlegmatis cons	defluant.
traria.	Spica nardi
Plantago.	Cochlex terrestres
Phreneticorum	Oesypus
remedia.	Condrylla
Crocinum	Armenius lapis.
Vitex	Pili palpebrarū
Asparagus	euulsi ne rena-
Serpyllum	scantur.
Conyza tertia	Tellinæ

I N D E X

Sanguis		Centaurium minus
Capnos.		Tragacantha
Pili alarum euul-		Hyssopus
<i>si ne renascantur.</i>		Origanus
Fabæ.		Tragoriganum
Pituitæ crassæ		Pulegium
<i>remedia.</i>		Thymus
Iris Illyrica		Ruta
Sesamum		Pyrethrum
Hyssopus		Spondylium
Thymoxalme.		Melanthium
Pituitæ remedia.		Parthenion
Cinnamomum		Clematis
Styrax		Sideritis achilleos
Naphtha		Hyoscyamus
Vlmus.		Helleborum nigrum
Auellana		Sesamoides maus
Ouum		Cucumis
Serum	Vrina	Elaterium
Hordeum		Staphis agria
Linum		Thapsia
Faba		Hippophaës
Lupinum satium		Hippophaëton
Agrioraphanus		Cici
Portulaca		Characias
Cucurbita		Lathyris
Cepa		Scammonia
Sinapi	Piper	Thimelæa
Cyclaminos		Ebulus
Dracunculus maior		Apios
Capparis		Colocynthis
Anemone		Epithymon
Anagallis		Empetron
		Ampelos leuce

C V R A T I V V S.

Polypodium
Heliotropium maius
Vua passa
Aqua maris
Vinum rhetinite
Vinum aromatite
Vinum mandragorite
Vinum scammonite
Sulphur
Peplus.

Pityocamparū
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 2.

Plagarum vibri-
ces emendatia.

Susino.

Plantæ quæ pe-
rimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Pleureticorum
remedia.

Staphylinus

Laserpitium

Aethiopsis.

Podagræ morbi
remedia.

Amomum.

Naphtha

Populus nigra

Amurca

Salix

Ficus

Cochleæ terrestres

Mustela

Marinus pulmo

Lac humanum

Adipum medicinae

Sanguis scilicet mens-
struus

Finium

Hordeum

Lens Rapa satia

Brassica sativa

Seris

Cucurbita

Aros

Asphodelus

Bulbus esculentus

Pulegium

Panaces heracleon

Libanotis

Scordion

Leucoion

Androsaces

Helxine

Papauer sativum

Hyoscyamus

Lens palustris

Aizoon maius

Bryon thalassium

Phycos marinus

Cucumis anguinus

Balanus myreplica

Ebulus

Heliotropium maius

Vua passa

I N D E X

<p> Acetum Ferrum Sulphur Lapis Aſius Lapis gagates Teſtæ ſive terræ forna, cum. Polypi morbi re- media. Dracunculus maior Dracunculus minor. Preſteris ſerpens tis morſus re- media. Omotarichos Rubus. Præputiorum morbi reme- dia. Aloë. Præcordiorum remedia. Scordion Vinum thymite Vinum daucite. Præcipitatis ex alto vtilia. Iris Illyrica Vitex Aſparagus Aniſum Cannabis fativa </p>	<p> Profluuij genitu- re remedia. Vide, Geniture proflu- uij in ſummo. Pruriginem fa- cientia. Scolopendra Ephemerum Opium. Pruriginem emē- dantia. Vrina Eruum Lapathum Aloë Origanum Pulegium Eleliſphacos Melilotus Balanus myrepſica Acetum Alumen Sulphur Sal; Pſilothrum, ſive unguentum depi- latorium. Lepus marinus Hedera Ampelos leuce Dryopteris Arsenicum. Pſoræ morbi re- media. Car </p>
---	--

CURATIVVS.

Cardamomum	Acetum
Oleum amygdalinum	Alumen
Lycium Olea	Sal
Palma elate	Ferri rubigo.
Ficus	Pubertasne
Erinaceus marinus	erumpat.
Cicer	Hyacinthus.
Lupinum satium	Pulmonis morbi
Batrachion	remedia.
Chelidonium minus	Iuncus odoratus
Origanum	Balsamum
Pentaphyllon	Cedria
Staphis agria	Amygdalus amara
Balanus myrepica	Ficus Lac
Ampelos leuce	Pulegium
Vitis sativa	Ruta
Aqua maris Sal.	Sagapenon
Psylli curatio.	Symphyton
Diosc. lib. 6. cap. 10.	Pentaphyllon
Pterigi morbi	Chrysocome
remedia.	Vrtica
Acacia	Thapsia
Rhus	Melicratum
Malum punicum	Vinum hyssopite
Myrtus	Vinum aromatite.
Ficus	Pulices necantia.
Glycyrrhiza	Vnguentum telinum
Aloë	Crocinum
Prasium	Butyrum.
Pentaphyllon	Putredinum geni-
Characias	talium remedia.
Ampelos leuce	Aspalathus.
Vua œnanthe	

Tt

INDEX

Putredines pur-
gantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QUADRUPPE,
dum scabiem
emendat.

Vide, lumentorum sca-
biem.

Quartanæ febris
remedia.

Vide, Febris quartanæ
remedia.

RADICES quæ
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Raucedinis re-
media.

Tragacantha.

Reduuias sa-
nantia.

Ferri rubigo.

Refrigerantes
medicinæ.

Vnguentum melinum

Cupressus

Rhodides

Rosa

Acacia

Ouum

Sonchos

Seris

Lactuca

Caros

Coriandrum

Hieracium maius

Polygonum duplex

Clymenon

Periclymenon

Helxine

Papauer satium

Psyllium

Cicuta

Lens palustris

Aizoon duplex

Brigeron

Phacos thalassion

Potamogeton

Cytisus

Ebulus

Acetum

Omphacomeli.

Pompholyx

Plumbum elotum

Spuma argenti

Cerussa

Corallium

Terra

Lapis samius

Terra ampelitis.

Regn morbi res
media,

Nardi spica

CVRATIVVS.

Schistos		Renum doloris
Ceruinum cornu		remedia.
Fim um	Cicer	
Lapathum		Amygdala amara
Attriplex		Asparagus
Asparagus		Anagallis
Erysimon		Agaricus
Scilla		Anthillis
Chelidonium		Anchusa
Aloë		Halcyonium
Abinthium		Cardamomum
Origanum		Calamus odoratus
Hippomarathrum		Cicer
Libanotis		Casia
Spondilium		Cinnamomum
Laserpitium		Chamæpitys
Prasum		Passum
Scordion		Glycyrrhiza
Asplenon		Iuncus odoratus
Anthemis		Laurinum
Pæonia		Lac
Erythrodanum		Lotus sativa
Chamæpitys		Meu
Pentaphyllon		Pistacia
Hyacinthus		Nardus gallica
Halicacabus		Nuclei pini
Chamæcissos		Oleum amygdalarum,
Osyris		Palma elate
Myrtus sylvestris		Portulaca
Blaterium		Plantago
Vinum chamædryte		Porrum
Vinum calaminthite		Petroselinum
Vinum nardite		Peucedanum
Sulphur,		Pæonia
		Rhaponticum
		Saccharum

I N D E X

<p> Scandyx Smyrnion Symphyton Stratiotes aquaticus Tragacantha Cordylon Vrina Vetonica Vua passa Vinum Vinum cydonite Vinum holosanthinum Erinaceus terrestris Foeniculus Vinum absinthite Vinum nardite Vinum aromatite Oleum balaninum. Rhagadum re- media. Pix Lycium Vitex Cancri Rheumatismis vtilia. Acetum Cupressus Daphnides Ficus Fax vini Macer Oleum oleastri Quum Persea </p>	<p> Portulaca Plantago Staphis agria Triticum Vini qualitas Vinum labruscae Vinum ex pyris Vinum myrtite. Ricinos necantia. Cedria. Rigores seu hor- rores febrium ex- cutientia. Glencinum Piper Panaces heracleon Staphylinus Vinum cedrite Pyrethrum. Rimarum sedis remedia. Vide, Sedis rimarum. Rosionis reme- dia. Lac schiston Pæonia. Ructū mouentia. Mastiche Raphanus Anethum Smyrnion Vinum daucite </p>
--	--

CVRATIVVS.

Ruptorum re- media.

Acorus
Cardamomum
Asarum
Calamus odoratus
Helenium Bdellium
Iuniperus Cedrides
Halimos
Lixiua ex ficu
Fel simum
Dracunculus maior
Dracunculus minor
Asphodelus
Bulbus esculentus
Capparis
Rhaponticum
Gentiana
Aristolochia
Centaurium
Acantha
Leucacantha
Abrotonum
Origanum
Calamintha
Serpyllum
Baccharis
Panaces heracleon
Libanotis
Laserpitium
Sagapenum
Galbanum
Polycnemnon

Clinopodion
Althæa Cestron
Symphyton
Holotheon Xyris
Hippuris
Heliochryson
Phlomidis
Ampelos leuce
Vinum daucite
Vinum tragoriganite
Vinum panacite
Lapis schistos.
SAGITTAS in
fixas extrahentia.
Vide, Spicula infixæ.
Saluam euo-
cantia.
Pyrethrum.
Salmandrę vene-
ni remedia.
Diosc. lib. 6. cap. 4.
Sanguinem ex-
creantibus vtilia.
Iuncus odoratus
Aspalathus
Thus in potu datum
Lentiscus
Mastiche potu data
Naphtha
Cupressus
Macer Myrica
Hipocistis Rosa
Licium Salix

T

S

INDEX

Quercus		Vinum phœnicite
Palma		Corallium
Malum punicum		Lapis hæmatites
Myrtus		Terra samia.
Cichorium		Sanguinem si-
Amygdalus amara		stentia.
Ouum		Thus
Ceruinum cornu		Cupressus
Fimum		Galla
Coagulum		Persea
Triticum		Cochleæ terrestres
Amylum		Ranæ
Portulaca		Araneus
Plantago		Ouum
Porrum		Coagulum
Brysimon		Sanguis
Agaricum	Aloë	Fimum
Rhaponticum		Plantago
Centaurium		Porrum
Acantha leuce & Ara-		Isatis
bica		Elelisphacos
Ferula		Mentha
Althæa		Serpyllum
Cestron		Ruta
Lysimachia		Cyminum sativum
Symphytum		Stœbe
Polygonon mas		Ferula
Symphytum alterum		Clymenon
Clymenon		Hippuris
Aethiopis		Sideritis achilleos
Isopyrum		Pentaphyllon
Adiantum		Phœnix herba
Vitis sativa		Astragalus
Omphacium	Vua	Lichen in petris
		Idæa radix
		Gallion

C V R A T I V V S.

Stratiotes terrestris	Sandarachæ
Vua œnanthe	curatio.
Acetum	Diosc. lib. 6. cap. 19.
Vinum terebinthinum	Sardonix cu-
Plumbum elotum	ratio.
Stimmi	Diosc. lib. 6. cap. 14.
Cinnabaris	Sulphur Scabiem tumēto-
Alumen	rū emendantia.
Spongiæ	Vide, Iumentorum sca-
Gypsum.	biem.
Sanguinem con-	Scabiei morbi
cretum discutientia.	remedia.
Lixiua ex ficu	Argemone prima
Thymus	Chamaeleon niger
Heliochryson.	Helleborus niger
Sanguinē per vri-	Oesypum Sal
nam expellentia.	Oleum oleastri.
Bruum	Sinapi
Cantharides	Sulphur
Ammoniacum.	Vnguentum melinum.
Sanguinē per na-	Scolopēdre mori
res expellentia.	sus remedia.
Crocodilum.	Grossi
Sanguinem per	Scolopendra.
vrinā reddentiū	Asphodelus Sal
remedia.	Diosc. lib. 6. cap. 19.
Cyminum sylvestre.	Scorpionis ictus
Sanguisugas	remedia.
necantia.	Cyperus
Oxalme	Amomum
Dioscori, libro 6. cap.	Cardamomum
32.	Cinnamomum

T t 4

I N D E X

Daphnides		Scorpiones ne-
Myrtus		cantia.
Ficus	Cancrī	Cancrī.
Scorpius terrestris		Scorpionis mas-
Smarides		rini icūs remedia.
Mullus piscis		Vrina
Locustæ		Asphodelus
Lacerta		Plumbum syncerum &
Mures domestici		crematum
Fimū		Sulphur.
Lapathum		Diosc. lib. 8. cap. 61.
Sonchos	Seris	Scorpiones tor-
Lactuca sylvestris		pefacientia.
Ocimum		Delphinion
Abrotonum		Lychnis sylvestris
Sampsuchum		Lens palustris.
Heracium maius		Secundinas tra-
Delphinion		hentia.
Laserpitium		Balsamum
Atractilis		Sampsuchinum
Lychnis vtrāq		Abrotonum
Millefolium		Picea
Phalangium		Schistos
Polemonia		Fiber
Chamaesyce		Iecur mergi
Heliotropium		Linum
Scorpioides		Aristolochia tertia
Aqua maris		Thymus
Vinū tetralassomenum		Pulegium
Vinum cydonite		Prasium
Sulphur		Stachys
Sal		Artemissa
Lapis sapphirus		Oenanthe
Diosc. lib. 6. cap. 60.		Hemorocallis

C V R A T I V V S.

Erythrodanum		Portulaca
Anagyris	Myrtus	Sonchos
Adiantum		Anagallis
Ampelos leuce		Melilotus
Vinum dictamnite.		Laserpitium
Sedis rimarum		Aster Atticus
remedia.		Viola purpurea
Strigmenta balneorum		Cucumis anguinus
Meu	Aloë	Colocynthis
Dipsacos		Acetum
Leucoion.		Oxalme
Sedis inflamma-		Vinum terebinthinum
tionis remedia.		Flos æris
Oleum cycinum		Plumbum elotum.
Amaracinum		Semina quæ pe-
Lens	Libanotis	rimunt.
Symphyton		Diosc. lib. 6. in præfat.
Erigeron.		Sensibus nocētia.
Sedis morbi re-		Vinum annosum.
media.		Sensus recreātia.
Thus		Lapis samius.
Lentiscus		Sepis bestiolæ
Pix	Rosa	morsus remedia.
Amurca		Portulaca Oxymel.
Mâlum punicum		Serpentiū vene-
Myrtus		nis contraria.
Cancrī		Paliurus
Ouum		Vitex
Oesypum		Cancrī
Adeps		Hippopotamus
Lens	Fel	Fiber
Malua		Muscula
Althæa		Gallinaceus
		Cantharides

INDEX

Chondrylla	Dracunculus maior
Nasturtium	Abrotonum
Dracunculus	Origanum
Asphodelus	Calamintha
Rhaponticum	Peucedanum
Aristolochia tertia	Melanthion
Origanum sylvestre	Galbanum
Baccharis	Ruta Polium
Phlomos, siue verba-	Oenanthe
scum	Lyfimachia
Panaces chironium	Aster atticus
Staphylinus	Vinum conyzite
Smyrnion	Lapis gagates.
Aparine	Serpentium mor-
Camædrys	fus remedia,
Lychnis sativa, siue co-	Iris Illyrica
ronaria	Asarum
Erythrodanum, siue	Cinnamomum
Rubia	Balsamum
Sparganion	Pix Naphtha
Polygonon mas	Iuniperus
Clematis daphnides	Platanus
Polemonia Anchusa	Erica Glandes
Ocimoides	Pistacia
Hyacinthus	Ficus ægyptia
Mandragoras	Pastinaca piscis
Nerion	Ranæ
Adiantum.	Gobius Fel
Serpentes fu-	Omotarichos
gantia,	Fimum
Iuniperus	Marinus pulmo
Cornu ceruinum	Mel Bruum
Adeps Nasturtium	Distamys

C V R A T I V V S.

Raphanus
 Agaricum
 Brassica sativa
 Cyclaminos
 Ampeloprason
 Dracunculus minor
 Asphodelus
 Anagallis
 Acantha leuce
 Abrotonum
 Asclepias
 Origanum
 Lilium
 Calamintha
 Clinopodium
 Serpyllum
 Leontopetalon
 Panaces heracleon
 & asclepion
 Cuminum sativum &
 sylvestre
 Ammi Foeniculum
 Daucus
 Libanotis
 Sagapemon
 Prasion
 Phyllitis
 Trifolium
 Scordion
 Cestron
 Periclymenos
 Echion
 Ocimoides, siue oima-
 strum

Rubus
 Eupatorium
 Heliochryson
 Adiantum
 Peristereon supinus
 Ebulus
 Ampelos leuce
 Vitis sativa
 Vinum Acetum
 Oxymeli
 Vinum conyzite
 Vinum panacite
 Sal Cinis vitis
 Lapis ophites.
 Serpentes ne fe-
 riant.
 Cerui medulla.
 Serpentes ne
 cantia.
 Anchusa onocheles
 Vinum cedrite.
 Siccantes medi-
 cinae.
 Ammi
 Bromos
 Cistos
 Cuminum sativum
 Ebulus
 Aes vstrum
 Harena litoris
 Libanotis Mentha
 Pompholyx
 Spodium Rubus

I N D E X

<p> Terra Chia Rubrica sinopis Fæx vini Diphryges. Singultum pel- lentia. Fiber Sisymbrium Rhaponticum Mentha Aristolochia tertia Anethum Cyminum sylvestre Alysson Asplenon Clymenon Saxifragum. Siriasis remedia. Cucurbita Pepo Heliotropium maius. Sitim generantia. Cepe Allium Capparis Vini qualitas. Sitimextinguētia. Glycyrrhiza Simphytum. Smilaci cōtraria. Vide, Taxo contraria. Somniferæ me- dicinæ. Amygdalæ amaræ Halicacabus, siue sola. </p>	<p> num vesicarum. Anisum Amomum Cistos tertia, siue lada- num Baccharis Dorycnion Hyoscyamus Lactuca Iris Illyrica Opium Mandragoras Papauer rhœas, siue sa- tium Porrum Styrax Smilax hortensis Strychnon hypnoticō, siue solanum somni- ficum Vitex Vinum nouum Lapis memphites. Somnum discus- tientia. Spondylium Peucedanum. Somnia imagino- sa & mala inducentia. Faba Lens Pycnocomum Smilax leuis. Sordes purgātia. Irinum </p>
--	---

C V R A T I V V S.

Cortex thuris

Sabina.

Spasticorum
remedia.

Fiber.

Spasmi remedia.

Vide, Convulsionis re/
media.

Spiritū, id est, fla-
tum generantia.

Gentiana.

Spirantibus diffi-
culter vtilia.

Vide, Ortopnoicis.

Spiritus discurren-
tes coercencia.

Bdellium.

Spirantibus vitā
auferentia.

Cedria.

Spicula infixā
corpori extra-
hencia.

Anagallis

Harundo

Aristolochia

Dicamnus

Propolis

Narcissus

Oxyacantha

Silurus

Triticum

Tragion

Xyphion

Xyris

Lacerta.

Spissandi vim
habentia.

Acacia Malus

Cotonea

Malum sylvestre

Amygdalus amara

Baccharis

Britannica

Polygonon mas & foe-
mina.

Clymenon Medion

Rubus Helxine

Idæa radix

Hippuris Psyllium

Bryon thalassium

Potamogeton

Acetum

Vinum hadrianum

Aerugo aurificum

Vinum nigrū labruscæ

Vinum tyburtinum

Cadmia

Pompholyx

Squama æris

Pumex Coralliū

Rubrica sinopis

Lapis hæmatites.

Spleneticis vti-
lia.

INDEX

<p>Vide, Lienis morbi re- media.</p> <p>Spumæ argenti contraria.</p> <p>Vinum in commune.</p> <p>Squamas ostium extrahentia.</p> <p>Aristolochia tertia Peucedanum.</p> <p>Staphyllomatis remedia.</p> <p>Palma thebaica</p> <p>Lapis schistos</p> <p>Lapis sapphiros.</p> <p>Sternutamentum mouentia.</p> <p>Iris Illyrica</p> <p>Fiber</p> <p>Parmice</p> <p>Batrachio Daphnoides</p> <p>Helleborus albus.</p> <p>Steriles foeminas facientia.</p> <p>Vide, Generationem de primentia.</p> <p>Stigmatum re- media.</p> <p>Batrachion</p> <p>Mandragora.</p> <p>Stomacho con- traria.</p>	<p>Terebinthina</p> <p>Cedrides</p> <p>Melimela</p> <p>Arbutus</p> <p>Auellana</p> <p>Hordeum</p> <p>Malua</p> <p>Porrum</p> <p>Brassica fatiua & ma- rina</p> <p>Cepe</p> <p>Capparis</p> <p>Abinthium</p> <p>Abinthium seriphium</p> <p>Balanus myrepica</p> <p>Vua</p> <p>Ebulus</p> <p>Galbanum</p> <p>Aqua maris</p> <p>Vinū tethalassomenū.</p> <p>Stomachi mor- bi remedia.</p> <p>Meu</p> <p>Nardum Gallicum</p> <p>Malabathrum</p> <p>Iuncus odoratus</p> <p>Agallochum</p> <p>Helenium</p> <p>Oleum balaninum</p> <p>Mastichinum</p> <p>Vnguentum rosaceum</p> <p>Susinum</p> <p>Nuclei pini</p>
--	--

C V R A T I V V S.

Mastiche		Gingidium	
Cupressus		Scandyx	Aphace
Iuniperus	Laurus	Sampeloprasen	
Populus nigra	Rosa	Allium	
Oliuæ colymbades		Zingiber	Scilla
Palma		Bulbus esculentus	
Palma elate		Agaricum	
Malum punicum		Rhaponticum	
Siliquæ	Myrtus	Gentiana	
Cotonea		Acantha leuce	
Mala epirotica		Aloë	Abinthiū
Armeniaca		Mentha	
Mespilus		Tragorigantum	
Lotus	Pruna	Pulegium	Melilotus
Amygdalæ dulces		Ligusticum	Caros
Pistacia	Iuglans	Anethum	
Morus	Persea	Cuminum sylvestre	
Ficus Aegyptia		Hieracium maius	
Ionia		Apium	Petroselinū
Cochleæ terrestres		Smyrnion	Foeniculus
Onum	Lac	Scordion	Artemisia
Lac humanum		Nymphæa	
Caseus		Pæonia	Cestron
Lana succida		Polygonō mas	Rubus
Oriza	Lyncuriō	Strychnon satium	
Saccharon		Cotyledon prima	
Faba Aegyptia		Erigeron	Adiantum
Siser		Aster atticus	
Lupinum satium		Viola purpurea	
Lapathum	Lāpfana	Chamædaphne	
Brassica satina		Colocynthis	
Portulaca	Sonchios	Vitis famia	
Seris	Cucumis	Nuclei acinorum	
Lactuca		Vua œnanthe	

INDEX

<p>Vide, Lienis morbi re- media.</p> <p>Spumæ argenti contraria.</p> <p>Vinum in commune.</p> <p>Squamas ostium extrahentia.</p> <p>Aristolochia tertia Pucedanum.</p> <p>Staphyllomatis remedia.</p> <p>Palma thebaica</p> <p>Lapis schistos</p> <p>Lapis sapphiros.</p> <p>Sternutamentum mouentia.</p> <p>Iris Illyrica</p> <p>Fiber</p> <p>Parmice</p> <p>Batrachio Daphnoides</p> <p>Helleborus albus.</p> <p>Steriles foeminas facientia.</p> <p>Vide, Generationem de primentia.</p> <p>Stigmatum re- media.</p> <p>Batrachion</p> <p>Mandragora.</p> <p>Stomacho con- traria.</p>	<p>Terebinthina</p> <p>Cedrides</p> <p>Melimela</p> <p>Arbutus</p> <p>Auellana</p> <p>Hordeum</p> <p>Malua</p> <p>Porrum</p> <p>Brassica fatiua & ma- rina</p> <p>Cepe</p> <p>Capparis</p> <p>Abinthium</p> <p>Abinthium seriphium</p> <p>Balanus myrepica</p> <p>Vua</p> <p>Ebulus</p> <p>Galbanum</p> <p>Aqua maris</p> <p>Vinū tethalassomenū.</p> <p>Stomachi mor- bi remedia.</p> <p>Meu</p> <p>Nardum Gallicum</p> <p>Malabathrum</p> <p>Iuncus odoratus</p> <p>Agallochum</p> <p>Helenium</p> <p>Oleum balaninum</p> <p>Mastichinum</p> <p>Vnguentum rosaceum</p> <p>Susinum</p> <p>Nuclei pini</p>
---	--

C V R A T I V V S.

Mastiche		Gingidium	
Cupressus		Scandyx	Aphace
Iuniperus	Laurus	Sampeloprasen	
Populus nigra	Rosa	Allium	
Oliuæ colymbades		Zingiber	Scilla
Palma		Bulbus esculentus	
Palma elate		Agaricum	
Malum punicum		Rhaponticum	
Siliquæ	Myrtus	Gentiana	
Coronea		Acantha leuce	
Mala epirotica		Aloë	Abinthiū
Armeniaca		Mentha	
Mespilus		Tragorigantum	
Lotus	Pruna	Pulegium	Melilotus
Amygdalæ dulces		Ligusticum	Caros
Pistacia	Iuglans	Anethum	
Morus	Persea	Cuminum sylvestre	
Ficus Aegyptia		Hieracium maius	
Ionia		Apium	Petroselinū
Cochleæ terrestres		Smyrnion	Foeniculus
Ouum	Lac	Scordion	Artemisia
Lac humanum		Nymphæa	
Cafeus		Pæonia	Cestron
Lana succida		Polygonō mas	Rubus
Oriza	Lyncuriō	Strychnon satium	
Saccharon		Cotyledon prima	
Faba Aegyptia		Erigeron	Adiantum
Siser		Aster atticus	
Lupinum satium		Viola purpurea	
Lapathum	Lāpsana	Chamædaphne	
Brassica satia		Colocynthis	
Portulaca	Sonchios	Vitis famia	
Seris	Cucumis	Nuclei acinorum	
Lactuca		Vua œnanthe	

I N D E X

Omphacium	Strumæ gutturis
Vini qualitas	remedia.
Phalernum	Iris Illyrica Grosi
Hydromel	Vipera Mustela
Thymoxalme	Vnguis asini Finum
Omphacomeli	Hordeum Loliū
Vinum	Fabæ Lens
Vinum furrentinum	Lupinum satium
Vinum omphacite	Lapathum
Vinum nigrum ex la-	Andrachne, siue portu-
bruscæ floribus	laca sylvestris
Vinum melitite	Plantago Piper
Vinum scilliticum	Capparis Argemone
Vinum cydonite	Coriandrum,
Vinum apijte	Libanotis
Vinum anethinum	Lasertium
Vinum rhoite	Aparine
Vinum myrtite	Millefolium
Vinum terebinthinum	Scordion
Vinum phœnicite	Lithospermon
Vinum absinthite	Cotyledon prima
Vinum bunite	Galiopsis
Vinum dictamnite	Pseudobunion
Vinum calaminthite	Adiantum
Vinum aromatite	Testæ, siue terræ for-
Vinum nectarite	nacum.
Vinum nardite	Strangulatus
Vinū ex sylvestri nardo	remedia.
Vinum selenite	Irinum
Ferrum	Absinthium.
Flos salis	Stranguriæ mor-
Fax vini	bi remedia.
Lapis alabastrites	Aspalathus
Lapis samius.	Cedri

C V R A T I V V S.

Cedrides	Locustę	Vnguentum melinum
Asparagus		Rhodides Myrtus
Sisymbrium		Bulbus esculentus
Medica		Vinum myrsinite
Panaces heracleon		Sulphur Gypsum
Seseli Malsiliense		Terra samia.
Hipposelinon		Sudoreseuocãtia.
Hippomarathron		Metopium vnguentum
Polycnemon		Smyrnion
Clinopodium		Pyrethrum
Oenanthe	Conyza	Onobrychis.
Asplenon	Cepe	Flos salis
Onobrychis		Anchusa
Poligonon mas		Lycopsis.
Saxifragon		Sues necantia.
Xyris		Chamæleon albus
Laurus Alexandrina		Suffusionũ mor-
Tragion		bi remedia.
Pseudobunion		Fel Sanguis.
Adiantum.		Sagapenum
Stipticæ medi-		Euphorbium
cinæ.		Chamæsyce
Vide, Adstrictorię me-		Harena litoris.
dicinæ.		Sugillatorum re-
Succi qui peri-		media.
munt.		Acetum Sal.
Diosc. lib. 6. in præfat.		Superciliorum
Sudorem depri-		raritatĩ vtilia.
mentia.		Picea.
Oleum		Supercilĩs gla-
Oleum omphacinum		bris vtilia.
Oleum oleastri		Fuligo resinæ
Myrtẽũ Lentiscinum		V r

INDEX

- Suppurationis**
 tuberculorum
 remedia.
Crocomagma
Palimpissa.
Suppurationum
 remedia.
Ficus Aegyptia
Mel **Hordeum**
Lolium
Curcubita
Ligusticum
Smyrnion **Althæa**
Mandragoras
Vrtica **Narcissus**
Ampelos leuce
Diphryges.
Suspiriosorum
 remedia.
Canchamum
Cyphi
Oleum amygdalarum
Pix **Ficus**
Vulpinus pulmo
Eruum
Plantago **Agaricum**
Rhaponticum
Aristolochia tertia
Hyssopum **Thymus**
Acinos **Ruta**
Galbanum
Ammoniacum
Prasium
- Parthenium**
Anagyris
Adiantum **Thapsia**
Ampelos leuce
Vinum passite
Vinum hyssopite.
TABIDI corporis
 remedia.
Vide, Phthysicorum re-
 media.
Tabescentibus
 vtilia.
Daphnides
Vinum strobilite.
Taxo contraria.
Vinum in commune
Acetum
Diosc. lib. 6. cap. 12.
Tela infixæ cor-
 poribus extrahentia.
Vide, Spicula infixæ.
Tenasmi morbi
 remedia.
Lac schiston
Foenogracum
Linum **Eruum,**
Teredinem sen-
 tientia,
Ficus Aegyptia
Hyoscyamus.
Teredinem non
 sentientia,

C V R A T I V V S.

Tilia

Hermol. Cor. cap. 133.

Teredinem ne-
cantia.

Sal.

Testium morbi
remedia.

Vitex

Myrtus

Cicer

Faba

Erysimon

Asphodelus

Melilotus

Ruta

Cyminum

Lilium

Hyosciamus

Erigeron

Vua passa

Sal

Geodes lapis

Terra samia

Cimolia.

Thapsiæ con-
traria.

Diosc. lib. 6. in præfat.
& cap. 33.

Theriacam in-
gredientia.

Rapa sativa

Zingiber

Dictamnus

Apium.

Theriomatum
remedia.

Lupinum sativum

Eleli sphacos.

Thoracis reme-
dia.

Cerebrum gallinacei
Glycyrrhiza.

Thymos absu-
mentia.

Smaris

Fimum

Thymus

Ruta

Heliotropium minus

Vitis sativa

Sal.

Tibiarum vlce-
rum remedia.

Hydropiper

Ampelos leuce.

Tineas latas pel-
lentia.

Cardamomum

Costum Malicorium

Melimela

Iuglans

Morus

Heliotropium minus

Vinum absinthite

Lupinum sativum

Brassica sativa

Portulaca

Chamaeleon albus

Hyssopum

Calamintha

Thymus

Ruta

Coriandrum

Melilotum

Bryon thalassion

V V z

I N D E X

•Pteris	Telypteris	Iris Illyrica	
Vinum cedritej		Acorus	Mea
Calcanthum		Cardamomum	
Anchusa tertia		Balsamum	
Tineas rotundas		Agallocum	
generantia,		Oleum	
Triticum.		Iuniperus	
Tineas necantia.		Halimos	Iuglans
Absinthium seriphion		Ficus	Fiber
Mentha		Talus suis	Triticum
Heliotropium minus		Milium	Panicum
Cedria		Brum	Ätriplex
Aizoon maius.		Sisymbrium,	
Tineis contraria.		Plper	Scilla
Citria.		Agaricum	
Tonsillarū mor-		Rhaponticum	
bi remedia,		Centaurium maius	
Pix	Cedria	Eringium	
Lycium	Pruna	Calamintha	
Morus	Ficus	Serpyllum	
Hirundines		Sampfuchus	Ruta
Lac schiston	Mel	Panaces heracleon	
Sinapi	Aloë	Acetum	
Organum	Britanica	Cyminum satium	
Periclimenos	Helxine	Seseli Massiliense	
Peristereon supinus		Cyminum sylvestre	
Omphacium		Elaphoboscon	
Vinum myrsinite		Petroselinum	
Flos æris		Daucus	Libanotis
Alumen	Sal.	Ferula	
Torminis re-		Peucedanum	
media,		Asclepias	
		Meissophyllos	
		Phalangion	

C V R A T I V V S.

Conyza	Alisma	Asphodelus
Chamaepitys		Panaces Asclepion
Gramen		Laserpitium
Pseupobunion		Viscum Thapsia
Chamaedaphne		Mandragoras
Vinum scillite		Ephemerum
Vinum cedrite		Cucumis anguinus
Vinum hyssopite		Vrtica
Vinum tragoriganite		Aerugo aurificum
Vinum panacite		Lapis alius
Aphronitrum		Terra cimolia.
Et in verbo, Disenteri corum remedia.		Tubera exte- nuantia.
Torporis re- media.		Triticum.
Fagus.		Leontopodium
Torsionis re- media.		Scammonia
Tragoriganum.		Vinum nigrum e la- brusca.
Toxico cōtraria.		Tumorum re- media.
Glandes. Sanguis.		Anagyris
Tremorem excu- tientia.		Platanus Fagus
Vnguentum cinnamo- minum.		Ilex Adeps
Tremoris re- media.		Hordeum Faba
Lepus terrestris.		Brassica sativa & syl- uestris
Tuberculorū sup- purationis remedia.		Cucurbita
Strigmēta gymnastorū		Nasturtium
Morus Cepe		Hydropiper
		Bulbus esculentus
		Isatis
		Chamaeleon
		Tragorigannum

INDEX

Sampfuchum	Calamus odoratus
Ligusticum	Cupressus
Daucus Libanotis	Cedrides
Melanthium	Cistos Cacalia
Orchis serapias	Chamædrys
Orminum	Tragacantha
Buphthalmus	Dracunculus
Cannabis syluatica	Faba Helenion
Polygonon mas	Hipparis
Lagopus Xyris	Hyoscyamus
Helxine	Iris Illyrica
Pentaphyllon	Lycium
Peristerion supinus	Laserpitium Mel
Hyoscyamus	Melicratum
Psyllium	Origanum Pix
Xanthium	Paliurus Piper
Sesamoides	Peucedanum
Ephemerum	Prasium
Phlomis	Papauer satium
Cucumis anguinus	Ruta Styrax
Thapsia	Strution
Chamæsyce	Smyrnion
Pycnocomum	Sulphur
Aqua maris	Triticum
Indicus lapis	Tragoriganum
Fæx vini Spongia.	Terebinthina
Tussis remedia.	Vua passa.
Amygdala amara	Tussis veteris
Asphodelus	remedia.
Apium satium	Asarum Myrrha
Bdellium	Nuclei pini
Bromos	Mastiche
Cinnamonum	Naphtha

C V R A T I V V S.

Cerasia		Venerē cū volu-
Amygdala amara		ptate expedientia.
Anellana	Allium	Lanrus Alexandrina.
Ficus	Propolis	Venerem cohi-
Raphanus		bentia.
Scilla	Hyssopus	Portulaca Lactuca
Centaurium maius		Lactuca siluestris.
Baccharis		Venerem stimu-
Seseli Malsiliense		lantia.
Daucus		Costum Crocum
Sagapenon		Mastiche Linum
Galbanon		Rapa satiuia Siser
Scordion		Eruca Porrum
Bechion	Helxine	Cepe Nasturtium
Phlomides		Dracunculus maior
Acetum		Dracunculus minor
Vinum hyssopite		Bulbus esculentus
Sandaracha.		Mentha
V AROS purgātia.		Staphylinus
Oleū balaninū.		Anisum Orchis
Myrrha		Orchis serapias
Lacerta	Linum	Satyrion
Porrum	Cepe	Satyrion alterum
Bulbus esculentus		Orminum Xiphion
Pulegium		Vrtica Galiopsis.
Balanus myrepfica		Venenata fu-
Cici	Sory.	gantia.
Ampelos leuce.		Vitex Dictānus.
Varices sanantia.		Venas excitātia.
Circion.		Vinum phalernum.
Veneficijs me-		Ventris animalia
detur.		expellentia.
Scilla.		V v 4

INDEX

Vide, Tineas latas,	Ruta	Apium
Ventrē soluētia.	Laserpitium	Leuca
Vide, Aluum soluētia.	Polium	Cestron
Venenatorum	Pentaphyllum	
icūs remedia.	Colchicon	
Cardamomum	Epipactis	Passum
Nardum gallicum	Linum gypsatum	
Helenium	Rubrica lemnia	
Cinnamomum	Terra samia.	
Bdellium Vitex	Vermibus con-	
Ficus Propolis	traria,	
Raphanus Triticum	Cedria.	
Eryngium	Verrucas tol-	
Cuminum sylvestre	lentia.	
Althæa Tribulus	Batrachion	
Prasium	Clinopodion	
Smilax aspera	Characia	
Aqua maris Acetum.	Chamaesyce	Dipsacos
Venenorum re-	Ficus	Grossi
media.	Cicer	Lacerta
Cinnamomum	Heliotropiū	Fimum
Oleum Pix	Staphis agria	
Paliurus Lyciū	Scilla	Thymus.
Olea Aethiopica	Vertiginis morbi	
Iuglans	remedia.	
Lixiua ex ficu	Balsamum	
Lepus terrestris	Lac humanum	
Fiber Butyrum	Peucedanum	
Sanguis Vrina	Galbanum	
Rapa sativa	Ampelos leuce	
Brysimon Agaricū	Ampelos melæna	
Aristolochia secunda	Acetum scilliticum	
Abrotonum	Vinum scilliticum.	

CV R A T I V V S.

Vertiginem ad generantia.

Cardamomum
Balsamum
Hyoscyamus
Mandragoras
Falernum
Vinum rhetinite
Mandragorite
Aconitum Cicutā.

Vesicæ morbi remedia.

Meu
Nardum gallicum
Nuclei pini Cupressus
Laurus Palma
Palma elate
Myrtus Lac
Ficus Ouum
Cochlex terrestres
Cicadæ Napum
Cerinum cornu
Saccharum
Gramen Malua
Hippuris
Portulaca
Lotus sylvestris
Plantago vna passa
Cucumis
Scandyx Passum
Ochra Porru
Bulbus vomitiuus
Rhaponticum

Glycyrhiza
Tragacantha
Panaces heracleon
Petroselinum
Smyrnion
Peucedanum
Foeniculus Nymphaea
Anthemis Peonia
Phalaris Cepe
Alcyonium Cestron

Vinum terebinthinum
Vinum scilliticum
Vinum aromatite
Vinum halosanthite
Lapis morochthus.

Vesparum ictus remedia.

Laurus Malua
Silymbrium.
Vestibus ne ani-
malia noceant.
Absinthium
Heliochrysos.

Vibices plagarū emendantia.

Susinum.

Viperæ morsus remedia.

Casia Costum
Iuniperus
Macer
Fraxinus Vrina

V V 3

INDEX

Caries lignorum	Argemone	Gentiana	
Triticum	Eruium	Thelephion	Ruta
Ferula	Anchusa	Chamaeleon niger	
Onocheles	Libanotis	Lilium	
Ocimoides	Nymphæa	Cicuta	
Diosc. lib. 6. cap. 63.	Brythrodantum		
Herm. Cor. cap. 721.	Helleberum nigrum		
Virium infirmi-	Cucumis anguinis		
tates roborantia.	Balanus myrepfica		
Nuclei pini.	Narcissus		
Visco contraria.	Sulphur		
Vinum in communi	Halcyonium		
Acetum	Terra melia.		
Vinum absinthite	Vitra fracta con-		
Diosc. lib. 6. cap. 21.	glutinantia.		
Viscerum morbi	Herm. Cor. cap. 254.		
remedia,	Vmbilicire-		
Thus.	media.		
Vitiliginis re-	Lapis magnes.		
media,	Vnguibus vtilia.		
Daphnides	Pix	Cupressus	
Myrtus	Daphnides		
Ficus	Olea	Oriza	
Grossi	Linum	Lapathum	
Cochlex terrestres	Bulbus esculentus		
Lepus terrestris	Batrachion		
Sepiæ	Faba	Chelidonium minus	
Beta	Lupinum satium	Viscum	Vua passa
Chondrylla	Cepa	Sandaracha	Alumen
Allium	Piper	Sulphur	Fæx vini.
Dracunculus maior		Vocem claram	
Dracunculus minor		reddentia.	
Asphodelus	Capparis		

C V R A T I V V S.

Myrrha		Atriplex	Acetum
Styrax	Silurus.	Apium	Faba
Voluptates ani-		Mentha	
mi augescētia.		Eupatorium.	
Buglossum.		Vomicæ morbi	
Volucrum mor-		remedia.	
sus remedia.		Paliurus	Thlaspi
Iecur aprinum.		Struthion	Bryngion
Vomitioes mo-		Bechion	Psyllium
uentia.		Mandragora	
Irinum	Laurus	Acetum.	
Cochlex terrestres		Vrendi vim ha-	
Omotarichos		bentia.	
Blattæ	Pepo	Misy	Mesenteria.
Asphodelus		Vredinem fa-	
Capparis		cientiu.	
Bulbus vomitorius		Trifolium.	
Origanum	Cestrum	Vrinæ difficultas	
Anagris semen		tem generantia.	
Papauer spumeum		Diosc. lib. 6. in præfat.	
Mandragoras		Vrinæ harenosæ	
Daphnoides		& asperæ remedia.	
Helleborus albus		Papauer ceratidis.	
Elaterium	Sylibon	Vrinam cruētam	
Balanus myrepica		mouentia.	
Narcissus	Cici	Clymenon.	
Melicratum		Vrinā arcessentia.	
Aes vstum		Eruum	Galbanum
Chrysocolia		Vrinā mouentia.	
Rubrica lemnia.		Acorus	
Vomitioes co-		Meu	Cyperus
hibentia.			

I N D E X

Cardamomum	Oues	Buprestis
Nardi spica	Vermes terreni	
Nardum gallicum	Mel	Hordeum
Asarum Phu	Zythum	Milium
Malabathron	Panicum	Cicer
Casia	Eruum	Rapa sativa
Cinnamomum	Raphanus	
Costum	Rhaphanus agria	
Iuncus odoratus	Sifer	Bunion
Calamus odoratus	Brassica sativa	
Balsamum Crocum	Asparagus	
Crocomagma	Sisymbrium aquaticum	
Helenium	Crithmon	Cucumis
Oleum amygdalinum	Pepo	Lactuca
Unguentum melinum	Gingidium	Caucalis
Susinum Irinum	Bruca	Ocimum
Amaracinum	Smilax hortensis	
Bdellium	Porrum	
Picea Nuclei pini	Ampeloprasum	
Lentiscus Resina	Cepa	Allium
Terebinthus	Piper	Struthion
Cupressus	Dracunculus	
Iuniperus	Asphodelus	
Populus alba	Scilla	Capparis
Paliurus Tilia	Agaricum	
Olea æthiopica	Crocodilion	
Glandes Myrtus	Centaurium maius	
Palma elate	Chamaeleon albus	
Siliquæ Cotonea	Acantha leuce	
Mala spirotica	Acantha	Anonis
Cornus	Bryngion	
Amygdalæ dulces	Abinthium	
Erinaceus marinus	Abrotonum	
Cimices lecti	Tragoriganum	

CV R A T I V V S.

Helisphacos	Thymus	Papauer rhœas
Serpyllum	Baccharis	Strychnon hypnoticon
Ruta	Moly	Cotyledon prima
Ligusticum		Vrtica Arcticon
Staphylinus	Tordylō	Vinum lesbium.
Sison	Anisum	Hydromel
Caros	Anethum	Melicratum
Cyminum	syluestre	Vinum rhetinite
Opium	Oreoselinum	Vinum catorchite
Petroselinum		Vinum ē cedro
Daucus	Libanotis	Vinum ē lauro
Melanthion		Vinum absinthite
Ammoniacum		Vinum calaminthite
Chamædrys		Vinum aromatite
Trifolium	Scordion	Vinum nectarite
Androsaces	Anthyllis	Vinum nardite
Anthemis		Vinum asarite
Lithosperma		Vinum syluestris nardi
Erythrodanum		Vinum daucite
Lonchitis	Althæa	Vinum acorite
Hypericon	Choris	Halcyonium
Chamæpitys		Lapis hæmatites
Cestron		Tapis Iudaicus
Polygonon mas		Corallinum
Polemonia		Vinum chamæpiteos.
Saxifragon		Vrtice herba pru-
Xyris	Gramen	ritus remedia.
Gramen parnasium		Herm. Cor. cap. 707.
Phoenix herba		Vstis vtilia.
Hippuris		Vrtica siue acalyphe.
Oxychoenos		Vuæ faucium.
Heliochrysos		remedia.
Astragalus		
Hyacinthus	Pix	Galla

INDEX

Pruna	Hirundines	Polycnemon	Polium
Vrtica	Omphacium	Polygonon mas	
Acetum	Flos æris	Polygonatum	
Alumen	Sal.	Pentaphyllum	
Vulpes necantia.		Phoenix herba	Pteris
Apocynon.		Peristereō	Papauer
Vulnerū remedia		Plumbum elotum	
Amurca		Scordion	Symphyton
Allium	Argemone	Sideritis	
Aristolochia	Aloë	Stratiotes aquaticus	
Anthyllis	Althæa	Spongia	
Androsæmon		Cochleæ terrestres	
Lycopsis	Acetum	Thus	Terra eretria
Butyrum	Brassica	Vinum	
Coccus	Chamæpitys	Vinum œnanthe	
Centaurion		Vnguentum citrinum	
Cyclaminos		Vlmus	Vitex.
Cytinus	Cupressus	Vulux mulieris	
Dracunculus		remedia.	
Dictamnus		Meu	Cyperus
Aerugo aurificum		Nardi spica	
Oenanthe		Cassa	Costum
Ficus Aegyptia		Iuncus odoratus	
Fimum	Gentiana	Balsamum	Bryon
Glycyrriza	Glutinū	Narcaphthum	
Hippuris	Ifatis	Oleum amygdalinum	
Lana succida		Mastichinum	
Ligusticum	Lilium	Vnguentum rosaceum	
Lysimachion		Melinum	
Minium sinopicum		Sampsuchinum	
Myriophyllum		Abrotoninū	Susinū
Picea	Palma	Narcissinum	
Portulaca	Porrum	Crocinum	Irinum

C V R A T I V V S.

Gleucinum		Peucedanum
Amaracinum		Sagapennum
Metopium		Galbanum
Cinnamomum		Asclepias
Myrrha	Styrax	Lilium
Bdellium		Circæa
Lentiscus	Pix	Artemisia
Naphtha	Iuniperus	Geranium
Laurus	Myrica	Anthyllis
Cistos	Rosa	Parthenion
Lycium	Acacia	Pæonia
Amurca	Vitex.	Cestron
Galla	Palma elate	Clematis daphnoides
Myrtus	Cotonea	Chrysocome
Iuglans	Cimices lecti	Ageraton
Lac schiston	Butyrū	Vinum terebinthinum
Oesypum	Coagulum	Vinum cedrite
Adeps	Fœnogræcum	Vinum picatum, siue
Linum	Malua	pissite
Portulaca	Plantago	Vinum chamædryte
Sonchos	Porrum	Vinum daucite
Sinapi	Piper	Vinum helleborite
Agaricum		Lapis gagates
Rhaponticum		Peristereon rectus
Pulegium		Hyoscyamus
Centaurium maius		Mandragoras
Melilotus	Ruta	Ebulus
Panaces heracleon		Ampelos leuce
Ammi		Acetum
Spondyliion		Acetum scilliticum.

INDICIS CVRATIVI
FINIS,

EXCVDEBAT
Theobaldus Paganus.

1547.

